

視力乏弱病論

全

オンセノールト譯二種ノ一

内田出品

英國原著
鏡方譯稿

視力之弱論

内田出品

千八百十六年版

此卷中用朱者示松原氏本之異同耳非改之也
此卷者經富樫氏菅谷氏之傳寫
松原氏本者親寫士生家之藏卷

- 第一篇 論視力之弱病之症候及原因
- 第二篇 論視力之弱病與他病之區別
- 第三篇 論療法
- 第四篇 揭示忘候及療法之證據
- 第五篇 論方劑
- 第六篇 論點眼水之製法
- 第七篇 論療法之餘義

視力之弱病論 第二枚 和蘭一十八年 鑄行

濱松小書集
内田貞藏書

暗厄利亞 ヨーニスラヘンソニ著

和蘭 テイスセニ 譯註

備中 緒方章 公裁譯稿

第一篇 論視力之弱病之症候及原因

凡此病ハ外ヨリ見テ以テ明カニ診定スルト甚難シ何
者結膜ノ脈絡盈脹スルトナク毛線原名ハルキリル蓋ニ驗縁
明カニ変ヲ見サス毫毛損傷ノ見ルヘキモノ無レハナリ○
唯此病ノ明徴トスヘキ症候ハ眼目ノ知覚甚々敏捷捷ニ
先輝氣及ヒ凡テ外來ノ刺戟ニ堪ユルヲ得サル者也○

即其症光氣赫灼タルモノニ向ヒハ乍ケ^疼痛ヲ發シ稍重
症ナル者ニ至テハ大陽ノ光線少シク眼ニ入レハ疼痛スル丁
殊ニ甚^{シク}タ^シ其痛^疼處眼底ノ一部ニ在テ牽張壓迫困重ヲ
カ子外ヨリ此ヲ推セハ殊ニ其増^スヲ覺フ故ニ光氣明亮ノ室
中ニ在ル中ハ其病益増進ス○患者此カタメニ光線ノ正直ニ
来ルヲ避ケントメ知ラス自ラ眉ヲ擧メ或ハ手ヲ前頭ニ置キ
半開ノ眼ヲ以テ物ヲ觀視ス

^註スウイ^クニ^エ國ノ人其地ニ氷山雪野常ニ此レ有テ其及
光ノ劇甚ナルカ故ニ正視スル丁能ハス皆觀視ノ癖アリ
其状殆ト此患者ト一般ナリ

患者讀書セニトシ若クハ微小ノ者或ハ光輝アル者ヲ見
ントスル中ハ視瞻速カニ^荒手トナリテ錯亂レ次テ疼痛
牽張ヲ發シ以テ速カニ其事ヲ瘳セサル丁ヲ得サルニ至ル
○虹彩ノ運動モ亦タ最モ敏銳ニメ光線^網膜ニ徹スル寸
ハ瞳孔直ニ縮小スル丁甚タ^レ是レ亦タ此病ノ明證ナリ○
光輝ノ眼ヲ刺戟スル丁已ニ甚^{ナル}キ寸ハ間々亦涙液欽損メ
乾燥スル丁アリ然レ是レハ甚タ稀ナル事ニメ多クハ淚
液分泌大ニ増進スル者ナリ^ニ
凡ソ此病ヲメ誘^レ發シムル所ノ遠因ハ假^令ヒ必シモ常ニ
皆然ルニ非スト^モ大率全身ノ衰弱ナリ○是故ニ此病ニ羅

此行脚无
空格ナリ
字在行尾

以下在次行
而与上不接
圈搥頭

ル所ノ人ハ病後及ヒ筋纖維ノ弛緩セル人ニ最モ婦人
ニ多シ○凡テ眼焮衝ハ急性ノモノ緩性ノ者ニ拘ラス治
後必ス僅微ノ刺戟ニ逢ト虫疳忽チ此病ヲ発シ易キノ
癖ヲ残ス其他久ク眼ヲ劇甚ノ光氣若クハ反光ニ暴觸
或ハ讀書ニ或ハ微數ノ物品ヲ見テ以テ強ク眼力ヲ費耗
スルハ皆此病ノ因トナル

註予自ラ実験スルニ麻疹痘瘡「エケイブセオ」クオントス

テイキニグノ眼焮衝モ亦タ治後ヨク此病ノ因ヲ残ス丁屨

々此アリ

視力之弱病ノ近因ハ予カ案ニ由テ之ヲ見ルニ是レ眼目一部ニ

限ルノ衰弱ニ非スノ却テ網膜ノ感觸非常ニ増進スル
而ノ其感觸増進ハ網膜若クハ脈終膜ノ焮衝ニ由テ其終脈
ノ盈張スルヨリ奈ス且ツ其両膜ノ中ヲ奚シカ一膜ニ焮
衝アル寸ハ他ノ一膜モ亦々必ス免ル、丁ヲ得カルカ故ニ此
病ニ於テハ大抵両膜共ニ焮衝スル
夫シ寒ニ冷ノ氣ハ健康ナル肺藏ニ吸入スレハヨク其運動
ヲ催進スト虫疳若シ肺藏焮衝スル寸ハ咳嗽ヲ發ノ刺戟
ヲ増スガ如ク光線モ亦適宜ノ量ヲ以テ健康無恙ノ網
膜ニ徹スルハ毫モ害ナレト虫疳若シ網膜焮衝スルカ或ハ
然ラスト虫疳モ牽張ノ感動シ易キ并ハ此ニ抵觸スレハ乍

又行脚有空
地而下不
接又无圈

予困重ニメ侵蝕スルカ如キ感覺
其光線ノ刺戟血液ヲノ既ニ盈脹セル脈絡ニ衝合シメテ益
々盈脹ヒシムトハナリ○日常ノ実験ニ由テ之ヲ見ルニ凡ソ
身体一部刺戟ヲ受ル丁アル寸ハ諸液爰ニ衝動輻湊ス
ル者也○又キルレシ各ノ説ニ曰ク凡ソ諸液度ヲ差テ一
部ニ盈脹スルハ多ク其体質ノ虛弱ナルニ由ル者ナリト
○又生活体ノ纖維牽張スル丁アルハ續テ將ニ如何ノ症
ヲカ発ヒ正ニ是レ疼痛ニ非ズヤ而メ疼痛ヲ強弱ハ必ス
其質纖維ノ剛柔ト其部ノ感觸銳鈍應スル者ヤリ
學者此三件ニ由テ以テ夫セハ剛力ニ能ク此病ノ本性

又以下在次行
而與上相接
又无圈

ヲ察スルニ豆ヲシ
視力之弱病ノ真症ハ實ニ網膜ニ於テ慢性熾衝病タル丁亦タ
内部頭水病ノ初発ニ於テ光氣忌避スルノ症ヲ発スルヲ以テ
モ確徴スヘシ此病頭水ハ其始ノ脳間ノ熾衝ヨリ発スル者ニ
其熾衝神視經ヨリ網膜ニ施及スト蚕丘其始メニ於テハ少
シモ眼熾衝ノ候ヲ見サズ結膜ノ脈絡盈脹セス實ニ此病
ノ始メニ舉ル諸症ト分明ニ其致ヲ一ニス○白内翳ヲ剔出
セル片毀傷スル処アルニ由テ深ク眼内ニアル所ノ膜ニ慢性
ノ熾衝ヲ起シ因テ以テ屢々発スル所ノ視瞻妨碍ノ症ヲ
以テ亦タ此病ノ本性ヲ明徹スル丁ヲ得ベシ

(註)「カウラニテル」人カ曾テ發明セル所ノ白内翳方術ハ
古来曾テ有ル所ノ者ト大ニ異ニシ能ク如此キ危害ノ症
ヲ免ルニ適當ス予自ラ屢々之ヲ試ルニ一モ其功ヲ誤ル
コナレ〇ステヘニヨシ著者^{即此書}カ白内翳ノ著書ニカウラニテ
ルスノ尺牘ヲ載セタリ其言ニ曰ク予カ術ヲ施スヤ其
始メ先ツ葎蓉^{原名ヘ}ノ溶液ヲ用テ十分^{ラドナ}瞳孔ヲ開カシメ
「ヘルツ」スリク^卷テ^{器械}若クハ自己ノ指ヲ以テ其眼ヲ保持
シカ^ナ所^ケ及運動スルコトヲカシメ而シテ其術ヲ施ス而
其針ヲ入ルノ目的ハ先ツ唯水具囊ヲ水晶液ノ前
面ニ於テ載開スルニアリ而ルニ水具液ハ其中央凸起セ

ルカ故ニ必ス収シク水晶液ヲ貫カサルコトヲ得ズト虫凡
心ヲ用テカ^{ナル}所^ケ及其針ヲ囊ニ^近接シ是故ニ針ハ最モ細ク
ノ扁ク両又アル者ヲ要ス実験ニ由テ之ヲ^観ルニ「シカル」^人
及ヒ「エイ」^等カ用テ^{液ト囊ト}針之如キハ水具体^{トヲ線}
針ヲ押し動かカスノミニメ刺貫スルコトナク却テ此レヲ^虹
彩ニ逼迫セシメテ能ク^強嫩衝ヲ^強登スルコト多シト^予予カ用
ユル所ノ針ハ銃ニ至剛ノ水具体モ能ク刺貫スルカ故
ニ未タ如此ノ害アルヲ見ズ而シテ水具液实体ノ方術
ニ至テハ時ノ宜キニ^強隨テ^強酌ス^強稀シハ唯其實質ヲ
截破ルノミニ^強擠下スルコトヲ要セサルコトアリ〇針ハ宜ク

△以下在次行面与
上不接又无圈

毛様鞅帶後一分許ノ処ヨリ剛膜ヲ貫テ水具体
ノ上部最モ柔軟ナル所ニ達セシムヘシ水具囊ヲ截分ツ
ヘキ症ニ在テハ間々ヨク其翳ノ實質既ニ自ラ溶解セル
モノアリ或ハ其囊ヲ截分ツ後テ獨リ自ラ溶解スルコ
トアリ而レ厄其囊ハ何レノ症ニ在テモ必ス截分タズニハア
ラズ△先天ノ白内翳ハ通例水具囊ニ在テ水具液实体ハ
胎内ニアル中ハ既ニ自ラ脈終ヨリ吸収^本取^作ラレ者ニ予
カ此症ニ施ス所ノ方術ハ前ニ學ルモノト異ナルコトナク其
主トスル所ハ唯其翳ノ中央ニ十分ノ孔ヲ開テ光線ノ
射入ニ妨碍ナカラシム^ルカ或ハ其翳ノ水様液中ニ溶解

消散スヘキコトヲ預メ察スル中ハ此ヲ微塵ニ破碎スルニ
右^在リ故ニ此方術ハ以前ノモノニ比スルニ針ノ運轉作用甚
タ容易ナリ^{以上サウニテ}ルノ尺牘○^テス^テヘニ^ニ此^法方^ニ從^テ方^術
ヲ施スト蚕尾稍差^フ所アリ即チ術後翳ノ吸収
遲鈍ナル者ニ刺戟劑ヲ用ヒ運動ヲ益シテ其吸収ノ
力ヲ強カラシムルト其針ヲ短^フメ細^クスルト是ニ此針ハ近傍
ノ部ニ毀傷疼痛熾^シ起スコト益々稀ニ^シ且ツ其本ノ圓
クメ且ツ^太大キカ^ヲ為^シ其針ノ周圍^ニシモ間隙^ナクメ水様液
及ヒ硝子液ノ溢出ヲ防^ク然レ厄此針モ亦至厚ナル囊
翳ヲ截分ツニハ尙^ラ未^タ十分ナラサルカ^ヲ為^シ彼^レ自

ラ又一種ノ細カヲ發明ス其カノ長ハ一寸許ニノ半バ
以端曲シリ其曲シル方四分許の間ニ又ヲ設ケ其幅大抵
五厘許ニ本ニ至ルニ從モ漸ク大カラシムルリールスリ
ガテ止前ニノ製衣モ亦タ少ク変メ其眼瞼ニ捺ル所ヲ大
ニシ一部ノ壓迫ヲナスコト少ナクシ眼珠ノ保持益堅固
キナラシム

右件ノ諸論ニ由テ此ヲ觀ルニ視力乏弱病ノ原因ハ眼内
ニ於ケル一膜ノ熾衝ヲ視神經ニ依テ眼内ノ網膜ニ波及スル
所ノ腦間熾衝カ或ハ白内翳施術後ニ發スル眼内ノ熾衝ニ
ノ皆其症ノ外部ニ見レザル者也

又ヨ字下有
又接上

至劇ノ光線モ亦タ眼ニ入テ同種ノ症ヲ起スモノカ將タ
然ラサルカ下條ノ解説ニ由テ之ヲ見ヨ

過度ノ光線實ニ網膜ノ脈終ヲ盈脹セシメテ以テ疼痛
熾衝失明等ノ症ヲ起スコトハアル也ノ未詳蓋シ就テ明カニ
徹スルニ足ル○其眼ノ感觸最モ敏銳ナルコトハミナ人ノ
知ル所ニ是其眼中黒液ノナキカ故ニ光線ヲ吸取スルコト
ク直ニ剥露セル網膜ニ暴觸セシムルニ因ルコト疑ヒナレ○此シカ
為メニ光線非常ノ射入唯々疼痛ヲ起スノミナラス血終ヲ盈
張セシメ由テ以テ眼底ニ濃紅色若クハ鐵色ヲ見ハス○而メ
其射入長ク保續スルハ其血終ニ血液ノ充積盈脹ス

ル^レ愈々増進メ遂ニ急盲原名ヨルトリンド登スルニ至ル

註「フリユメニバツリ」^リ人ノ書中ニ曰ク「アルビノス」ノ眼其虹彩

及ヒ瞳孔内ニ紅色ヲ見メ其感觸甚ク敏銳ナルモノハ

黒粘液ノ全ク^缺乏スルニ由ルモノ也○其書中又タ「ホニタ

エウ^{エウ}ス」^ス人ノ説ヲ引テ曰ク「盲者其眼ノ内膜黒粘液

缺亡シ由テ其感觸劇ク光輝ノ刺戟ニ堪ヘズメ登セ

ルモノヲ見タリト

夫レ砂地多キ南方ノ國及ヒ白雪ニ掩ハル、北方ノ地ニ於テ

盲者ノ殊ニ多キハ亦タ是日光ノ反照^照ニ由ルニアラズヤ

註光輝強キ物呂ヲ視ル^レノ已ム^レヲ得サルヨリ眼ニ至

大ノ害ヲ受ル^レノ最モ明ナル例トスヘキ者ハ東國ノ盲

人ニ「トム^ン」^ン人曰ク此ノ地ノ人ハ日光ノ高ク眼上ヲ照^照ス

避^避ケニカ為メニ下視メ却テ更ニ水氣ノ蒸^昇ト劇^レシキ

反照^照トニ其眼ヲ損傷セラル、者ナリト○赤道下ニ住ム

所ノ亜細亞人ハ晝間瞳子ヲ眼瞼内ニ隠クメ唯白膜ノ


ミヲ見ハスカ故ニ砂上ニ映スル日光ノ反照^照ニ其眼ヲ害

セラレズ又タ白雪多キ地ニ於テハ盲目ヲ以テ常病トス又タ

「エキセノホ^ニ」^ニ人ノ語ニ曰ク「セイ^リユ^ス」ナル人曾テ軍勢ヲ

他國ニ送タル片敷日ノ間深雪ノ山中^ヲニエカシメノ軍卒

ミナ白雪ノ光輝ニ其眼ヲ侵サレ或ハ全ク明ヲ失セルモ



貞按細網之誤
以下在次行
而于上不接

其感觸ノ缺耗ニ係ル○此病ニ於ル症候ヲ最モ較著ナル
モノハ唯ニ少シク距離セルルニ於テ明カニ物ヲ年別スルノ難キ
ノミナラス亦々隨時隨所ニ茫乎トメ視瞻錯乱スルヲ
致ス○眼目ヲ使フ丁強ケルハ忽々速ニ疲労シ少時間驗ヲ
閉テ摩擦スルニ非ハ再ヒ整復スルヲ得ス○瞳孔散大
強烈ノ光輝ニ逢フト虫ト運動甚々微ナシ或ハ全ク然セズ
然レ敢テ別ニ光輝ノ妨害ヲ覺ス譯者按細網眞ニ虛弱ナラサル
症ニ於テ瞳孔散大スル者在テハ光
輝ノ妨礙最モ甚クメ實ニ○此病ハ大抵中年ヲ過ルノ人ニ多ク且ツ
耐忍フカラガルナリ
眼鏡ヲ過用スルカ若クハ誤用シ之ニ兼ルニ身体ヲ衰弱
セシムルノ因アルヨリ発ス而シテ其病通例同症ニ止ル丁久シ

△垂的兒
亞爾箇兒再
綠卷油
筒滴ニ加
混和蒸餾ス
ルモノ

然レ此症ニ由テハ間々亦々其増進甚々速ニメ早ク十分ノ盲
眼トナルモノ也
此病視力衰
鈍病ノ療法ハ諸家種々ノ論說有テ各々相違トシ
凡今爰ニ一々枚擧スルニ違アラズ○其療法ノ最モ知ラサル可
ラサル者ハカ所患者ヲ及靜止ナラシムルト此病ヲ誘発シ易キ諸國ヲ遠ク
ルト之ヲ予自ラ實驗ニ由テ之ヲ觀ルニ此症多クハ難治ノ者ニメ予
カ此症ニ用テ功ヲ得ル所ノ療法ハ眼目一部ノ刺戟ナリ其法ハ即
チ越列吉的兒テルカ
ルバニ及ヒ蕃椒浸劑示赤或ハ發赤劑示赤ヲ
肩ニ施ス等ナリ此諸劑ヲ以テ眞ノ視力之弱病ニ施シハ唯
ニ功ナキノミニアラス或ハ却テ至害ヲナス丁アリ○内服劑ニハ

昌按之此盲眼ノ如キニ胃腸ノ積スルニ依テ発スルノ明ケシ

水銀劑ヲ吐涎スル至ラレノ兼テアル亜兒ニカ尼加及ヒ解疑疑ヲ諸藥ヲ与テ屢々功ヲ得タリ○又夕西面凸起ノ眼鏡ハヨク光線ヲ輻湊セシムルカ故ニ此症ニ用テヨク視瞻ノカ助ク

(註)予曾テ實ニ真ノ盲眼トモスヘキモノヲ真ノ視力遲鈍病ト察メ越列吉的兒及ヒ瓦カ把ニ施シ以テ大ニ功ヲ得シテアリ○或ハ説ニ云ク盲眼ノ一種視神經ノ痺ヨリ発メ其六痺唯腸胃ノ汚物ヨリ汲及スル者アリ故ニ唯其汚物ヲ疎滌ノ十分ノ快復ヲ得ルト又「ワ」ト欲カ書中ニ一種ノ眼病ヲ載タリ即チ其言云ク眼目衰弱ノ一症較著ノ原因ナク唯此ニ精氣強

又以下在次行而與上不相接

烈ノ刺譬ハ「カ」地ヨリ販来ル所ノ拔再撒謨「ロ」ト「地」製ノ亜的兒單量ノ砂糖ト水ヲ加テ用テ大効ヲ奏スル者アリ止又曰ク此病時トメハ他ノ刺戟劑ヲ用テ劇ニキ嫩衝ヲ発セシメ由テ以テ始テ眼内諸部ノ衰弱ヲ整復スルヲ得ルアリ止視力遲鈍病ト「カ」ウ「ロ」トモ亦夕大ニ差フ視力遲鈍病ニ於テハ「カ」ラウ「ロ」ノ如ク深ク眼底ニ見ハル、灰白色ト光沢アル真球色ト共ニ此レ無ケレハ也又夕痒嫩衝眼眼者按ルニ則ノ輕症一着眼ヲ以テ、實ニ視力之弱病ト同一ナルカ如キモノアリ「カ」ト「ロ」ト此兩症ヲ以テ同一病トセルカ故ニ予今此兩病ノ症候及ヒ治方ノ相異ナルヲ

衝眼ニ絶テコレナキ所ニメ度ニ両症區別ノ一大證徴也
或云ク痒焮衝眼ノ重症ニ於テ人々々々視力乏弱病極度ノ症
ヲ兼ルモノアリ医ノ能ク意ヲ注カサル可カラサル者ナリト
○然レ既ニ此ノ如キ重症トナルニ至ラハ背ノ焮衝腫脹既ニ著ク
毛腺ノ分泌液酷厉トナリテ刺戟スルカ爲メニ益々劇キ焮衝ヲ起
シ其焮衝脛縁ヨリ漸々結膜ニ及ヒ施テ遂ニ角膜ニ至ル○予
以爲ク此症ニ於ル光線ノ妨害ハ唯ニ波及ニ由ルカ若クハ角膜
感觸ノ至劇ナルニ由ル者ニメ真ニ網膜ノ疾病ヨリ起ルモノ
ニ非ス夫レ角膜ハ常ニ感觸遲鈍ナリト虽レ焮衝ニ由テ
ハ極度ノ感觸ヲ得ルニ至ルコト猶ヲ鞞帶軟骨ハ常ニ

知覺ナシト虽レ疾病ニ由テハ劇甚ノ疼痛ヲ發スルニ至ルコト
有ルト同一般ナル者ナリ

且ツ此症ニ在テハ少時間ノ視瞻甚々著明ナルコト有ルカ故ニ
亦々真ノ視力乏弱病ト爲ス可ラサルコト明ケシ而レハ前ニ
言ルカ如キ痒焮衝眼ニ視力乏弱病ヲ合併スルモノ全ク
無コト云フニ非ラス予モ亦々自ラ其症ヲ目撃セルコト屢々
アリ○但シ此合併ハ唯葉症ニ實ニ「ワ」レカ説ノ如ク兩
病同一ノ者ニハ非ス
兩病相異ナル所以ノ證徴最モ較手々ル者ハ其兼ル所ノ
網膜感觸症兩病同療法ヲ以テ治スルコトアタハサル也

視力之弱ノ症
速治ニテ水
銀劑ヲ背ニ施
シ毛線ノ△

即チ臉縁腺ノ輕嫩衝ニ効アルモノハ必ス視力之弱病ニ害アリ

註予曾テ一廿兒ノ此合併病ニ罹ルヲ見ル其始メ先ツ蟬

蛻法ヲ下臉ニ施シ此ニ兼ルニ他ノ強壯性過度ナラサル

滋養劑ヲ与ヘテ病態癒ニ由テ以テ十全ノ快復ヲ得

リ

右件ノ諸論ニ由テ予今視力之弱病ノ真症ト混雜錯并

シ易キ諸病ノ區別ニ於テ緊要ナルモノハ殆ト皆之ヲ尽セリ

故ニ次扁ニ於テハ將ニ予カ実験ニ由テ自ラ得ル所ノ適當

ノ療法ヲ示サントス

第三篇 論視力之弱病之療法

予カ此視力之弱病ヲ始テ見シ所ノ患者ハ其体質極メテ軟

弱且ツ其病ヲ得ルヤ文字至細ノ書ヲ讀テ非常ニ視力

ヲ費習字ヲ研精メ屢々夜ノ深キニ至ルヨリス者ニ○是ニ

於テ予以爲ク此病ニ於テ其細膜感觸ノ非常ナル是シ神

經カノ虚脱ヨリ起スル者ニト○故ニ鎮痙収斂ノ劑ヲ外

用シ強壯神經劑ヲ内用メ之ヲ防カントス然ルニ其劑唯ニ

効ナキノニナラス却テ害アルヲ見ル

覃心刺若メ種々ノ療法ヲ施スト愈厄終ニ一モ功ヲ得ル

コノナカリシカ故ニ始メテ從來定メシ近因ノ考按當ラサ

貞按細網之誤

又行脚无空地得字
如在行尾如字相接者

ルヲ疑ヒ再ヒ思惟メ以テラク此病ニ於ケル非常ノ感觸
ハ實ニ細膜若クハ脈絡膜ノ緩嫩衝力或ハ然ラズモ其血絡ノ
盈脹ニ因ル者ナラニト○此方按ヲ以テ「サウニテ止各適当ノ療
法ヲ問フ」彼レモ亦未タ実験ノ益キカ故ニ明カニ答ルヲ得
ス○是ニ於テ再ヒ前ノ考按ニ由テ以テ其療法慢ニ収斂
劑ヲ外部ニ冷用シ強壯劑ヲ内用メ眼ノ精カヲ増ス可ラス
唯宜ク眼ノ内膜ニ於ル血終盈脹ヲ減退シ兼テ網膜ノ感觸
非常ナルヲ鎮靜セズニハアル可ラズ而モ其患者既ニ碎去ルカ
故ニ終ニ此考按ノ当否ヲ試ムルヲ得ス
其後日ナラスメ同症ノ一患婦ニ招カル性テ之ヲ見ルニ他医

既ニ強壯劑ヲ用テ功ヲ得サルモノ○此時其視力ノ衰弱
既ニ殆ト甚シク燭火及ヒ尋常ノ日影ヲ見ルト虫疔大害ナ
キヲ得ス○其病ノ始メヲ尋ルニ自ラ常ニ燭下ニ書ヲ読
ミ画ヲ習ヒ及ヒ針縫ヲ事トスルヨリ發スル者○此時女レモ
痒嫩衝眼ノ候ナク亦タ結膜ノ血終毫毛盈脹スル
ナク其齡中年也ト虫疔其体質脆薄加之屢々分婉セルト
種々ノ疾病ニ罹レルトニ由テ大ニ弱セリ
強壯劑ハ他医既ニ其配合ヲ分量ヲ種々ニ用ヒ尽セ
ルニモ功ヲ得ルノ毎キカ故ニ未タ治例ヲ見ズト虫疔
カ考按ノ當否ヲ試定ニカ為メニ一種ノ療法施セリ○

其法先ツ蜈蚣六個ヲ取テ下賧ニ吸貼セシメ夜間ニ加羅藏
 爾女許ヲ与ヘ翌朝下劑ヲ飲マシメ朝夕加密列嬰粟尅
 二味ノ浸劑ヲ以テ眼ヲ湿シ能ク拭ヒ去テ阿芙蓉液製方及用
法共ニ身篇
 二篇ヲ沾貼シ昼間ハ鉛糖ノ點眼水二篇ヲ以テ洗ハシメ眼ヲ
 掩テ光氣ヲ避ケ清凉緩和ノ食用ヲナサシム○又夕其眼ノ乾
 ケルカ為ニ礶石破精ヲ後ノ第七篇ニ拳クル法ノ如ク用ヒシ
 ム○蜈蚣ニ由テ取ル処ノ血甚夕僅微セト虫疔患者衰弱ヲ
 覺ヘ翌日下劑ニ由テ発スル所ノ下利適宜ニト虫疔疲勞ヲ
 覺ユルヲ益々甚夕是レ其体質ノ薄弱ナルニ由ル○然レ下
 利後患者自ラ眼中ニ輕快ヲ覺ニ執ヲ且ツ稍強烈ノ光氣

ニ堪ルニ至レリ

自註或眼科家者ノ説ニ如此夕眼ニ近接ノ蜈蚣註ヲ施

スレ禁セル者アリ其説ニ云ク蜈蚣時トム著ク眼賧ノ腫
 脹ヲ起シ施微暫時ニ却テ眼ノ刺戟ヲ増ステアリ此

レヲ防カニカガ為ニ宜ク之ヲ顛顛ニ施ス可レ而ルニカウニ
 テル及ヒ予カ之ヲ眼賧ニ施セル諸症ニ施テハ皆功ヲ誤
 ルモノナク高且ツ玫瑰色ニ變ヒセントスルル熈衝ノ劇症ニ於

テモ芫菁膏ト同効ヲ奏スルヲ見タリ如之ニ眼熈衝ニ於
 テカ所及近夕之ヲ眼傍ニ施スト顛顛ニ施スト其効ヲ此
 較スルニ其優レルヲ遙カニ遠シ殊ニ眼賧ノ青斑或ハ

一時ノ失色ニ施後速カニ確砂精ニ阿芙蓉ト水ヲ加
テ洗ヘハ其効モ著シ
此ノ如ク予カ新タニ茂爾^明セル療法適^適当セルヲ愈々明ナル
カ故ニ高ヲ加羅^茂爾及ヒ下劑ヲ三四日毎ニ服用シ且其他
ノ諸茶ミナ懈怠ス可ラサルヲ諭シ由テ視カノ乏弱速ニ治
セリ其後唯阿芙蓉液ヲ以テ治サシメ強壯劑ヲ与ヘ時々催
下ノ丸茶^{大黃芍藥石饅}ヲ用シメ皓卷ノ點眼水ヲ与テ終ニ
全治ヲ得ルニ至レリ
其後一婦人未テ治ヲ請フ其齡二十五歳許其体質軟
弱ニメ感動シ易ク一二月前ヨリ視力乏弱ノ劇症ニ罹

ル其病ノ始メヲ尋ルニ久シク緻密^密ノ針縫ヲ事トスルト燭下
ニ読書スル^ノ多キヨリ茂スル者ニ

(註)口ウレト各ノ書中ニ云ク一患者針縫ヲ事トスルヲ
甚タニキヨリ瞳孔縮閉ヲ発メ盲トナル者アリ是レ細
膜ノ感觸増進スルニ因ル者ニ其虚脱ニ因ル者ニアラ
ス何者網膜虚脱スレハ瞳孔必ス最大スルモノナレハ
凡ソ如キ精細ノ事^業ハ大ニ眼ヲ刺戟メ血液ノ輻
湊ヲ發進スル者トシテレニカク一壯年燭下ニ読
書スルノ甚キヨリ劇甚ノ眼嫩衝ヲ發シ諸茶効ナク
終ニ生命ヲ墮セル者アリト

此症殆ト前ノ患者ト同症ナルカ故ニ同一ノ療治ヲ施サニ
ト欲スト虫疳其体質薄弱ニメ神經ノ感動強キカ故ニ
敢テ此ヲ為シ得ス先ツ試ニ強壯收斂ノ劑ヲ与フルニ毫モ
功ヲ奏セス是ヲ於テ意ヲ決メ蛇蝎四個ヲ眼瞼ニ施シ前ニ
拳ル諸劑ヲ与フ○此療法ニ由テ諸症ノ减退スルヲ前ノ
患者ニ於ケルカ如ク其功最モ著シ○患者自ラ云フ蜈蚣ノ
功ガ實ニ神ノ如シ以前先氣ニ向テ覺ヘレ所ノ劇痛唯
一回ニメ輕快スルヲ十ノ八九ニ至レリト故ニ予再ヒ之ヲ施
サス○朝夕阿芙蓉液ノ沾劑ヲ用ヒレメ點眼水ヲ与ヘ時々
催下ノ丸某ヲ服セシメ日ナラスメ餘症尽ク消散ス是ニ

於テ尚ヲ其再発ヲ防カガタニ強壯性ノ點眼水ト搥那ノ
肉服ヲナサシム後チ一二月ニメ未報メ曰フ視瞻已ニ十
全ノ健康ヲ得タリト○
此兩症ニ由テ之ヲ觀ルニ日常種々ノ方法ヲ施シ難キ諸
病モ亦タ瀉血下劑ニ由テ如何ノ峻功ヲ得ル者カ有ラニモ知
可ラス○實ニ此兩症ニ於ケルカ如キ峻功ヲ得ルコトハ予輩ノ
治術ニ於テ未ダ曾テ有ラサル事件ニ○而シテモ此真症ノ
網膜虚脱ヨリ発スル症ニ於テ此療法ヲ施サハ亦タ將サニ
如何ノ大害ヲ延ビ宜ク戒慎セヨ
而ルニ此療法此兩症ニ於テハ唯莫ニ精力ヲ脱セシム可ラサ

ル如キ薄弱ノ体質ニシテ適應セル功故ニ予全尚ラ此病
ノ近因ヲ明カニ徵セシカ為メニ亦タ薄弱ナラサル体質ニ
於テモ此療法ノ適應スヘキモノ也カヲサル治例ヲ説示
セントス○体質健強ニメ排泄劑汚血下劑ノ類ヲ用エト虫疝容易
ニ衰弱ス可ラサル人ニ於ル同種ノ視力之弱病ヲ同療法ニ
由テ同一ノ功ヲ得シモノ甚タ多シ
今一々其功ヲ得ルモノヲ枚举スルハ却テ益益ノ贅言ニ
屬スルカ故ニ唯二個ノ例ヲ舉テ之ヲ示サントス
千八百九年十二月一壯年キスノウリヤス給莫大小ヲ生業トスルモノ未
テ予ニ治ヲ請フ其眼視力大ニ弱メ日光燭火總テ光

氣強キ者ニ向ヘハ疼痛甚シク其末ルヤ病発後已ニ二週ヲ
経タリ○予詳カニ之ヲ診スルニ其眼中少シモ燦衝ノ外候
ナク又々毫モ毛腺病ノ症候アル丁ナシヨク諸症ヲ比較スル
ニ体質稍薄弱ニト虫疝健康無恙ナルカ故ニ此病ハ全ク
是レ唯一部ニ限レルノ者ナル丁ラ察ス○是ニ於テ以テ為ク即チ
是レ視力之弱病ノ真症ニメ其因莫大小ヲ造クルニ視力ヲ
費ヨリノ網膜若クハ脈絡膜ノ細絡ニ血液ノ輻湊スルヨリ
発スルニト○是故ニ先ツ蟻蚶六個ヲ下瞼ニ施シ夜ニ合テ加
羅蔑爾四氏ヲ子へ翌朝催下ノ散茶ヲ用ヒシメ朝夕先ツ
堪元本可ノ熱湯ヲ以テ眼ヲ洗ヒ次テ阿芙蓉液少許ヲ以テ治

○晝間一二回温ナル鉛溶水鉛糖水ヲ滴入シ其生業ヲ止メ
シノ肉食飲酒等ヲ禁シ綠色ノ帽ヲ以テ眼ヲ掩ハレム
○患者此教ヲ受テ去リ後一週ニメ再來テ云フ諸劑ニ
ナ大ニ効ヲ奏ス殊ニ螟蛉ハ施後直ニ輕快ヲ覺ヘ且ツ今者
患已ニ大ニ減退セリト○是ニ於テ予再ヒ復々加羅茂爾
ト下劑ヲ用ヒシメ高ヲ且ツ動脈ノ運動ヲ降鎮メ病勢ヲ
腹部ニ導カニカ為メニ吐酒石ノ溶液ニ暗厄利斯浮利塩
ヲ加テ隔日ニ飲服セシメ其他ノ療法ハミナ前ニ同フス○
其後今十四日ヲ経テ復々來リ謝シ云視瞻甚々明カナルヲ
常ノ如ク老氣ニ向テ毫モ害ヲ覺エス亦々疼痛スルヲナ

又無し以下在
次行而與上
不接

○是ニ於テ強壯性ノ點眼水ヲ与ヘ已前ノ方法ニ代フル
ニ機那ノ内服ト滋養ノ撰生方ト時々摧下ノ丸茶ヲ用
ユヘキコラテ論ス後今終ニ他ノ方法ヲ用ユルヲナク不日ニメ十
全ノ快復ヲ得タリ次ニ拳ル所ノ治例ハ益々能ク此病ノ症
候療法ヲ明ムルニ足ルヘレ
一壯年視力ノ乏弱ヲ病ムニ由テ今八百十年八月治ヲ予
ニ付詰此時已ニ疼痛甚々シクメ事業ニナ瘵スルニ至ル○
自ラ云カ兒タル時痘瘡ヲ患シヨリ以來時々此病ニ罹リ今時
ハ其瘵スルヲ既ニ二月許収斂劑及ヒ水銀劑ヲ外用
シ種々ノ方法ヲ施スト金匠ニナ切アルヲナクコトニト地名

一眼医ニ謀ルニ是レ痒焮衝眼ノ一種ナリトメ方法ヲ授
ク用テ亦タ功ナレト○予カ之ヲ診スル其眼ノ感動最モ
強ク光氣アルモノ殊ニ焮火ニ向ヘハ疼痛甚ク涙液大ニ流出
レ日光ヲ見レハ殊ニ最モ劇ク虹彩ノ運動甚ク敏捷ニメ
強ク身体他ノ疾病ナク眼中毫モ焮衝ノ候ヲ見ハサズ
亦夕毛腺病ノ症モナレ故ニ予以爲ク是レ明カニ視力之
弱病ノ真症トトメテニ奉ル下ノ或病益物類ノ其類ニ
自註予カ見ル所ノ視力之弱病ノ患者ミナ焮火ニ堪ル
ヨリ日光ニ堪ルヲ難シトス是レ恠ム可キニ非スコトウレ
ル
各ノ算ニ由ルニ日光ノカラノ焮火ニ勝ル丁母方千六百

六十四倍ナル者ナレハナリ
是故ニ直ニ蜚蝨六個ヲ下脰ニ施シ夜ニ入テ加羅蔑甬ヲ與ヘ
翌朝峻下劑ヲ用ヒシメ朝夕眼ヲ洗淨メ阿芙蓉液ヲ沾
貼シ習字等ノ事件ヲ止メ薄清奈ノ撰生法ヲ爲サシメ
昼間ハ綠色ノ帽ヲ被ラシメ頻ニ温ナル鉛劑ノ點眼水ヲ用
ヒシム
後三日患者未謝メ曰某効甚ク較著ニメ疾速ニ疼痛殆ト
消散シ光氣ニ堪ユルコト甚ク容易クメ妨害少ナク諸症敢テ
前日ノ比ニアラスト又曰蜚蝨ノ効殊ニ最モ著ク其施ス片
ハ乍ナ輕快ヲ覺ヘタリ止是ニ於テ予再ヒ加羅蔑甬ト下

劑ヲ与へ且ツ病勢ヲ腹部ニ導カニガ爲メニ吐酒石^〇ノ溶
液ニ純精^酒石ヲ加テ日ニ三次用^セルニム
後四日彼レ復タ来テ曰フ光氣甚タ強キニ非レハ已ニ
毫モ疼痛ヲ覺スルコト予之ヲ診スルニ虹彩ノ運動殆
ニト常ニ復メ其感動前ノ如ク敏捷ナラス〇此時予將ニ旅
行セニトス故ニ患者ニ教ユルニ下条ノ事ヲ以テ次ノ一週間
尚ヲ一回加羅^茂爾ト下劑トヲ用ヒ其時間絶ヘズ尚ヲ催下
ノ塩^下劑^{即チ吐酒石ノ溶液ニ純}ヲ服シ其後モ強キ光氣ニモ
全ク疼痛ヲ覺ヘサルニ至ラバ方ヲ變メ収斂性ノ点眼水
ヲ用ヒ茲^滋養ノ撰生法ヲナシテ機那ヲ内服ス可シト〇

後一二週ニメ彼レヲ見ルニ既ニ快復セリ此時約メ曰フ再々
スルコトアラバ復タ來ルベシト而ルニ後終ニ来ラス因テ懐フ
ニ其十分ノ全治ヲ得レド疑ヒナシ

爰ニ附録メ尚ヲ學者ニ示ス可キアリ強壯ノ患者ニ於
テハ下劑^{下劑}泻血ノ量宜ク衰弱ノ患者ニ於ルヨリ多カル可
ク衰弱ノ人ニ於テハ之ニ反スヘシ^他嫩衝ノ度ニ依テハ泻血僅
微ニト^他虫^部ニ導ク劑^{下劑}ニ兼テ
十分ノ治ヲ得ルコトアリ〇凡ソ此泻血下劑^ハ度ニ過テ多量
ナル可カラズ宜ク唯光氣ノ害ノ止ムヲ以テ度ト可キ

長門縣 醫學博士 齋藤 孝之助 著
二二

第四篇 揭示症候療法之證據

予今「ワ」此欲力書中ニ載スル所ノ此病ト全ク明カニ同一ナル症ノ治例ニ種ヲ引テ爰ニ揭示セバ予カ實驗ト施治ノ伴リ無キヲ証スルニ是ルヘシ何トナレハ其症候厚因子カ見ル所ノモノト同一ニシテ療法亦夕予カ施ス所ノ者ニ異ナラサレハナリ

今爰ニ引ク所ノ第一種ハ其書中ニ載スル所ノ第七種ニシテ題スルニ此教語ヲ以テスルニ病性全ク眼焮衝ヨリ発スルモノト相似テ明カナル外候ナク螟蛉法ニ由テ大功ヲ得ル所ノ視力乏弱病

此等有二空格而病性之句接其下又不落筆

而メ其言ニ云ク

一婦人三十許千七百九十七年東印度ヨリ来テ視力大

ニ衰弱スルガ為メ来テ治ラ諸フ此婦ハ久ク熱国ニ

住テ妊娠スル丁ノ甚ク多キニ因テ其体質甚ク羸弱

セリ詳カニ之ヲ診スルニ兩眼毫モ病状ヲ見ハサス〇以テ

ク是レ毛腺分泌液ノ酷厉トナレルヨリ発セル者ナリ

ト故ニ「ロ」ニシテ「ウ」ニシテ「エ」ニシテ「ト」ニシテ「サ」ニシテ「シ」ニシテ「リ」ニシテ「ユ」ニシテ「ム」ニシテ「フ」ニシテ「ヘ」ニシテ「ト」ニシテ「ナ」ニシテ「ル」ヨリ發セル者ナリ

療法尋常ノ痒焮衝眼ニ於ケルカ如クス而ルニ病勢收

シモ減退セズ〇是ニ於テ詳カニ其平常ノ摸生等ヲ

問フニ「初」ナル「伊」ハ曾テ此疾病ニ罹レリ螟蛉法ニ由テ

燭_下火_共視ル_了甚_夕難ク眼瞼_強弛_垂ノ指ヲ以テ掲クル
ニ非レハ角膜ヲ見ハス_了ヲ得ス之ニ兼ルニ頭痛間断ナク
其痛殊ニ前頭ニ甚シ而メ其時其衰弱疼痛共ニ既ニ保
続_心了_{三二}週ニ蓋シ_此女子ハ名譽ノ画エナリ_レカ故ニ以爲
ク是レ画ヲ研精スルニ眼カヲ費セルヨリ発スル者ニト
○其外貌眼瞼垂下ノ他_木十全_健健康ナルカ如ク皮表一モ疾
病ノ候ナク脉動常ノ如ク諸排泄_{大便}ヲ_三十全ニ試ミ
_了ニ_二グ_ウエ_ンチ_ムレ_トリ_ニム_ム軟膏ヲ施用スルニ毫モ効アル_了
ナク越列吉的兒ハ甚_夕和ラカニ施スト_虫却テ衰弱頭
痛ヲ増進_了強壯劑ハ内外共ニ他医既ニ之ヲ用ヒ予モ亦_夕

与テ僅微ノ輕快ヲモ見ズ○是ニ於テ予以爲ク是レ其
病ニ頭中ニ在テ其波及眼ニ_起如キ症ヲ起ス者ナラ
ニト因テ「サウニテルス」_各ニ謀テ共ニ試_了前_{頭疼痛}
最モ劇_ニキ_外ヲ_圓ク_載開テ_腦ニ_至止_{其載}開クヤ_創口
ノ大_サ殆_トコロ_ニ錢_ノ半分許_リニ_十虫_斤頭蓋_腎腦_膜
及ヒ腦質共ニ毫モ疾病ノ状ヲ見_サ所_ナレ○然_レ術_後大
ニ輕快ヲ覺_レ眼瞼自ラ開テ_光氣ノ射入前ノ如クニ疼
痛ヲ起サズ○如此ク治癒ヲ得ルモノ一週ニメ又夕再_發
ニ疼痛衰弱全ク前ノ如_レ此_時以爲_ク前_日外科_術
ニ由テ得ル所ノ輕_快ハ蓋シ失血ノナス_所ナラ_ニト故ニ試_了

蜈蚣三四個ヲ顛顛ニ吸貼セシムルニ果メ速功アリ之ニ
 由テ病患退クテ三日復タ頭痛再発シ其強キテ前
 日ニ異ナラズ故ニ復タ蜈蚣六個ヲ前頭ニ吸貼セシメテ
 大効アリ○治功^{三ナ}唯患者^部ノ近傍ニ於ケル浮血^個ニシ
 因レルカ故ニ爾後或ハ六個或ハ八個時トメ八十個ノ蜈蚣
 ヲ或ハ前頭ニ吸貼セシメ或ハ顛顛ニ施ス一週間ニ二回
 如此スルヲ十週許施ス毎ニ輕快著ク頭部ノ疼痛視
 カノ衰弱及ヒ眼瞼ノ諸症漸次ニ减退^シ三月間ニシテ
 全治ヲ得タリ
 按スルニ此症ハ内部眼焮衝ノ一症ニシテ上瞼弛垂ト頭痛

又此行脚有
 空地又无
 接
 上与下不

トハ其兼症之○凡ソ眼目ヲ過度ニ使役スル中ハ血液ヲ其
 部ニ輻湊^湊充積セシメテ神經纖維ヲ牽張セシメ以テ劇
 痛ヲ発スルヲ實ニ是レ当然ノ必理ニシテ即生活力固有ノ性
 ナリ○又タ其頭痛ト眼瞼弛垂トハ明カニ血^絡終ノ充張ニ因
 ルト疑ヒナレ予モ亦タ曾テ同因同症^病ノモノニ人ヲ見タリ
 又タ其強壯劑ノ内外相用テ全ク功ナキ者モ此病其部
 ノ弛緩衰弱ヨリ発スルニ非スメ而モ其因實ニ眼窠内ノ
 焮衝タルヲ明カニ徴スルニ^足是故ニ患部ノ浮血直ニ諸症ヲ
 减退セリ
 (註)蜈蚣法ノ視力乏弱病ニ即^速効アルヤ又我邦^{和蘭}

眼科医ノニセル止カ実験セル治例アリ亦タ以テ證トス
ヘシ即其話ニ云ク女壯ノ一田甚士体質健強ニ多
血ニ二年前左眼ニ視力ノ乏弱ヲ患ヘ適當ノ療法
ニ由テ治ヲ得^後後一年ヲ経テ^{千八百十}六年^{更ニ}復タ視力ノ衰
弱ト其感觸ノ非常ニ甚シキトヲ患フ而シモ疼痛アル
トナシ而メ其諸症精細ノ伎倆^使眼目ヲ便^使役スル^手日光
ニ^尚フ^切中ハ甚タ増進ス予此ニ^施施ス尋常^{此類ノ}諸症
ニ効アル諸劑ヲ以テシ強壯衝動性ノ点眼水ヲ与ヘ揮^泡
ノ精劑ヲ外用シ之ニ兼ルニ催嚏劑ヲ施シ^泡泡膏
ヲ耳後ニ貼シ總テ眼力ノ使役ヲ避ケ^{ムト}ムト^虫虫^トト

切ナク却テ諸症増劇シ瞳孔變動ノ縮張度^度ナク圓
形ヲ失メ非常ニ張大シ角膜其透明ヲ失スルニ至ル是ニ
於テ予更ニ方法ヲ換ヘ緑布ヲ眼ニ^掩掩ヒ^テステ^ヘニ^即此^書ノ
著ノ方法ニ從テ^蟬蟬^法法ヲ施スニ速ニ効アリテ終ニ十
分ノ全治ヲ得タリ^ト
右件掲^示末スルノ諸説明カニ以テ予カ此病ノ近因ヲ以テ眼内
ニ於ケル血絡多キ膜ノ^熾衝^腫腫^脹ニ在リトスルノ考按ヲ證
スルニ足レリ○予又タ「^アア^ヒヒ^シシ^テ」^欲カ^眼眼^病病ノ諸症ヲ纂集
セル一書ヲ得テ之ヲ読ムニ其書中亦タ幸ニ予カ考按
ヲ證スヘキ一症アリ曰ク

五六十歳許ノ一男子劇キ傷冷毒ニ由テ重症ノ疾病
ニ羅リ兼テ右眼ヲ病ム其症眼内前頭共ニ疼痛劇
ク光氣ノ射入大ニ妨害アルヲ覺ヘ瞳孔強ク縮閉ニ然
レ其外貌常ノ如ク收シモ焮衝ノ候ナク唯死スルノ
前ニ二日ニ至テ角膜始メテ透明ヲ失シ曇褐色トナリ
剛膜少シク焮衝ヲ起セルノ^部其死スル中其病ノ真症
ヲ明カニセシカ^部為ノニ之ヲ解剖シ見^ルニ角膜ヲ剥キ去ル
後ニ剛膜ノ一部焮衝メ血液溢^溢出シ脈^絡終膜微シク
腫脹メ已ニ化骨セントセルヲ見ル
此病其^{初期}初起ニ於テ微毫モ外候ニ變ナクシテ視瞻ノ感

觸已甚シク視力最モ衰弱メ全身ノ衰弱ヲ兼ルカ故ニ自ラ
是シ視神經ノ衰弱メ感觸非常ナルヨリ発スル^トノ臆^按ヲ
生セシムト^モ死後ノ解剖ヨク其^按ノ不當ナルヲ示シ明カ
ニ其病ノ本性脈^絡終膜焮衝ヨリ発スル者ニメ外部ニ其候
ヲ見^カル者ナル^トヲ證セリ○其病中ノ症候死後ノ解
剖^部豈ヨク予ガ考^按ノ視力乏弱病ハ唯ニ網膜ノ感觸病
ナルノミナラズ亦タ眼内一部ノ焮衝病ニトスルノ明證ト
スルニ足ラスヤ○^實ニ此病ハ一部ノ疾病ナルカ故ニ獨リ患者
ヲメ死セシムル^トノ無キヲ以テ如^ク死後ニ解剖^部メ其病
ノ位置ト本性トヲ明證スル所ノ他例ヲ見ス○^示イルリ

此節行首
皆落筆一格

此下有空地
教行又无

一人ノ書中人身ノ諸病ニ於テ解剖セル實驗ヲ載ル
ト甚タ多シト虫疳眼病ニ於ケル事件ヲ缺キ且ツ各答
ノ如クニ各ノ説ニ曰ク一語ニ於テ
予死屍ニ於テハ未タ曾テ内部嫩衝眼ノ症ヲ見シ
ナリ唯一回盲犬ノ眼ニ於テ之ヲ見シアリ其細膜血
色ニ殆ト黒色ヲ帯ヒ其状恰脈絡ニ於ケルカ如ク脈終
膜及ヒ葡萄膜ハ血絡ノ甚タ多キカ故ニ健康ノ人ニ於
テモ時トメハ血色ナル者アリ
以上予カ説ク所ノ者如此ト虫疳概シテ同病同症ミナ
必スシモ唯血ニ由テノミ治スルナリト決定スルナカレ

第五篇

論方劑

夫レ患部ニ施ス所ノ泻血ノ此病ニ於ケルヤ其速効アル
實ニ他ノ諸療法ニ卓絶メ且ツ予カ施ス所ノ療術ニ
此レヲ以テ主トスルカ故ニ今他ノ療劑ヲ説クニ先テ尚ラ一
回其効カラ示サントス○予既ニ一二年ヲ経ルノ重症ト虫疳
螟蚘法ヲ施メ直ニ速効ヲ得シモノ甚タ少カラス然レ明ナ
ル外候ナクモ荏苒持久ナル眼病ニ唯螟蚘ヲ施メ速効アリ
トスルトハ或ハ奇トメ信セサルノ人アラシ○予此症ニ泻血ヲ
施ス所以ノ者ハ唯眼内ノ血絡充脹メ緩性ノ嫩衝ニ羅ル
丁猶ヲ偶々結ニ緩性ノ嫩衝ヲ登シ其状官能ヲ変スル

了ナク荏苒^{荏苒}持久ナルモノアルカ如ク一般ニトスルニアルノ
三〇又夕血絡^脉痛^痛ノ症候モ此レヲ證スルニ足ラニ何者
脈^痛痛ノ症タル^其脈大ニ充盈膨脹スト虫疔常ニ較著ノ
患害ナク唯之ヲ著ク其膨脹ヲ増進セシムル所ノ刺
戟物アハ其膨脹ノ度ト其部ニ循レル神經ノ多少ト
ニ應^ニ多^ニ少^ノ劇痛ヲ^疾スルノミナレハナリ
憶フニ^未来^ニ夕^ニ蜚^ニ蛭^ノ効力ヲ明カニ知ラハル徒ハ或ハ云ニ全
身ニ精力強壯ノ候ナク眼ノ外部ニ^疾衝ノ症ナク結^結
膜ノ血絡充張セスニハ何ソ謾ニ蜚^ニ蛭^ヲ施メ血ヲ^減
スルノ理アラント^然疔^疔實驗ニ由テ之ヲ觀ルニ此病ニ於テ

亘ク外候ニ拘テ治方ヲ謬ル可ラサルモノニ〇凡ソ此病^志
ニ於テ蜚^ニ蛭^ヲ用ユヘキ無ニノ^微候ハ光氣^射入ニ因テ^疾ス
ル所ノ眼底^疾ノ疼痛ニ已ニ常ニ之ヲ用テ其症減ス豈其
効ナシトセコヤ
假令^令ヒ微ニト虫疔若シ蜚^ニ蛭^ヲ用テ輕快ヲ覺ユル可有ラバ
必ス預メ其功ヲ前言スベク患者ニ其病ノ必ス復治スヘキ
コトヲ告テ^歡觀^喜セシムヘシ〇而レ疔其蜚^ニ蛭^及ヒ顛^顛顛ノ角法
ヨク効アルニ習テ刺絡ヲナスコト勿ルヘシ刺絡ハ全身ノ血液
ヲ減亡スルカ故ニ危篤ノ衰弱ニ進ム恐レアレハナリ
下劑ハ眼^疾衝ニ於ケル一大貴^貴藥ニシテ其用甚タ廣ク今

古一般眼科家ノ但^俱ニ貴^{ヒツホ}フ所^ホ之^ホ○ヒツホカラス^ホノ語ニ云ク
下利善^タ夕治^タ眼^タ嫩^タ衝^ト此^タ語ヤ^タ實ニ萬古不易^易ノ論ニメ自
ラ^ホ實驗ニ由テ^ホ此^ホヲ^ホ觀ルニ自ラ^ホ登スル者ト^ホ医^ホ家^ホニ由ルモノト
ニ^ホ掲^ホラスニ^ホナ^ホ必定ノ^ホ偉^ホ効^ホアリ○^ホ学者ヨク^ホ賜^ホ胃^ト眼^目ト
互ニ^ホ相^ホ關^ホ應^ホスル^ト假^假令^令ハ^令小^令兒^令ニ^令於^令テ^令飲^令食^令不^令消^令和^化或^或ハ^或蛔
虫ヨリ^或一^或種^或ノ^或眼^或嫩^或衝^或假^假令^令ハ^令小^令兒^令ニ^令於^令テ^令飲^令食^令不^令消^令和^化或^或ハ^或蛔
ヘ^或諸^或下^或劑^或ノ^或ヨク^或諸^或病^或ヲ^或導^或去^或スル^ト其^或能^或ク^或腸^或胃^ニ腐^蓄
セル^或汚^或物^或ヲ^或掃^或除^或シ^或兼^或テ^或乳^或糜^或ノ^或吸^或収^或ヲ^或妨^或ケ^或腸^或内^ノ蒸^或氣^或
及^或ヒ^或諸^或分^或泌^或ス^或催^或進^或スル^ニ因^或テ^或全^或身^或諸^或液^或ノ^或量^或ヲ^或減^或損^或スル^ノ
理^或ヲ^或思^或ハ^或ゞ^或其^或ヨク^或眼^或内^ニ輻^或湊^或スル^血ヲ^或メ^或消^或散^或セ^或シ^或ム^或ヘ^或キ^或ノ^或理

亦^照夕^照昭^照ニ^照タ^照ラ^照シ○^照又^照夕^照血^照液^照ノ^照頭^照部^照ニ^照劇^照レ^照ク^照逆^照衝^照スル^照諸^照症^照ニ
於^照テ^照下^照劑^照ニ^照非^照レ^照ハ^照敢^照テ^照之^照ヲ^照鎮^照靜^照ス^照可^照キ^照モ^照ノ^照無^照キ^照ハ^照各^照人^照ノ^照能^照ク
知^照ル^照所^照ナ^照ラ^照ス^照ヤ^照而^照ル^照ニ^照或^照ハ^照各^照名^照譽^照ノ^照医^照輩^照之^照ヲ^照眼^照病^照ニ^照効^照ナ^照シ^照ト^照メ^照信
用^照セ^照サル^照者^照アル^照ハ^照亦^照夕^照何^照ノ^照理^照ゾ○^照ト^照ク^照之^照力^照書^照中^照ニ^照曰^照ク^照正^照ケ^照イ
フ^照也^照眼^照嫩^照衝^照ノ^照一^照種^照ニ^照於^照テ^照ハ^照下^照劑^照絶^照テ^照効^照有^照ル^ト無^照レ^照假^假令^令ヒ
他^照業^照ノ^照缺^照ク^照ル^照ニ^照值^照フ^照也^照敢^照テ^照之^照ヲ^照用^照ユ^照ル^ト勿^照レ^照ト^照然^照レ^照也^照傳^照染^照性^照
ノ^照眼^照嫩^照衝^照病^照ニ^照於^照テ^照ハ^照自^照カラ^照登^照スル^照ノ^照下^照劑^照ト^照由^照テ^照催^照進^照ス^照ル^照也^照
ル^照者^照ト^照ニ^照拍^照ラ^照ス^照下^照利^照ノ^照功^照ニ^照優^照ル^照モ^照ノ^照ナ^照シ^照ト^照云^照ヘ^照リ○^照按^照シ^照ト^照ク
ガ^照下^照劑^照効^照無^照シ^照ト^照云^照ル^モハ^照是^照レ^照謾^照ニ^照不^照適^照當^照ノ^照熱^照性^照下^照劑^照
ヲ^照与^照フル^照ニ^照因^照ル^者之^照何^照者^照熱^照性^照下^照劑^照ハ^照血^照液^照ノ^照運^照行^照ヲ^照催^照進^照
メ^照其^照運^照動^照ヲ^照強^照シ^照却^照テ^照刺^照戟^照ノ^照勢^照ヲ^照增^照進^照ス^照レ^照ハ^照ニ○^照是

故ニ下劑ヲ用ユルニ當テモ亦夕其方法宜ク戒慎セズニハアル
ヘカラス

古来諸医ノ内外眼焮衝ニ尋常施用スル所ノ下劑ハ三ナ其
用量ニ於テモ回數ニ於テモ甚々僅微ナリ〇而ヒテ預ノ必ス其
効アルコトヲ察セバ宜ク多量ニ之ヲ用テ過度ノ下劑ヲ起サ
レムヘク其効ヲ奏スルノ度ニ應メ數回之ヲ施スヘシ〇患
者ノ體質強壯ナル者ハ先ツ加羅蔑兒^{ニ安質波扭ノ末}
ヲ加テ多量ニ之ヲ与ヘ其後一時ヲ経テ葯刺巴ノ末適宜
ニ同量ノ純精酒ヲ加ヘ薄荷水若クハ大麦水ヲ以テ送下
セシム可シ其効ヨク稀薄ノ大便ヲ過多ニ排泄シ著シク

血行ノカヲ抑制ス〇體質薄弱ノ人ニ於テハ宜ク加羅蔑爾
ノ量ヲサ^サク^ヤシ^ラツ^バニ代ルニ同量ノ泻利塩ヲ^サテ^ナ葉ノ
浸劑ニ加テ用ヒシムヘシ得^但シ此^浸劑ハ香^窟水薄荷水ヲ以テ
製スルヲ佳トス

予實驗ニ由テ此ヲ觀ルニ劇シキ熱性ノ下劑ハ固ヨリ不適
當トシ余^凡而^レ甚々^タ緩性ニ過^ルル^ハ亦^タ効ナシ故ニ峻功ヲ
得ニトスル^ハ宜ク強カラズニ^ハアラス〇且ツ凡テ下劑ヲ用
テ^ハ初^ニ施^ス後^ニ三日ヲ経テ其^功カ^ヲ全ク^尽クル^時ニ至ラ
サル^ハ再^テ施^セサル^{コト}ヲ^世俗^ノ舊^習ナル^カ故ニ予ハ患者ノ
堪^ユル^ニ應^メ常^ニ一^頓ニ^多量^ヲ用^ユル^{コト}ヲ^ナス〇凡ソ下

劑ヲ用ユルノ標的ハ唯ニ全身血液ノ量ヲ減スルニ有ルノ
ミナラス亦多血液ノ復多ビ眼内細絡ニ充積盈脹スルヲ
防クニ在ルカ故ニ宜ク同時ニ清涼緩和ノ攝生方ヲ兼子ズン
ハアラス然レハ清涼稀釈ノ飲液ヲ過量ニ用ルヲハ之ヲ禁ズ
又右件ニ舉ル下劑ニ相交換ノ少量ノ吐酒石ニ緩下ノ
塩劑ヲ加フルモノ屢々回復用ヒ以テ不断適宜ノ通利
ヲ得セシムヘシ此療法ニ由ルヤ眼内ノ焮衝若クハ其脈絡
充脹スル諸症大抵復治セサルモノ無キ了是予カ實驗ニ
由テ明カニ知ル所ナリ
人或ハ以テク眼焮衝ハ諸症俱ニミナ偉効下劑ニ優ルモ

ノナシト雖モ其弊衰弱虛脱ヲ起ス了實ニ避ヘカラサル故ニ
亦タ恐怖セズニハ非スト而レモ其衰弱虛脱ハ唯是レ想像
病ニメ其害實ニ其病ノ長ク保続スルカ如ク甚ニキモノ
ニ非ス予カ觀ル所ノ視力乏弱病ノ真症ニ於テハ殊ニ然ル
ヲ實驗セリ○又タ此病ニ於テ或ハ瀉血ノ量ヲ甚微ニシ或ハ
全ク益ナシトスル徒ノ如キハ共ニ日ヲ同ヌノ論スヘカラス若シ
患者甚タ螟蛉ヲ忌嫌スル方爲メニ瀉血ヲ施ス了難ク而モ
病製過度ニ甚レカラザルハ偶々其症下劑ヲ多量ニ用
テニ由テ減退スルモノアリ然レモ其効瀉血ノ如ク迅速ナラ
ス其例一症アリ之ヲ左ニ舉ク

高貴ノ加比丹某年三十六視力之弱病ノ輕症ニ羅リ
来テ治ヲ予ニ請フ其来ル時既已久シク病メリ且ツ自ラ
云曾テ熱国ニ在ル片重症ノ間歇熱ヲ患テヨリ此病ヲ得
タリト〇此レニ論スルニ螟蚘ヲ下驗ニ吸貼セシムルヲ以テス
然ルニ他人ノ之ヲ譏テ益ナレトスル者アリト自ラ嫌惡ス
ルノ甚シキカ為メニ再ヒ来テ他ノ療治ヲ求ム〇予是ニ
於テ此病ニ唯下劑ノミ用ヒテ効アルヤ否ヲ試ニカ為メニ
夜加羅蔑爾多量ヲ用ヒ翌朝藥刺巴ト純精酒石ト
峻下劑ヲ服スルト一週間ニ三四ナラシメ朝夕眼ヲ洗
淨ノ阿芙蓉液ヲ沾貼シ毎日一二回温ナル鉛水ヲ以テ眼

ヲ沾シ唯此ノ蔬食ヲナレカ所及務メテ鮮明ノ光輝
ヲ避クヘキコヲ教ユ〇後八日ニ来ル其時眼ノ感觸著ト
ク減退ノ自ラ大ニ輕快ヲ覺フ予仍ヲ同療法ヲ用ヒシム
ルト十日終ニ強劇ノ光氣ニ向フト蚘ト少ノ妨害ヲ覺
ヘサルニ至テ苦味劑ニ緩下劑ヲ兼テ飲服セシノ収斂性ノ
点眼水ヲ与フ
病名ノ誤認ヨリ其療法ヲ謬テ危篤ニ至ルモノ也カラズ
何者視力之弱ノ名ニ拍テ其病ヲ一部ノ弛緩若クハ
衰弱ニ在トスルノ徒アレハ是故ニ人多ク此病ニ精カラ
強ノ運動ヲ杜ニスルノ劑ヲ与ヘ其眼ヲ洗淨スルニ冷水ヲ

以テノ温湯ヲ禁ス是レ温湯ハ弛緩セシメ冷水ハ収斂スル者
 ナル之〇然レニ實驗ニ由ルニ而テ冷水ニ由テ輕快ヲ得ル
 可アルハ唯是レ一時ノ輕快ニモ真ノ復治ニ非ス是レ其
 終極ヲ收縮ノ觸動機ヲ抑制シ疼痛ニ女間ノ休止ヲナ
 サシムルノ三故ニ其水ヲ患者ノ堪ル許ノ熱度ナラシメ蒸
 湯スル可朝夕十分一時の百二十分一余ニ至ルハ患者愈快緩和
 ノ感ヲ覺ル可久シク次テ眼内ノ感觸大ニ輕解ス
 予此病ニ温蒸湯劑トノ眼上ニ施ス所ノモノハ或ハ罌粟
 殼或ハ加密列或ハ白屈菜或ハ「オーゲントロリス」詳或ハ迷
 迭香等ノ浸劑ニ然レ此病諸藥實ニ功アル乎唯温湯ノ功

ナル乎未タ之ヲ明カニスル可得ズ但シ温湯ノ功ハ較著ハ
 メ實ニ缺可ラス唯諸藥ヲ加フルト加ヘサルトハ宜ク醫者ノ
 權ニ由ルヘシ〇實ニ芙蓉利斯ハ此諸藥ノ如ク忽ニ思フ可
 勿レ其浸劑ノ實ニ能ク視瞻感觸ノ強劇ナルヲ鎮靜
 減却スル可阿芙蓉劑ニ優ル者ニ未タ曾テ此劑ノ害アル
 ヲ見ス阿芙蓉ハ偶々害ヲナスコトアリ
 單味ノ温湯若クハ之レニ茶草ヲ加フル温蒸湯劑ハ固ヨリ
 此病ニ偉効アル可既ニ言ヘルカ如シト蚕疝而シ疝亦々下ニ
 擧タル所阿芙蓉液ヨリ其功カラ扶クル可ト實驗ス但シ
 實ニ芙蓉利斯ハ鎮痛ノ功力最モ強大ナルカ故ニ之ヲ用

實ニ芙蓉利斯
 鎮痛眼水劑

此四味横連
落筆一格

落筆一格
此處有空地
而與下不接

元井ハ敢テ此劑ヲ用ユルヲセズ
阿芙蓉液方

阿芙蓉 純粹者 雜腹蘭 各二錢 燒酒 以白拂良 斯酒製者

一引 蒸餾水七錢

右 調勻シ密閉セル器中ニ置クヲ六日濾過ノ液汁ヲ取ル

此劑ヲ用ユルノ標的ハ其鎮痙ノ功力ニ由テ眼目感觸ノ

過度ナルヲ減却スルニ在リ雜腹蘭ノ眼目ニ功アルヤ

唯之ヲ温浸劑トメ眼上ニ施スニヨク痛ヲ和シ過度

ノ感觸ヲ鎮靜スルヲ屢々試テ知ル處ニ阿芙蓉ノ

同効アルヲハ古来ニテ人ノ用テ日ク知ル所ナル力故ニ之ヲ

贅セズ○阿芙蓉 雜腹蘭 二味ノ治眼劑ハ古人モ往々

之ヲ用ユルモノ有テケルシユス 各力點眼水ノ方書中ニモ

罌粟殼ノ偉効アルヲ説キ亦雜腹蘭ヲ加ヘテ用ユル

ノ例ヲ出セリ○此諸茶ヲ取テ或ハ各別ニ用ヒ或ハ數種

相配合メ用ヒ種カ之ヲ試ルニ視力之弱病ニ於テハ一モ

前ニ擧ル阿芙蓉液ノ如キ偉効ノモノアラス此劑ハ

其用ル後少時間分時眼中ニ痛ヲ發スト虫尾次テ必ス

輕快ヲ覺ヘ眼ノ運轉自在ナルヲ得ル○又此劑ヲ白

拂良 斯酒ノ燒酒ヲ用テ再餾燒酒ヲ用ヒガル力故ニ

甚タ緩ニメ刺戟ノ性少シ○間亦タ此劑ヲ用ユル

ニ次テ淚液過多ニ流出シ微ク結膜ニ赤色ヲ發スル丁
アレヒ尋常ハ然ル丁ナクメ其功ヲ奏スルモノ
此病ニ於テ其感觸殊ニ最モ甚シク也^些微ノ刺戟ニモ
堪ヘ難キモノハ此劑ヲ用ユルニ宜ク戒慎^注注意セサルハカラ
ナルニ今其用法ヲ左ニ示ス
患者ヲ仰臥セシメ^テ少シク頭ヲ高シ眼瞼ヲ閉シメ此液少
許ヲ取テ内眥ニ注キ頭ヲ傾ケテ兩瞼ノ間ニ流シシメ眼瞼
ヲ上下ニ動搖ノ其内ニ滲入セシム但シ其瞼ヲ開クヤ宜ク
戒慎注意メ急卒ナラシムヘシ○又駝毛ノ筆ヲ以テ施
用スルノ法アリ左ノ如シ^注一手指ノ二指ヲ以テ輕ク

患者ノ下瞼ヲ押下シ以テ微^シク反張セシメ他手ニ筆
ヲ取テ其液ヲ浸シ横ニ其瞼ノ裏面ニ引キ直ニ指ヲ放^テ故
ノ如ク開サシムヘシ○此ノ如^キ法ヲ用ユルモノハ是レ唯角膜
ノ刺戟ヲ避ケニ力爲メニ而メ此兩法ニ由ルヤ其液ヨク眼
球ノ全前面ニ普達メ残ス所ナレ予カ^刺此液ヲ用ユルヤ
其量ノ多^ク少^クニ拍ラズ直ニ角膜ニ觸ルニ非^レハ未^タ曾^テ
一モ疼痛刺戟ヲ起スモノアルヲ見ス○人或ハ曰^フ予
カ此施用法ヲ示スヤ實ニ蛇足ニ屬スルノミト而レヒ予
屢々其用法ヲ知ラサル患者ニ此劑ヲ与ヘ彼レ自ラ眼ヲ
開キナガラ角膜上ニ滴^入入レ由テ以テ疼痛増劇シ大ニ

又此處有圈而
下文接其
圈

其功カラ害スルヲ見ル丁少カラサルカ故ニ爰ニ贅言ス
ルモノニ
其病月時ヲ経ル丁甚タ久シキモノニ於テハ前ニ舉ル諸
療法全ク効ヲ奏セサル丁屢々是アリ
如此ク非常ニ頑固ナル症ニ於テハ先ツ背泄劑ヲ用テ芫
菁膏ヲ頭上耳後或ハ肩脾ニ貼スヘシ其刺戟間断
ナク能ク津液ヲ滲出セシムルカ故ニ眼ノ病勢ヲ導クヲ
以テ偉効亦タ無比ナリ○予カ親友其曾テ習字ヲ
研精ノ夜學スルノ甚キヨリ此病ヲ得テ困苦スル丁
久シ一医之ニ強壯劑ヲ用ヒテ久日更メズ症候益々増

重ス是ニ於テ彼シ其醫ノ療法ヲ捨テ自ラ久シク暗室ニ
入り一二月間絶ヘズ芫菁膏ヲ背ニ貼メ癒ス丁ナク
因テ以テ終ニ全治ヲ得丁ナリ

第六篇

論點眼水

世醫ノ眼目ニ外用スル薬方及ヒ療法ヲ見ルニ謬誤ヲナス
 モノ甚ク少ナカラズ故予今「ホツマ」^人ノ考按ニ憑テ論説
 ヲ設^ケ以テ學者ニ示サントス○夫レ眼焮衝ノ初発ニ於テ
 収斂性ノ洗劑ヲ用ユル^トハ世人ノ一般ニスル所トシテ
 大ニ謬誤ニ屬ス故ニ乍^チ焮衝疼痛兩ナカラ共ニ劇ニシク
 増進ス而レ^テ其初発ノ時限ヲ過テ後ニ之ヲ用ユル^トハ
 必ス其偉効アル^ト全ク以前ノ害ニ反スル者^ニ○世ニ秘
 薬ト稱^スノ販^ル所ノ収斂性ノ一^種眼劑アリ其称譽甚
 タ高シ是レ眼焮衝ノ少シク時日ヲ^経テ強壯劑的当ノ時限

ニ用ユルカ故ニ其効力奇偉ナル^トヲ得ルモノ^ニ○世又タ此ヲ
 毳布^トトメ用ユル^トハ害ナレトス^ト金^ト予自ラ眼焮衝ノ初発ニ
 之ヲ用テ其功ヲ誤ル^ル者有ルヲ見ル^ト甚ク少カラズ或ハ此
 力与メニ膿腫ヲ角膜ノ膜間ニ発メ不透明トナリ終ニ不
 治ノ盲^ニ陥リ或ハ角膜ニ急性ノ腫瘍ヲ発シ破裂シメ
 葡萄^腫腫脹セルモノ等アリ之ヲ總凡^ニ眼劑ハ其時限ニ注
 意セズメ謬^ニ之ヲ用ユル^トハ必^ズ治ノ症ヲモ不^レ治ニ陥ラシム
 ル者^ニ豈^レ戒メサル可ケニヤ是故ニ予曰フ如此ノ療法ヲ
 施メ大害ヲ誘^ルカニヨリハ寧^ニ口拱手メ其眼ヲ全フセヨト
 凡^ソ収斂性ノ眼劑中其功皓蒼ニ若クモノナレ故ニ

此節落筆一格

若し眼焮衝ハミナ其部ノ弛弱ヨリ発スト云フノ臆折
ニ由テ唯収斂劑ヲ的當トスル中ハ眼劑ハ唯此ノ一味
ニメ足ルヘシ而シ巨屢々實驗メ之ヲ見ルニ先ツ排泄劑
浮血下劑ノ類ヲ用テ血終盈脹ノ力ヲ減スルニ非レハ必ス害有テ
殊ニ視力乏弱ノ症ニ在テハ最モ然ルヲ見ル○若収斂
劑ヲ用ヒサルコトヲ得サル症アル中ハ予ハ唯其血絡ノ力ヲ
減メ疼痛ヲ鎮メ兼テ能ク収斂ノ功アルモノヲ与フ
即左ノ方是ナリ

鉛糖一匁

右梅骨木花水一匁ニ溶カシ蒸餾醋一二滴ヲ加ヘテ清

澄ナラシメ用ユルニ當テ少許ヲ一小盃ニ入レ其盃ヲ沸湯中
ニ挿シ温メテ以テ用ユヘシ
前ニモ言ヘル如ク冷水ハ此病ニ大害アリ是レ角膜ノ蒸
発氣孔ヲ収斂メ閉塞セシメ眼球上面ノ血ヲ内部ニ
驅逐シ以テ既ニ充脹セル内部ノ血終ヲメ益々充脹セシム
レハナリ○故ニ温メテ用ヒセシム其功アルコトヲ察スル中ハ
日々數次回復メ之ヲ用ユヘシ

世ニ点眼水ノ種類甚々多クシテ其製造種々アリ或ハ

酸化金屬鉛糖醋類ノ總稱ヨリ製成ス或ハ刺戟解疑ノ功アル

散葉ヲ以テ之ヲ製成ス或ハ液類ヲ配合メ之ヲ製成ス而

ルニ液類偶々各自ニ之ヲ見レハ清澄透徹ナレハ之ヲ合ス
ル片ハ飽和メ其性ヲ変シ重濁ノ液トナツテ或ハ全ク
其功ヲ失スルモノアリ○世医一般ニ鉛糖ヲ常水ニ溶ノ
点眼水トスト虫尾其液稠濁ヲ鉛質ヲ多クハ速ニ沈^沈石
灰状ノ堆^堆トナル若シ此粗糲ナル沈^沈堆^堆眼ニ入テ角膜
ニ觸レハ其害豈ニ破塵ニ同シカラサテニヤ○時トメ
ハ阿芙蓉液ニ水ヲ加テ点眼水トセルモノニ於テ阿芙
蓉ノ萃^ハ爾^ル斯^ス特^トリ溶和セス眼肉ノ一部ニ固^ク着^キテ劇
甚ノ刺戟ヲ発スルコトアリ其質實ニ至微小ニ虫尾其
疼痛極^メテ劇^シトク之ヲ除去スルニ非^レハ必ス鎮静セサ

ル者ナリ

○无圖又此下
在次行而與
上不接

予又夕極末トセル實芙蓉利斯ノ浸劑ヲ布片ニテ濾
過スルコトヲ怠ルニ由テ如^此至劇^シノ害ヲ受^ル者ヲ見^レ
コトアリ○之ヲ要スルニ凡ソ点眼水ハミナ宜ク清澄ナル可
キナリ其清澄ナラシムルニニ方アリ其一ハ紙ヲ用テ濾過ス
ル之其一ハ各自適^的当ノ溶解茶ヲ加フル^ルニ^キ鉛糖水ニ加^レ醋^ノ如
其溶解茶ハ宜ク其本劑ノ効力ニ妨害ナク却テ善ク
扶助スヘキモノヲ撰用スヘシ^ルニ^ハ民^ノコ^ノス^ルニ^ハマ^カシ^ク
既ニ点眼水ノ一方^ニ鉛糖^ヲ示スト虫尾是レ唯其細膜
ノ感觸仍ヲ非常ニ強クメ排泄劑^前出^ラ用ユヘキ時

此等有空地
而與下不接
又无

此味横連
落筆二格

間ニ要ナルノニ若キ其療法相適應メ病勢既ニ
減退スル中ハ宜ク其絡脈ノ機能ヲメ故トニ復セシ
メニカ為メニ稍強キ収斂劑ヲ用ヒズニハアラス○若シ
然セサル片ハ其脈絡已ニ久シク盈脹セルニ由テ弛緩ス
ルカ故ニ血液再ニ充積ノ再発スルノ恐レアレハナリ
爰ニ的當セル点眼水ノ予ガ毎ニ用ニル所ノ者ハ皓蒼ノ
溶水ナリ其方皓蒼ヲ取テ之ヲ龍腦水ニ溶シ或ハ之ヲ
玫瑰水ニ溶メ瀉過シ用ユ○又夕効力尚ヲ之ニ優ル所
ノ一方アリ

録荖油 一瓦

蒸餾水 一瓦

此三味横連
落筆二格

此落筆一格
與下文接
雖接上文下
其行首之位
置則與此各
同不落筆

右能ク混和シ皓蒼一二瓦ト燒酒些セテ加フ

又方

刺必斯一瓦印歇爾一瓦那栗斯一瓦或

蒸餾水一瓦

硝石精一瓦或

有ニ空格

右調勻ス強壯性前ノ二方ニ劣ラス

此時限ニ在テハ尋常ノ井水モ亦効ナキナレ○但シ此
諸点眼水ニナ宜ク日ニ三四回冷用スルヲ佳トス

第七篇

論療法之餘義

視力之弱^病ノ原因ト療法トハ予既已ニ之ヲ論定セリ
 而ル^今尚^今ヲ説示スヘキコトアリ其眼仍^今ヲ光氣ノ妨害ヲ
 覺ユル間ハ宜ク患者ノ體質精カト其症候ノ微甚トニ
 從テ少量ノ蔬食ヲ斟酌^ニテ与ヘ全ク刺戟香竄^竄ノ
 飲液ヲ禁スヘシ^而然レ^レ已ニ強壯性ノ劑ヲ外用スルノ
 時限ニ至テハ宜ク直ニ攝生法ヲ轉メ強壯滋養ノ食
 料ヲ用ヒシメ^兼機那類ノ強壯劑ヲ内服セシメ^兼
 ルニ身体ヲ適宜ニ運動セシメ冷浴若クハ海浴ヲナサ
 シメ以テ十全ノ復治ヲ得セシムルコト最モ緊要ニ^也

此処有空地
而上下不接
又无^レ

眼目乾燥スルコト甚^タクメ眼窠内ニ輕キ困重ヲ覺^ユル
 コトアル中ハ^ガ莫^キ艾^タ答^リ利^ス末^スノ嚏劑若クハ^{細末}アリ^{コト}未^詳實
 艾答利斯葉^細ニ味等分ノ嚏劑大ニ輕快ヲ覺ヘシムル
 者ニ是^レ能ク鼻涕膜ノ分泌ヲ催進シ兼テ大ニ眼目ノ
 細絡ヲ開達スル効力アルニ因ル^ル而ルニ古来未^タ曾^テ
 實艾答利斯ヲ嚏劑トセルノ例ナキ者ハ蓋^シ此^ニ艾^タ答^リ
 偉効アルコトヲ知ラサル者ナリ^也
 實驗ニ由テ之ヲ觀ルニ此劑ハヨク其時ヲ失ワズメ施用
 スル中ハ睡眠ヲ催進スルコトナクメ強ク稀薄ノ鼻涕
 粘ヲ分泌セシム

眼目ニ外用スル所ノ諸藥其種甚々多シ就中礮砂精
 八角膜ニ功ヲナス丁丸^最強シ其施用方ハ口狹^狹キ長
 礮^礮ニ熱湯ヲ入レ此レニ此ノ精一茶匕ヲ加ヘ頭ヲ其上ニ
 俯レ以テ其蒸氣ヲ眼ニ受ケレメ或ハ口潤^潤キ硝子礮^礮
 ニ此精^三ヲ入レテ此ヲ熱湯中ニ挿^挿ニ其礮^礮口ヲ眼ニ
 接セシムルナリ○其蒸氣^{蒸氣}發出メ直ニ眼ニ觸ル、并^忽忽々劇
 キ刺戟ヲ覺ヘテ淚液^果夥シク流出シ隨テ眼中ニ著キ
 爽^快快^快ヲ覺フ
 頑固ノ症ニ在テハ加羅蔑爾^{半氏或}計^{ケル}爾歇兒^ル許^ル丸
 茶亦々偉効ヲ奏スル丁アリ是ヨク細絡ノ閉塞ヲ

開達メ其中ニ鬱滯スル毒ヲ排除スルニ由ル但シ此丸茶
 ヲ用ユルノ間ハ宜ク時々下劑ヲ兼用メ吐涎ヲ防クヘシ
 予尚^予此篇ニ於テ贅說セサル可ラサル最大ノ要事ハ凡テ
 此病ヲ誘発スルノ諸因ヲ避クヘキナリ即チ讀書習字
 針縫日光燭火白雪ノ反光等^分其他凡テ未々十全ニ全
 治整復セサル眼目^刺刺戟ヲ起スヘキノ事件ハ皆之ヲ避
 ケレムベシ○劇症^在ニ在テハ唯ニ此事^件ノミナラス光輝
 アル者ハ宜クミナ全ク之ヲ避クヘシ然セサル井ハ施ス所ノ
 療法適当ノ功ヲ奏セス
 且ツ其病尚^日日ヲ經ル可^久久シカラス其因唯常ニ習慣

又此節
落筆一格

セ^サル過度之^ノ光氣ヨリ^ニ発スル^ニミ^ニノ父母ノ遺毒^遺アル^ニ
モ非ス亦夕前^{サキ}ダテル眼病有ルニモ非サル^ハ唯其誘^サ発
ノ因ヲ除去スルノミ^ニメ十全ノ復^レ治ヲ得ルモノ屢々
此レアリ○予頃日一小冊子ヲ得テ之ヲ讀ム^ニ此ノ例
トスヘキモノ二症アリ擧テ以テ^徴トス
一女子故^{モト}ト田舎ニ生レ故アツテ居ラ都下ニ移ス^ハ
眼内疼痛ヲ発シ視力減耗ノ石壁ニ反影スル日
光ヲ視ル^毎毎ニ其疼痛必ス増進ス是レ其患者ノ患
トスル^所処ノモノ即チ其病ノ本因^ニ何者其眼故ト
郊野ノ蒼々タル^ト慣レ^レ今始メテ都下ノ石

又此处有空地

壁ニ映スル日光ノ非常ナル^ニ逢フヨリ^ニ発スル者ナレハ^ニ
故^ニ其窓前ニ小橙樹ヲ植ヘ^レメ^ニ反照ノ光氣ヲ遮リ
掩^ハシ^ハ止^ム其眼實ニ盲タラントセリト^モ虫^ハ唯此一方
ノミ^ニメ他ノ療法ヲ施ス^トナク卒ニ全治ヲ得タリ^ト
若シ此症ニ於テ其^原因ヲ知ル^トナク患者尚久シク光氣
ニ暴觸セバ其血ノ眼内ニ衝入スル^ト益^ハ已甚ニメ卒ニ
此書ノ始メニ擧ル^ル如キ諸療法ヲ尽ス^ニ非レハ治ヲ得サ
ル^ニ至ル可シ而ラ幸^ニ早ク光氣暴觸ヲ避ケ^レカ故ニ復
治ヲ得^レモノナリ
次ニ擧ル^ルノ症ハ尚ヲ益ニ^徴候^ニトスル^ニ足レリ

此節落筆一格

一儒者其^其「バル」ル^地北^北辺^北ニ住ス其家^全ク日中^正
之陽光ニ向ヒ後室ハ窓外ニ高墻アリテ室中甚
夕暗シ彼^レ常ニ^此室中ニ書写^等事^件ヲナシ唯
食時毎ニ前室出テ、鮮明ノ光氣ニ向ヒ其視瞻漸ク
衰弱メ眼内漸ヘス疼痛ス故ニ彼^レ自ラ眼鏡ヲ
用ヒ眼科医ニ謀テ療治^法ヲ用ユミテ功ナシ而メ其
症^毎ニ前室ニ出ル^殊ニ日中ニ於テ増進スルカ
故ニ彼^レ自ラ其因ノ此ニ在ル^ヲ察シ速カニ居
ヲ他ニ移シテ且ツ燭下ニ書写スル^ヲ止ム是ニ由
テ其病速ニ全治セリ

○又夕学者ノ最モ注意スヘキ例ニメ世人ミナ其事^トヲ
知^レモ其理ヲ知ラサル者アリ^レ往年吾都下ノ衆^衆馬盲トナ
ルモノ甚タ多シ^レ當時ノ人以為ク是^レ其^既處ノ暗^處ニ在ル
ヨリ發スル者ニ暗ハ眼ヲ害ス宜ク明處ニ移スヘシト遂ニ然
メ後子盲馬^少ク其利今ニ施及セリ是^レ即^レ常ニ暗處ニ
在^レ光氣ニ慣レズ偶々出テ卒^ニ光氣ニ觸ル^{ヨリ}メ然ルニ非
スヤ而ルヲ今世俗ノミナラス^吾徒ノ人モ知ラスメ意ヲ此
ニ用ヒス自ラ眼ヲ損害スルモノ多キハ何ソヤ
如此キ不用意ノ因ヨリメ視力乏弱病ヲ受ケ或ハ終
ニ全明ヲ失スルニ至ルモノ甚タ少カラズ○而ノ其病夕

ル生シ易シテ治シ難キ力故ニ秋毫モ視瞻ニ病患アリ
トヲ覺ル中ハ宜ク配意慎戒メ僅少モ眼ニ害有二ト
スル所ノ者ハカ所^{ナルタケ}及及恐シ避クヘキ之○凡ソ視瞻ヲ
能ク保固セントスルノ徒ハ読書習字針縫^等亦其他
止ム^トヲ得ス^メ微渺^渺ノ光^輝アル者ヲ視ル^トアル^中ハ
務メテ其明ヲ適宜ニメ強カラシメズ^{弱カラシメズ}殊ニ明暗急^卒ノ變
換ナカラシムヘシ^{ハ強光ノ害}
且ツ夫レ弱光ノ害ニ比ス^{ルニ}甚タ少ナク唯其害不明ノ
處ニ視カ^ラ竭^竭ノ至微^細ノ物ヲ視ル^中ニ在^ルノミ而シテ強
光ハ常ニ其害多^ク或ハ全ク明ヲ失セ^ルムニ至^ル者アリ

以下在次行
而與上承接
又无此圖

○視力差^ヤ弱キ人ト虫^凡右件ノ戒ヲ善ク慎守ル^中ハ生
涯尚^ラ十分ノ明ヲ保ツヘキニ或ハ之ヲ守^ラズ加^如之ニ黄昏ノ
時^少シ^シメ^ク餘暇^暇ヲ各^各事ヲ成^シ終ニ早ク明ヲ失ス^ル者多
シ豈^レ慎マ^ハル可^シマ^ヤ○然^レニ患者止ム^トヲ得ス^メ間断ナク其
眼ヲ使役セ^ハル可^ラサル^中ハ宜ク明暗共ニ過度ナ^ラサル^室ヲ
擇^ミ且ツ其事ヲ成ス^ノ間絶ヘ^ス所謂^ル禦鏡^{原名ベウ}
害^ヲ禦^クク^ノヲ用ユ^ヘシ綠鏡ヲ用ユ^ルト^ハ其由^テ来^ル所^久
フ^シ其眼ニ利^巧アリ^トス^ルト^ハ實ニ古来^一般^人ノ言^フ
所^ナレ^ニ實^ハ然^ラズ^ニ
夫^レ春日綠野ヲ望ムト夏日ノ砂地冬日ノ山雪日

中ノ反照ニ向フト眼中ニ覺ユル所ノ爽快其レ愛^美シカ優
レ^ル實ニ卅木ヲノ綠色ナラシムルハ是レ造物者ノ賜モノ
ニ〇而ルニ綠色ヲ視ルト緑ヲ貫テ見ルト大ナル別アリ
學者宜ク知ラサル可ラサルニ〇今緑鏡ヲ用ユルハ即チ
緑ヲ貫テ視ルナリ此鏡ニ由ルヤ其物色較然タラサルカ
故ニ視カメ^ヲ費^ス又^ス丁實ニ白鏡ヲ用ユルヨリ大ナル丁固ヨリ
疑^ニナク且ツ之ヲ除キ去ルニ當テヤ眼ニ入ルノ光線度
ヲ違フ^ヲ亦タ甚タ汝カラズ〇尚且ツ加之ニ今用ユル所
ノ緑^鏡ハ其面ノ凸ナルカ為メニ光線ヲ眼^内ニ聚入スル丁
多クメ視瞻ヲ害スル丁予自ラ屢々試^テ明^カニ知ル

所ニ〇是故ニ此鏡ハ唯赫灼タル日光ノ劇甚ナルヲ掩フ
ノ器ニ代フルニ足ルノミ然レ^ニ此^レニ相^當ノ器アリ何代用
ノ者ヲ求ムル丁ヲセ^ニ唯其眼過度ノ刺戟ト非常ニ
視カヲ費ストヨリ直^真ニ衰弱スルノ已甚ナルモノニ於テハ
此ヲ以テ禦鏡トス可シ〇凡ソ視力之弱病ノ直^真症ニ
於テ用ユヘキ眼鏡ハ宜ク之ヲ用ユルノ間ニ於テモ之ヲ去
ルノ後ニ於テモ此^レ女ノ疼痛モ發セズ亦タ疼痛^状ノ感
觸ヲモ起サルモノヲ佳トス〇総テ視ル丁ヲ大ナラシムル
鏡ハ用ユル丁ヲ禁ス是レ其網膜ノ感觸過度^メニ光
線ノ強ク聚合シ来ルニ堪^ハサ^レハ是故ニ予ハ唯

此処有空地
而手不接
又无

正平而^面白鏡ヲ用ユ
近來視學家又夕一種^巧の禦鏡ヲ發明是レ綠白
二鏡ヲ用ユルモノ其製^巧機ヲ尽^{メシ}ヨク劇甚ノ光
氣ニ向フモ疲勞甚シキ眼ニモ此^此少ノ妨害アルコトナレシ
此書ノ著ヤ是レ予ガ自ラ實驗シ考按スル所ノ者ヲ
以テ廣ク學者ニ示サントスルノ老婆心ニ而ルニ近頃聞ク
予ガ弟^弟一板ヲ鏤行メ出セルヨリ以來四方ノ學者幸^取
信用スル者多ト予ガ歡ビ豈塵^取少ナラニヤ
學者ヨク此書中ニ記載スル所ノ症治ト經驗トニ由
テ參考工^夫セハ能ク眼病治療ノ誤謬錯舛ヲ免

ル、コトヲ得ヘシ○凡ソ眼目ノ疾病ヲ療セントスルハ常ニ
必ス精詳ニ注意メヨク症候原因ヲ穿^鑿金^鑿シ以テ法^治方ヲ
誤サラニコトヲ要スヘシ○夫レ他ノ諸病ニ於ケル誤治ハ尚ヲ
早ク其方ヲ^改革シテ能クカヲ竭サバ幸ニ復治スルコト
ア^レレ眼目ノ疾病ニ至テハ一タヒ其治ヲ誤ルコトアレハ生涯
不治ノ病ニ陥ル者其例少カラズ學者其レ之ヲ慎^ヨ
此書ヤ實ニ其論說^狹隘ニト雖^レ當今未全備ノ
醫學ニ於テ恐クハ少シ^メ缺ヲ補フコトアルヘク且ツ世
間眼病^疾ヲ患フノ人ヲメ無^招替ノ庸医販^災鬻ノ徒ニ
其眼ヲ委子テ危^招險ヲ招クノ^災害ヲ免レシムルニ足

