



橘家腹候録他  
嘉永元年

官永正純字



橋本腹診録

全






第一九五勺ノ水ニ緑丹精ヲ一勺ニ和シ  
無花果ノ末ヲ除クニ投ス六沸涇ス  
ル心尤手ヲ止メス攪拌スハニ諸粘  
滑液ニ至レハ九勺ニ三位ノ水漸々ニ  
度モ入ヘシ沸除シ止メハ沉淀至  
リ羽ニ重ニテ瀉澀ニ又沉淀シ至紙  
廬シユキヒラニテ又火ヲカケ泡上  
膜ノ生スルヲ伺ヒ猶且大上至ノ丁  
女時所放冷レハ時益突ニ白色ノ  
膏ヲ結フ紙ニ子コニ大阻晒残液廬  
穴上ニ安至スル丁前ニ同ニ終封貯

△ッポル  
先緑蓉類是ヲ至イリ又別ニ塩類是  
モ至イリ硝石類十合能ヨクハクク  
イキ類ト合ニテ又スリ合サレウ雪  
杆ニ入蓋ノ直キニ穴ヲ明リ紙ヲ以  
テイリ所リコリ蓋大ニ戸燒十リ  
△ト  
ルシス方ハニニニニニニニニニニ  
前方出來上リニテ取テス外任キト  
マゼルホド合下地ニ引ヨカ久  
△カ  
白キヲ望トス  
カ  
ルメルノ方

△ 枚	△ 魚	△ 鹽	△ 酢
更爾 瘡腫 痛良 因愈 症在 外聖 某	灑取 母即 主是 良愈 痛愈 症擬 造傷 損疼 痛	鎮石 動明 解骨 熱清 毒一 七日 打碎 去紙	酢手 合是 ヤキ ン方 口合 菜後 入

△ 物	△ 右	△ イ	△ 心	△ 停	△ 坪	△ 右	△ 食	△ 硝
入能 ク溶 餅	日味 酢蜜 ト入 五外 入	酢合 録青 此合 古合 二合 合	紆二 ナ水 飛ス 心	以十 入ソ イ水 リ重 坪入 煮	入能 煮其 ソ孟 水ト 云之 是ハ 礪	塩答 ノ二 味夕 能イ リ右 回味 夕雪	食塩 ハ十	硝石 ハ十 緑答 ハ十 水銀 ハ十



鐸 去 淨 內 壺 蜜 封 經 久 力 可 心  
 落 都 掃 漢 斯 蜜 封 經 久 力 可 心  
 主 治 鮮 毒 潤 液 緩 筋 退 疼 造 方  
 甘 中 焙 以 水 三 百 以 水 六 百 煮 取 三 百 再  
 煮 以 水 三 百 以 水 六 百 煮 取 三 百 再  
 面 汁 復 煮 候 稍 凝 內 日 出 未 百 膠  
 筋 四 十 支 復 以 文 火 煮 落 水 凝 堅 力  
 玉 筋 四 十 支 復 以 文 火 煮 落 水 凝 堅 力  
 亞 迦 方 療 大 人 卒 厥 小 兒 祭 狂 或  
 的 里 亞 迦 方 療 大 人 卒 厥 小 兒 祭 狂 或


疫 毒 癰 邪 或 頭 痛 疼 咳 或 吐 下 痢 或  
 痘 毒 酒 毒 或 胸 間 痞 悶 肉 痠 疼 痛 苦 烈  
 煎 者 湯 加 醋 送 下 若 厥 冷 者 煎 湯 加 燂  
 耐 煎 者 湯 加 醋 送 下 若 厥 冷 者 煎 湯 加 燂  
 蝮 蛇 燒 罽 耐 燂 三 日 去 頭 生 活 者 浸 暖 內 瓦  
 壺 紅 花 縫 合 內 土 器 溫 泥 蜜 封 以 炭  
 火 燂 一 伏 時 為 度 又 聚 接 蛇 膽 製 造  
 其 力 最 佳 之 品 心 大 薊 根 三 十 皮  
 干 附 沒 菜 十 煎 山 十 煎 皮  
 甜 椒 沒 菜 十 煎 山 十 煎 皮  
 草 菱 雞 舌 香 木 香 意 腦  
 草 菱 雞 舌 香 木 香 意 腦











馬寶

主効通膀胱降逆氣

仙實

主効和骨節解骨痛

燈心

主効通尿管清膀胱又引逆氣

陵霄花

主効通尿管清膀胱又引逆氣

續命

主効和神經清肌絡通胸膈溫胃腸

牽牛子

主効驅胸間積糲液浮厚腸不

管實

主効破瘀血深瘵液或碎虫塊

合

升水丹服方

蜂窠

石酒九十六戈可投為酒劑用一七日

或氏散而良心○禁物醋酒油膩房事

浴水灸事

右下疳便毒楊梅瘡淋痔漏馬刀瘰癧

癰骨疽脫骨疽無名惡瘡濕毒來鷓膝

骨不交義瘡療輩用叶菓羊月或一月

二月而至治服之不及他某諸病奇良

心又安菜依症忌苛用可誠之

服。當作振。

忌症者、產后風寒外邪、吐血衄血、金瘡、  
疥疹、瘡癤、總而上有血証者、皆禁與汞、  
○服后、瞑眩、良惡辨、穢物下痢、便膿、  
血者、大良、右續可服藥、發疼、小良、口中  
腐爛者、良善、右証止服、胸中不利者、吐  
逆者、服痛者、右三症、副三黃湯承氣之  
美、續可服、頭痛眩暈、甚者、凶、俾服五作  
痿弱、古不者、大凶、吐血者、大凶、二症、急  
可用解毒劑、  
解毒劑、  
右一、艾、細末、冷水以服之、

△又方

綠草大、藍葉中、青黛小、  
右三味、水煎、冷服、右二、方、療、暈眩之、諸

△又方

三黃加綠豆、  
藍葉大、石榴、石羔、  
黃連、枳、  
右七味、水煎、冷服、或石羔、水、又良善、○

△又方

暈眩、口中腐爛者、聖良、綠豆、青黛、藍葉、  
其三、棹、心、不可、聞、之、

有傳字之誤矣

△汞制服捕陰調血等一之、五十日可忌矣、

○拾遺

△小兒胎毒小兒腹滿青筋者四時瘦

三黃加甘汞凡言

大黃一錢 黃連一錢 黃芩一錢

日汞五分 右搗丸、日白三分、至五

分或六分、一月回効、亦批虫痔疾等良

○葛魯墨兒十二方

△第一方 主治癩毒及腐敗潰瘍

濃汞二十 大黃 右研和而合八貼、一日用二貼

右研和而合八貼、一日用二貼

△第二方 主治小瘡疥癬、總而皮膚病良効

濃汞十五 硫黃一錢 白砂糖半

右三味、研和而合八貼、一日用二貼

△第三方 主治黑心内障、用瞳子散大

或時刺痛者 烏頭十五 竜腦十

濃瀕十 白砂糖一錢 右四味

△第四方 主治百日咳及經久之喘急等


之症 白砂糖一錢 白砂糖一錢

濃汞二十 白砂糖一錢 白砂糖一錢

白砂糖一錢 白砂糖一錢 白砂糖一錢

白砂糖一錢 白砂糖一錢 白砂糖一錢

白砂糖一錢 白砂糖一錢 白砂糖一錢



第五方 右五味、分十貼、一日用二貼、  
 酸收液制、肥復、  
 濃汞一分、煉枯石、一車、  
 白砂、糖、四支、右、四味、  
 主治、閉塞、用、蓮、而、蒸、氣、各、池、而

第六方 右研和、分十貼、一日用二貼、  
 濃汞、一分、合、四、貼、  
 主治、腦、及、神、經、之、閉、塞、用、蓮、  
 白砂、糖、四支、  
 第七方 右研和、分十貼、一日用二貼、  
 濃汞、一分、合、四、貼、  
 主治、腦、及、神、經、之、閉、塞、用、蓮、  
 白砂、糖、四支、

第八方 右研和、分十貼、一日用二貼、  
 濃汞、一分、合、四、貼、  
 主治、腦、及、神、經、之、閉、塞、用、蓮、  
 白砂、糖、四支、

第九方 右研和、分十貼、一日用二貼、  
 濃汞、一分、合、四、貼、  
 主治、腦、及、神、經、之、閉、塞、用、蓮、  
 白砂、糖、四支、

第十方 右研和、分十貼、一日用二貼、  
 濃汞、一分、合、四、貼、  
 主治、腦、及、神、經、之、閉、塞、用、蓮、  
 白砂、糖、四支、  
 金硫黃、十、白砂、糖、  
 力口、メ、ル、  
 十、  
 巨、

△  
右研和而分十貼、一日用三貼、  
十一方、主治百日咳、  
濃衣仁十マ子コ了了五、  
白砂糖一、  
甘シ、

△  
右研和而分十五貼、一日用三貼、  
十二方、  
カ口メル仁ニ十、  
吐酒石仁、  
烏頭仁、

△  
右研和而凡六十粒、一日用十粒、  
十三方、主治喘急、  
脚湯法、刺洛寬和、  
割等無印者、

△  
右研和而分六貼、一日用三貼、  
十四方、主治頭水病、  
慢聲、  
カ口メル仁ニ一、  
マク子コ了了五、

△  
右研和而分十貼、一日用三貼、  
十五方、主治經年不愈之痲疾、  
濃源仁十、  
金硫黃仁五、  
糊結石仁、

右和而分十貼、一日用三貼、



石麻神方

芽根

ハルサヨコバシ

硝石

廿リ

酒石塩

ヨキ

水

三

十

ニ

中

解ニ丹卷製ニ十滴ハ毎日服之

嘉永甲寅藏後七月日謹  
写于浪花寓居

東浦散人

藏書

春林軒膏方秘録

大

玄

遷

考

以

膏

南

名

五

二

グ

ラ

ス

ト

尸

心

主

和

要

心

王

鏡

神

明

ト

膏

云

能

萬

諸

疾

治

打

身

良

能

愈

心

リ

膏

南

ト

者

云

王

人

參

斷

當

飯

愈

心

リ

膏

南

ト

者

云

王

杷

子

木

香

煎

以

亨

地

黃

縮

砂

香

油

合

明

丹

蠟

六

的

列

面

底

那

西

香

五

桂

大

黃

各

乳

主

黃

沒

菓

紅

花

絲

花

右十八味先上ノ十二品ノ某種ヲ香  
 油ニ浸シテオクテ夏ハ一日冬ハ三日  
 其後上大煎煎シテ某種拈浮スル寸麻  
 布ヲ以テ濾シテ渣ヲ公リテ更ニ上蜜  
 占的列百底那ヲ混入ヘテ攪勻シ  
 溶化スル寸母ヲ入レテ不住攪勻  
 シ煖硬直ク得ルヲ候ヒ乳香次菓ヲ  
 入レ能化シ一煖トナシ菓ヲトリ  
 出シ推返シスル寸百遍計シテ竹  
 筒ノ皮包テ煎  
 先鋒ノ南名林軒一銘翠雲兼又梅ニゴル

此治一切癆腫ニ先ツ此菓ヲ煎スヘ  
 シ其未膿者消散シ己ニ懐成香漬破  
 ス又金命癆癩疾等ノ深干ハ前衝シ  
 不用シテ其菓ヲ用ルニ如トナレ  
 ハ前衝ハ愈入印有テ以テ忌ニ凡  
 菓ハ内菓拈裏毒削テ上ル所工用シ  
 麻油合松脂水飛車百  
 右四品一司ニ鐸内ニ入煎柿木寛シ  
 以テ止メス攪勻シ澄ノ消心ヲ

此箇ノ処ニ  
 用ルナリ

度トナニ布ニテ液ニ渣ヲ去テ別器ニ持貯之

△前

諸般ノ金瘡ニ酢木綿ノ次ニ其美ヲ

貼ス患部ニ其美持リ金瘡ノ外ニ設

ルノ心ニ非ス能ク一切ノ潰瘍全愈

気具毒母不深者其美ヲ以テ之ヲ瘡

即能愈ノ功アリナリ

△後

右照時持合

白雲十ニキ

△左突南諸瘡ヲ瘡メ消散膿潰吹愈等ノ

功アリ我ニ消散膿潰ハ先鋒ニ不及

以愈ハ左突ニ莫若ナリ


棟

右棟標史蜂ノ如ニ付アリ

黄端史蜂ノ如ニ付アリ

麻油巨ノ如ニ付アリ

鹿脂十軒



△右

擊満名スニ  
主治先鋒ノ病ニメ  
患嘗聞クハス  
疗瘡ノ聖薬ニ

○主治先鋒ノ病ニメ  
患嘗聞クハス  
疗瘡ノ聖薬ニ

蜀葵根十キ  
和太黄  
五麻仁

胡蘆巴  
安息香各五  
煎金ニキ

麻油ニ合  
黄蠟百キ

右煉煉ハ  
安膏以上五  
只リ麻油ニ

漬リ置ク  
下三日コテ  
其後浸コ大ニ

上リ煎熬シ  
草檀枯浮ク  
時布ニテ瀝

シ渣リ去リ  
テ黄白リハ  
レ再ヒ火ニ

上ケ溶化ス  
ル寸許ク攪  
勻コ大ヨリ

下メ布ニテ  
瀝シ煎金末  
リハレ煉合

△破

破敵  
主治諸潰瘍ニ  
用良又穴痔  
要薬ニ

青蛇ハキ  
巨突打ニ


△決

決勝  
主治諸血出  
テ痛ニヨシ  
又痔疾

之代葉ニ  
使者ナラニ

白雲大  
麒麟血中  
乳香中

没薬中  
硫黄小







權

テ液シ渣リテテ飲ク冷心ヲ待テニ  
スノ菓未リ徐々ニ入レ攪勻シ蒸ト

○主

治打撲損傷腫塊ヲ成コテ破シス  
瘰癧リナスニ之ヲ貼コ能ク痛ヲ止メ

膿潰ス又諸瘍腫久ク膿ヲ成シ難キ  
者ニ良シ或チ足牽引拘急冷痛スル

ニ良其它中ハ脚氣筋縮等ノ病ニ良シ

下香油十ヤ十黄占三松脂十水干ハ無  
下香油十ヤ十香皮十肉桂十下

右先香油黄占松脂同ク鍋内ニ入レ

火ニ上ケ沸ノ消心ヲ待テ椰子油膽

火ヨリ下シ布ニ浸シ攪勻シ燻化ス心ヲ

ル三品ノ葉ヲ末メ徐々ニ飲ク入攪

勻メ蒸トめス

遊

○主

治諸瘡癤ニ良シ  
右煉麻油十ヤ十麻油十明  
右煉麻油十ヤ十麻油十明

右煉麻油十ヤ十麻油十明

右煉麻油十ヤ十麻油十明

右煉麻油十ヤ十麻油十明

右煉麻油十ヤ十麻油十明

右煉麻油十ヤ十麻油十明

仙人美

煙中自然汁

仙人中自然汁

二油

椰子油

ホドカシ

黄蟬香

桔香丹

各四十支

三ツイカ

下 煎 熱 入 少 攪 セ 硬 直 寸 大 ヲ 取  
下 水 中 二 浮 子 煮 一 塊 十 取  
出 引 伸 旋 返 々 々 入 丁 百 返 許

赤 浦 一 切 愈 美 某 但 膿 水 入  
主 治 一 切 愈 美 某 但 膿 水 入

香 油 松 脂 氷 打 傷 摩 又 等 良

辰 妙 油 蟾 脂 三 貝 同 罽 入 武 火

右 先 ツ 油 蟾 脂 三 貝 同 罽 入 武 火

上 煎 熱 入 少 攪 セ 硬 直 寸 大 ヲ 取  
布 子 残 入 之 貝 未 一 方 無 丹 而 有 樟 必  
攪 勻 子 煮 ト 入 一 方 無 丹 而 有 樟 必

青洲曰已上自大赤至大赤十有四膏  
癆豆象一日不可欠者

右十四美ノ銘ハ他義アルニ非ス  
孝衛公十四陣ノ名ヲ假テ名ク  
ノ即十若大濱若尾之若者即


心平者之文甚ハ青川先生之川中  
子ナリ

嘉永甲寅七月始二謹寫于浪花富岳

中遊  
宮永正純書

眞術活法

第一之活連華婆、遷須之、不而作心良之  
具長サニ寸半リ形ナク如シ其処  
者、少リハシニ施ス可傳ノ如シ  
第二之活ハ右ニ云連華而突ク処者、十  
四経ニ云処ノ常ハ、尺ヲ押ス可傳  
ハ如シ  
第三ノ活ハ右ノ手ノ捧シテ以テ患者  
ノ右股下ニ突棧可傳ノ如シ  
第四ノ活ハ、復中関ヲ可傳ノ如クスル



之章卷按関字蓋腕ノ誤ナラン

△弟五ノ活ハ授ノ上関ニ施スニ具術ノ

手タルヤ可傳ノ如シ

△弟六ノ活ハ臍上ニ施スニ手法可傳ノ

如シ

△弟七ノ活ハ腹ノ中腕ニ施スニ手法可

傳

△弟八ノ活ハ患者ノケツノ穴ニ匠ノ右

ノキヒスリ当テ一可傳之如クスルニ

因リテ可傳スニ

△弟九ノ活ハ鳩尾ノ回ニ当ル所ニ施ス

ヘシ具詳ナルト別書ヲ見スニ

△弟十ノ活ハ臍ノ上関ニ可傳ノ如クス

ルナリ

△弟十一ノ活ハ弟九ノ活ヲ施ス処ニ匠

ノ指蓋骨ヲ具処ニ押シ當テハホリヒ

キリカケ様ハ回ノ如ク前ニメテ文字

掛テスルニ

△弟十二ノ活ハ患者ノ臍上ニ匠ノ右ノ

足ノキヒスリ當テ可傳ノ如クスルニ

可秘之術ナリ

右十二活終

ナルニ本匠施スヘカウ

ナ外ニ本匠施スヘカウ

○本死之窮理格物之待ニ云  
 △昔者本死カ本死ナラサルカヲ知ルニ  
 ハ先ツ医ノ掌ヲ以テニカト畏者ノ下  
 アエラ上正ハ夕ト打更ル可ニ具中ア  
 ゴガクくト折ニ隨而音ヲナセハ本死  
 ニ活ヲ施ストモ無益ナリ若シニカト  
 クニ合シメカニシメガクト音ナサ  
 ヲレハ其即チ活術ノ及フ事ナリ可秘  
 之法ナリ  
 △格蜜ニ云ク死法十二活ノ内ニ密言ス  
 不許之法ナリ然々人杯ヲ見聞ノ故ニ

開密スヘシ

第一活言

其木鍼ハ術塗々押


口受アリ



カ


カ

カ



身二

常いノ穴徐々押  
口受アリ




身三

今ハ法不立依之  
秘スアリ口受アリ



身一

百三



有意

卯四

還元法整骨新書


所謂之呼吸障

者此法を用ん

口よりアリ

今九折に用ん

卯三



卯五

此法ヨリ一才十二ノ

活迄ハ凡九スル所

ノ者ニ向テ施スノ

例ニ十法ト同

ニ上ニ引上テ

胸ヲクツト押シ

口よりアリ

卯六



第六

第十二法 矣

右法ト唯輕

堂吳動アハニシ

口受アリ

おまの力又亦強

加力トハニシ





第七

第六法 十二法ト

四前引上リ一度

ニツト押コ受

音余餘ニクハニシ  
汝花類ノハニシ



才ハ

此法選ノミテ  
者會陰ニアリ  
患ノミテ持テ引  
ナカウ一度ニ跡ト度  
ニスルニ口受アリ




才九

才十一活トけ法表裏  
ノ處アルニ口受アリ



才十  
Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





第十二活法

内人ヤロク日

諸症惣活ノ法ハ氣海ノ穴ニ

アテルヲ上策トス氣海ニア

テ後ニモハリ上法ノ如ク


胸ニアテ背ノ脾胃ノ下

ノハシコウキチ打ツト

キハ肺氣用ナリ

息を吐く

ツルアリ



藥徵卷之上抜書

東洞吉益先生著

宮永正純

石膏

考徵

有七方

大青葉

以上二方石膏皆雞子大也為則按雞子大即半斤也木防己湯石膏或為

三枚或為十二枚其分量難得而知焉今從傍例以為雞子大也

右歷觀此諸方石膏主治煩渴也明矣凡病煩躁者身熱者譫語者及發狂

者齒痛者頭痛者咽痛者其有煩躁渴之證也得石膏而其効數焉

互考

傷寒論曰傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證

者白虎加人參湯主之為則按上云不可與白虎湯下云白虎加人參湯主之



上下恐有錯誤也。於是考諸千金方，揭傷寒論全文，而白虎加人參湯作白虎湯是也。今從之。

傷寒論中白虎湯之證不見也。千金方舉其證也備矣。今從之。

辨誤

名醫別錄言石膏性大寒，自後医者怖之，遂至于置而不用焉。仲景氏舉白虎湯之證曰：無大熱，越婢湯之證亦云。而二方主用石膏，然則仲景氏之用藥，不以其性之寒熱也，可以見已。余也篤信而好古，於是乎為渴家而無熱者，投以石膏之劑，病已而未見其害也。方炎暑之時，有患大渴引飲而渴不止者，則使其服石膏末，煩渴頓止，而不復見其害也。石膏之治渴而不足怖也，斯可以知已。

陶弘景曰：石膏發汗是不措之說，而不可以為公論。仲景氏無斯言，意者陶氏用石膏而汗出即愈，夫毒藥中病則必暈眩也，暈眩也則其病從而除，其毒在表則汗在上則吐，在下則下。於是乎有非吐劑而吐，非下劑而下，非汗劑而汗者，是變而非常也。何法之為譬？有盜於梁上，室人交索之，出於右則順而難逃，踰於左則逆而易逃。然則雖逆乎，從其易也。毒亦然。仲景曰：與柴胡湯必蒸蒸而振，却發熱汗出而解。陶氏所謂石膏發汗，蓋亦此類也。已。陶氏不知而以發汗劑不亦過乎。

後世以石膏為峻藥而怖之太甚，是不學之過也。仲景氏之用石膏，其量每多於他藥，半斤至一斤，此蓋以其氣味之薄故也。余嘗治青山侯臣蜂大夫之病，其證平素毒着脊上七椎十一椎，痛不可忍，發則胸膈煩悶而渴甚，則胃而不省人事，有年數矣。一日大發，衆醫以為大虛，為作獨葭湯，貼二錢，日三服，六日未知也。醫皆以為必死。於是家人召余診之，脈絕如死狀，但其診其胸微覺有煩悶狀，乃作石膏黃連耳艸湯，與之一劑，之重三十五錢，以水盞一六分煮取六分，頓服，自昏至曉，令三劑盡，通計一百有五錢及曉，其證猶夢而頓覺。次日余辭而歸，京師病客曰：一旦老別，吾則不堪，請與君行朝，於左右，遂但歸京師，為用石膏如故，居七八十許日而告瘳。石膏之非峻藥而不可怖也，可以見。

焉爾

品考

有一條

滑石

考微

有一方

互考

余嘗治淋家痛不可忍而渴者用滑石礬耳散其痛立息屢試屢効不可不知也

品考

有一條

芒消

治裏堅也故能治心下痞堅心下石鞭小腹急結結胸燥屎大便鞭而旁治泊宿食脹滿小腹腫痞之等諸般難解之毒也

考微

大陷胸湯證曰心下痛按之石鞭

以上一方芒消一升分量可疑故從千金方大陷胸丸作大黃八兩芒消五

兩

大陷胸丸證曰結胸項亦強

以上一方芒消半升分量亦可疑故從千金方作五兩

調胃承氣湯證曰腹脹滿又曰大便不通又曰不吐不下心煩

以上一方芒消半斤分量亦可疑今考千金方外臺秘要此方無有焉故姑

從挑核承氣湯以定芒消分量

于此間有八方

互考

柴胡加芒消湯是小柴胡湯而加芒消者也而小柴胡湯主治胸脇苦滿不能治其塊所以加芒消也見人參辨誤中說則可以知矣

品考  
有一條

**耳艸** 主治急迫也故治裏急急痛羸急而旁治厥冷煩躁衝逆之等諸般急迫之毒也

考徵

有二十八方

右歷觀此諸方無論急迫其他曰痛曰厥曰煩曰悸曰咳曰上逆曰驚狂曰悲傷曰瘞鞭曰利下皆耳艸所主而有所急迫者也仲景用耳艸也其急迫劇者則用耳艸亦多不劇者則用耳艸亦少由是觀之耳艸之治急迫也明矣古語曰病者苦急急食耳以緩之其斯耳艸之謂乎仲景用耳艸之方甚多然其所用者不過證前故不枚舉焉凡徵多而證明者不枚舉其徵下皆徵之

互考

治

耳艸湯證曰咽痛者可與耳艸湯不差者與桔梗湯凡其急迫而痛者耳艸治之其有膿者桔梗湯之今以其急迫而痛故與耳艸湯而其不差者已有膿也故與桔梗湯據是此推之則耳艸主治可得而見也

始

芍藥耳艸附子湯其證不具也為則按其章曰發汗病不解反惡寒是惡寒者附子主之而芍藥耳艸則無主證也故此章之義以芍藥耳艸湯脚羸急者而隨此惡寒則此證始備矣  
為則按調胃承氣湯桃核承氣湯但有耳艸而大承氣湯厚朴三物湯皆無耳艸也調胃承氣湯證曰不吐不下心煩又曰鬱久微煩此皆其毒急迫之所致也桃核承氣湯證曰或如狂或少腹急結是雖有結實然狂與急結此皆為急迫故用耳艸也大小承氣湯原朴三物湯大黃黃連瀉心湯但解其結毒耳故無耳艸也學者詳諸

辨誤

陶弘景曰此艸最為衆藥之主孫思邈曰解百藥之毒甄權曰諸藥中耳艸為

君治七十二種金石毒解一千二百般草木毒調和衆藥有功嗚乎此說一出而天下無復知耳艸之本功不亦悲哉若從三子之說則諸凡解毒唯須此一味而足矣今必不能然則其說之非也可以知已夫欲知諸藥本功則就長沙方中推歷其有無多少與其去加引之於其證則其本功可得而知也而長沙方中無耳艸者居半不可謂衆藥之主也亦可以見已古語曰攻病以毒藥藥皆毒毒即能若解其毒何功之有不思之甚矣學者察諸夫陶弘景孫思邈者醫家之俊傑博洽之君子也故後世尊奉之至矣而謂耳艸衆藥之主謂解百藥之毒豈得無微乎考之長沙方中半夏泻心湯本耳艸三兩而耳艸泻心湯更加一兩是足前為四兩而誤藥後用之陶孫蓋卒爾見之謂為解藥毒也嗚呼夫人之過也各於其黨故觀二子之過斯知尊信仲景之至矣向使陶孫知仲景誤藥後所以用耳艸與不必改其過何也陶孫誠俊傑也俊傑何為文其過乎由是觀之陶孫實不知耳艸之本功也亦後世之不幸哉

東垣李氏曰生用則補脾胃不足而大泻心火灸之則補三焦元氣而散表寒是仲景所不言也五藏浮說戰國以降今欲為疾醫乎則不可言五藏也五藏浮說戰國以降不可從也

**黃耆** 主治肌表之水也故能治黃汗盜汗皮水又旁治身體腫或不仁者考微

有六方

右歷觀此諸方黃耆<sup>十</sup>主治肌表之水也故能治黃汗盜汗皮水又能治身體腫或不仁者是腫與不仁亦皆肌表之水也

互考

耆芍桂枝苦酒湯桂枝加黃耆湯同治黃汗也而耆芍桂枝苦酒湯證曰汗沾衣是汗甚多也桂枝加黃耆湯證曰腰已上必汗出下無汗是汗少也以是考之汗之多少即用黃耆多少則其功的然可知矣

防已黃耆湯防已茯苓湯同治肌膚水腫也而黃耆有多少防已黃耆湯證曰身重汗出防已茯苓證曰水氣在皮膚中此隨水氣多少而黃耆亦有多少則

黃耆治肌表之水也明矣故耆芍桂枝苦酒湯桂枝加黃耆湯隨汗之多少而用黃耆亦有多少也

黃耆桂枝五物湯證曰身體不仁為則按仲傑之治不仁雖隨其所在處方不同而歷觀其藥皆治水也然則不仁是水病也故小腹不仁小便不利者用八味丸以利小便則不仁自治是不仁者水也學者思諸

防已黃耆湯金匱要略載其分量與外臺秘要異為則專攻其得失外臺秘要古而金匱要略不古矣故今從其古者也

辨誤

余嘗讀本艸載黃耆之功陶弘景曰補丈夫虛損五勞羸瘦益氣甄權曰至虛喘腎衰耳聾內補嘉謨曰人參補中黃耆實表也余亦嘗讀金匱要略審仲景之處方皆以黃耆治皮膚水氣未嘗言補虛實表也為則嘗聞之周公置醫職四焉曰食醫曰疾醫曰瘍醫曰獸醫夫張仲景者蓋古疾醫之流也夫陶弘景尊信仙方之人也故仲景動言病疾而弘景動論養氣談延命未嘗論疾病後

品考

石膏 本邦處處出焉加州奧州最多而硬有軟二種軟者上品也別錄曰細理白澤者良雷斅曰其色瑩淨如水精李時珍曰白者潔淨細文短密如束鍼為則曰採石藥之道下底為佳以其久而能化也採石膏於其上頭者狀如米糕於其下底者瑩淨如水精此其上品也用之之法唯打碎之已近世火煨用之此其以性為寒故也臆測之所為也余則不取焉大凡製藥之法製而倍毒則製之去毒則不是毒外無能也諸藥之下其當製者詳其製也不製者不下皆偽之

滑石 和漢共有焉處處山谷多出之也軟滑而白者入藥有效宋變曰滑石今謂之凹石因其軟滑可寫畫也時珍曰其質滑膩故名之

消石 和漢無別朴消芒消消石本是一物而各以形狀名之也其能無異而芒消之切勝矣故余家用之

耳艸 華產上品本判國所產者不堪用也余家唯劉用之也

黃耆 漢土朝鮮本邦國皆產也漢土出綿上者以為上品其他皆下品也其出朝鮮本邦者亦皆下品也今華船之所載而來者多是下品不可不擇也凡黃耆之品柔軟肉中白色潤澤味耳是為上品也判用

人參 出上黨者古為上品朝鮮次之今也上黨不出而朝鮮亦少也其有自朝鮮來者味耳非其真性故試諸仲景所謂心下痞鞭而無効也不可矣源順和名抄云人漫此言久未乃伊蓋本邦之俗謂熊膽為久未乃伊而亦號人漫則以其味名之也由之觀之本邦古昔所用者其味苦也亦明矣今該取朝鮮之苗而樹藝諸本邦者其味亦苦也然則其若者是人漫之正味而桐君雷公之所同說也乃今全取產于本邦諸國者用之大有効於心下痞鞭其產于本邦諸國者五葉三極其於形狀也亦與所產于朝鮮同矣產于本邦諸國者出于和州金峯者最良去土氣而判用謹勿殺苦也

桔梗 處々出焉藥舖所鬻者浙而白潔脫其氣味也不可不擇焉唯去其土泥而不殺其直性是為良也判用

朮 宗爽曰古方及本經止單言朮而未別蒼白也陶隱居言有兩種而後人徃々貴白朮而賤蒼朮也為則曰華產兩種其利水也蒼勝於白故余取蒼朮也本邦所出其品下而切劣也判用

白頭翁 和漢無別

黃連 處々出處焉出於本邦越中者為上品世所謂加賀黃連是也貪利之賈或以鬱金色之不可不擇判用

黃芩 處々出焉出漢土者此為上品也出朝鮮者次之出本邦者下品也判用

柴胡 處々出焉本艸以產于銀州銀縣者為上品也本判藥舖所鬻者有二品曰鑷倉柴胡曰河原柴胡也蓋河原柴胡者非柴胡之種也不可用焉鑷倉柴胡者尤佳去鬚及頭以粗布拂拭之判而用焉雷斅陳子美稱柴胡香氣甚矣而本判之產比諸產漢土者形狀則同氣味則薄因稽諸說嫩則香美也

老則不也張元素曰氣味俱輕故今用鍾倉柴胡也  
貝母 用白漢土來者也剉用焉今本判間亦出焉不異於漢土產也  
細辛 本邦稱云真細辛者即是也洗去塵土剉而用之藥鋪間以杜衡充  
細辛也不可辨矣

方讀辨解卷之下部

風濕

产黄加木湯金

疼痛者当去其汗  
湿家身煩疼者主之方

产黄大 白木大 杏仁七 桂枝三 甘草二

杏仁桂枝加石膏大 附子大 枣枚 名产黄加木附湯

湿家ノ身煩疼スルモノニ此方ヲ用テ其汗ヲ發スルニ此症脈浮緩ニ

症ニ臨テ杏仁ヲ去リ圭支ヲ去リ石膏附子大棗ヲ加ルモ佳ニ即チ产

黄加木附湯ト名ク

产杏薏耳湯金

風湿病一身尽痛發熱者主之方

产黄中 耳草大 杏仁 薏苡仁各

此症湿気皮膚ニ在テ未關節ニ至テ入故ニ發熱身疼痛スルノニ此方

ニテ強ク發汗スヘシ發汗メ其痛減ル者ハ轉方スヘカラヌ若シ發汗后

福升楓亭先生

病不差節聚于痛者熱ナキハ海藻独活湯熱有者ハ當飯粘痛湯ヲ用  
ユヘン此証汗出テ風ニ當リ腠理開クルヲ以不覺感スル者ニメ即風湿  
之可考脉浮汗不出惡風者此方ニ宜シ若汗出惡風スル者防己黃芪湯ヲ  
可用詳ニ黃芪湯ニ參ス

防己黃芪湯 主風湿脉浮身重汗出惡風者

防己兩 黃芪二兩一分各 甘草半兩 白朮半兩 大棗七枚 生姜

如主治風湿ノ初ハ杏薏耳湯ヲ用テ湿ヲ發シ汗ヲ可取若不治メ痛  
節々ニツキ腫ル者海藻獨活湯ヲ用テ熱強ク附子ヲ用ヒ難キ者ハ當  
飯粘痛湯ヲ可用防己黃芪湯ハ杏薏耳湯ト虚实ノ分チアリ杏薏  
耳ハ脉浮汗不出惡寒者ニ用解肌メ愈傷寒中風ハ黃桂枝ノ分チ有カ  
如シ又風湿ト風毒トノ分チハ痛節々ニ付テ腫赤シ有テ熱スル者風  
湿之節々痛伝ヘ疔腫ナク赤シナク熱スルナキハ是濕毒ニ  
當飯粘痛湯蘭室 治濕熱走注遍身骨節煩疼胸膈不利足脛赤腫重痛

羌活 耳炒 黃芩 人參 葛根 蒼朮 當歸 白朮 防風

知母 猪苓 沢瀉 茵陳 大生姜 蘇枌 小

凡濕ノ症熱甚者ニ用テ最初ニ杏薏耳湯三升汗メ不愈節々ニ付テ痛  
熱強キ者ニ此湯ヲ用テ熱ナキ者ハ千金海藻獨活湯ヲ用テハ

海藻独活湯子 治遊風行走無定腫或盤大着腰脚及手臂腫至之志

海藻沖 附子 白朮 防風 商陸 独活 茯苓各 大黃下利去 煎加當飯小

凡濕ノ始ニ杏薏耳湯ニ發汗メ不治痛之強キニ用ル也此方防子  
有若其人附子ヲ用ヒ難キ症アテハ當飯粘痛湯ヲ用ヘシ

牛房子散本 治風熱成癩節攻斗作赤腫麻木甚則攻肩背兩週暑熱

或大便秘則疼

牛房子沖 黃大 生地黃大 羌活中 豆豉六

凡濕ノ症ニ手指一本痛ム者有此方ヲ可用甚ニキモノハ骨節痛ニ至  
ル初指痛ム者皆風湿ナルヲ不知レ疔是皆風湿ノ症也早此湯ヲ可

用方中豆豉ノ意未詳

犀角湯

治風毒熱頭面腫方

竹葉二犀角二

玄參二凡呂根二

防風二冲石膏二黃芩二

木香二升二大

防己二小生善二

主治ニ舉ルカ如シ熱毒一身ニ入り四支節ニ腫痛スル者ニ用后世敗毒散ヲ用ル処ニ然レ此方ヲ優レリトス

独活湯射活

冷痺緩弱疼痛或腰脚痛重痺方

獨活四杜中八牛膝六細辛五秦艸六茯苓六桂枝八防風六川芎六生

地黃十芍藥六附子二

此方独活寄生湯ト同キ主治也凡濕筋牽痛瘰ルニ用コヘニ寄生以エカタクコヘ此方ヲ佳トス

耳中附子湯傷

治凡濕相搏骨筋煩疼掣痛不得屈伸近之痛甚汗出短气小便不利惡風不去衣或身微腫者方

耳中大附子二桂枝四白朮二

此方桂枝附子湯ト同ク金二無二効如何トナレハコノ方ノ主トスル処ハ皆普通而凡濕ニ用ト金二無二効如何トナレハコノ方ノ主トスル処ハ傷寒發汗后凡冷襲ハル由テ痛ム処ノ者ナリ故普通ノ凡濕ト病因異ニ主治桂枝附子湯ト輕重ノ分チ有又普通ノ凡濕痛后虛症ニ至ルトハ偶此方又引附湯有通メ五痺ニ用コ詳ニ中部雜症中及下部雜症中獨活湯ノ条参考スヘシ

桂枝附子湯傷

治汗多亡陽不止者

桂枝四附子三甘草二生薑三大棗十

此方耳草附子湯ト同ク傷寒中ノ凡濕ニハ用コシ尋常ノ凡濕ニハ用難シ初傷寒ノ輕症九日ニメ汗出又衣裏濕ヒニ濕氣肌表ニ有凡冷ヲ得テ釀成ストコロノ凡濕ニ六杏意耳湯トノ類ヲ用テ發汗スルトコロノ凡濕ト異リ骨節ニ痛チ久惟身体煩疼スルノニメ本虛ニ屬

舒筋湯集

治凡濕相搏身煩重項背拘急方

當歸 芍藥 羌活 黃芩 海桐 白朮 大各半 大棗 生薑

コノ方痺症ノ筋ヲ舒ルニモチユ蠲痺湯ノ黃芩ヲ白朮ニ代ヘ用ユ海  
洞皮ヲ加ル也故ニ蠲痺湯症ニメ筋脉絞急強ク痛ク有者ニ用ユ医学  
心傳ニ一名五痺ノ臂痛不能舉蓋コレ氣血凝滯經絡者ヲ治ス  
ト云リ今此主治ニ從テ用ヘシ方中海桐ハ筋ヲユルメル功有又弓附  
湯即リ通シテ五痺ニ用詳ニ中部雜症及下部雜症中蠲痺湯ノ条參  
考スヘシ

羌活湯聖

治白虎痛風甚如啞方

骨碎補 兩 羌活 兩 防風 桂心 川芎 木香 當皈 桃仁 附子

秦艽 各一兩 半生薑 片大腹波 大牛膝

コノ方白虎風痛ハナハダシキ齒ヲカムガ如キヲ治スト云リ又コノ

方ニ本夏方之射香丹ヲ兼用シテモ佳ナリ白虎凡初テ聖劑ニ論ス其  
症ハレナクシテ肩項ヨリ頭腦ニ連テ如啞夜半后ニイタル寸ハヤス  
ク痛ハケレキヲ云リ凡テ一切痛有者ハ夜半后ニイタツテ痛甚キハ  
陰氣ノ凝結スルユヘナリ又白虎歷節凡ト云ルモ同症ニメナシ異也  
歷節ト云トキハ凡濕共ニ通メ云熱有テ骨節ノ痛ムヲ出リ白虎トノ  
ニ言ル症ハ熱ナシ歷節ノ名ハ聖濟ノニニアラ入諸書ニ多ク出タリ  
又痛凡ハハレアツテ痛ムモノニ而コノ証ト異之コノ方ヲ用テ若不  
知トキハ金シノ烏頭湯ニ轉メ佳ナリト有考スヘシ

烏頭湯金

治骨節疼痛不可屈伸若自汗或盜汗若腸絞痛者

川黃 芍藥 黃芪 耳中各六川烏 以蜜二升外煎取一升即出烏

頭 右四味以水ニ合七勺煮取九勺内蜜煎中煎取六

歷節凡ノ寒勝ツ者ニ用ユ凡濕或ハ白虎凡ニ効有白虎凡痛劇シキモ  
ノ聖濟ノ羌活湯ヲ用ユ若不知トキハコノ方ヲモチユルノアリ此方

耳中如ケレハ効ナレシ多シ加ルトキハ血脉ヲ和シ筋骨ヲ緩ルニ至治  
ニ脚気疼痛可<sup>下</sup>不屈伸モノヲ治スト云厄其効未試白虎凡痛<sup>下</sup>ハ外臺  
千金不載初テ是ヲ濟ニ論ス余ハ羌活湯ノ下ニ見コ

台州先生腹診

○臍診

宮永正純 写

第一 早朝不早頃之時ヲ以テ佳先吾神氣ヲ丹田  
正陷チツカレ病人ノ左ヘツク先虚里ヲ診ヒ次  
ニ臍中ヲ診ヒ臍中ヲ診ハ病人ノ氣ヲ落ツカレ  
手ニテ押ヒ臍中ヨリ臍下丹田アタリニテ押ナ  
リ逆気下リスル故病易別其次ニ三股ヲ診又次  
ニ神闕ヲ診女仕脉ノ通チリ次ニ少陰陽明一集  
臍診次ニ少陽ヲ診次ニ章門ヲ診次ニ少腹ヲ  
診己上腹診ノ次中ノ右手人寸ニ指ヲ以テ診此  
指通神氣故為主ト

第二 藏府ノ位ヲ定メ臍中ノ心藏ノ頭トハ膵膵

ノ尾トス即鳩尾骨之胸ノ両方高処ヲ膺肺居兩  
膺上迫肩下至膈心居其中央如懸鐘其傍清虛如  
望大虛ソレヨリ膜膜下包七藏上迫膈  
膺背ノ十六推ニ当ル然レ医書曰膺十四推ニ当  
ルト十四推ハ腎藏之位故云然レ非無理  
胃府正ク心下ニ位ニ上迫鳩尾左ニ横タワリ至  
服下右ハ不容兼滿ニテ至ル下ハ至下浣  
脾藏胃府之右而附着脊ニ付テ勾々ニテ至期  
門肝藏右ノ服下ヲ領右不容ノ位ニ布ク胃ノ左  
方ニ蓋ク膽ハ肝ノ間ニ有肝共胃在右ニ對ニテ  
右ノ方ハ肝カ蓋レリ、リテアルナリ右ノ期門  
ノ肝ノ尾トス胃ハ大ニメ肝ハ小ナリ胃ノ下水

分ヨリ下ハ皆大小腸ナリ大小腸ノ次日ヲ為闕  
門左天杞ノ下ニアリ中注四滿ノホトリ也闕門  
ノ処ニ膀胱ハ油ヲ以テ粘着ニテ下曲骨ノ肉ニ  
カタル帝光后ニ血室アリ以経上属肝下通賢血  
室ノ后ヲ曰直腸

○平人腹診法

第一平人ノ腹ヲ覺ユレハ病人ノ腹自ラ分ルヘ  
ニ平人ハ膺中静寧者ヲ以テ佳トス胸中ハ肋骨  
ノ下ニアリテ不可候平人氣象論曰胃之大絡名  
曰虛里貫膈絡肺也於左乳下其動應手脈之宗氣  
二盛喘數絶者則病在中結而横有極矣絶不至曰  
死乳下其動應衣宗氣泄之胃ヨリ外平絡ヲテ也

ル左ノ乳下一二三肋ノ間ニアリ此胃氣ヲ脾胃  
持上ケテ上肺ニ輸ス即チ左ノ乳下ハ心ノ来ル  
之故ヲ以テ可見脾胃共ニ左ノ乳下ニ若其高氣  
盛ニ如喘屢々絶メルハ病胃中ニアリ結ニ横々  
ハルモノハ積ニ絶ラ不至ハ死ス其動應衣トハ  
胃中多氣者死ト同ニ此十口人迎跌陽一切脈ノ  
宗氣ニ視テ不見也ニテ漸ク動者ヲ告トス其動  
乳下一二三肋ノ間ニ有テ応スルカ不応カラ者  
トス胸中ノ陽氣衰ニハ其動高ク乳ヲ踏テ中府  
雲門之位ニ至ル甚者動至臆中又右ノ及フ胸中  
多氣者死是ヲ云ニ灸日ケ陽條脈結代心動悸者

虚勞ニ瘵逐日動高クナルモノハ死ス初ヨリ  
氣見レ后ニ澄テ死ス者アリ不久死  
脚氣衝心ニ動氣高者ニ不菜ヲ用ヒテ衝氣低ト  
云ヘ此其動不止者死扁鵲カ血脉治レリト云虚  
里ノ動子ナルヲ以テ決之胸中ニ氣ハ一切虚  
里ニテ候フニ此症ハ滋陰セ子ハ治セサル者ハ即  
灸甘ケ三焦之陰ヲ滋ス血脉ノ外ニ發スル者ハ即  
宗衝ニ胸中ハ心ノ位心藏盛者宗衝亦盛ニ胸中  
之肉ニ滿ルニ心陽衰ヘテ虚火ノミアル子ハ胃  
中ノ肉脱ナリ胃腹候ニ潤滑光沢アルハ血脉充  
足ニ沈大枯悴者不足ニ虚又ルニ随テ胸中ノ光  
ヲ生ニ鏡ノ如クナルハ真阳外テ浮ニ長症必死

是老人ノ中風、多ク將生光者待至如鏡而死ス  
ルモノ、平人ノ脈ハ蟬肚ノ如ナルヲ吉トス上  
下大小ナリ胃氣通利シテ腎氣実スル故ニ灶小  
薪多故也小兒ハ其反ス心下脹リ下小ナルカ  
常ナリ胃氣状実ナル故也又脈ニ有強弱藏府之  
脂膜多キヲ以テ強少キヲ以テ弱脂膜ハ隨  
分多ヒカ益位也蛮語、ホイワトキフ即アラ  
ノ一ニ此脂膜ヲ以テ藏府ヲ養フ也脈状実者  
ハ仁手ノ脈ノ如クフキトスチタワルヲ吉ト  
ス脈ヲ拙ス、滑温ニシテ皮毛ニ艶アルモノヲ  
血氣ノ盛トス皮毛ニツヤアルハ日ニスカンテ  
見テハコレス其心ニテ平人ノ脈ヲ決之是

及ニテ脈皮無潤反甲錯スルハ血氣ノ衰若クハ  
血熱若水氣右皮煎ナリ又脈皮ヲ撮ニテ見ルハ  
皮ハ厚ク肉ニ付テ不離者亦実也者脾胃ヲ撮ム  
カ如ク推之左右不動者任猫鼠ノ如ク皮膚膏ク  
ニテ肉ト離レタルヲ以テ血氣衰トス老人ノ脈  
多ハ如虫ノ脈部ノ按スルハ肉ノ起ルニ遲速ア  
リ起ルニ速ナルハ胃氣強ニ起ルニ遲ハ及之弱  
トス又爛瓜ノ如クナルモ又按知ルニクサクト  
ドココナモノテ起ルニチ此藏氣失カ之症力  
ナラヌ死ス但ニ不甚者ニ及テハ療治ニテ可愈  
人多養榮湯無病ニシテ脈中有其候者必死ス  
岩戸脈ト云フアリ老人ナトニ本脈ノ脹ルニ俄

ニケツクリト陷<sup>リ</sup>版皮徹背ト云瘡アリ三年ヲ  
ウスコレテ死ス藏真竭ルナリ又任脈通リ中リ  
テ火管ノ大ノ如ク三道拘挛自心下至臍下々  
テ産スルニ臍ニ至テ左右ニケルモノアリ  
不山ニ今年祭大病多ハ死ス矣把ニハ大病ヲ祭ニ  
或ハ死ストイヘ凡臍ニ至ニハ三年ハマクスト  
云ハ又日月ヲ引ヘニ是真氣ヲ勞極ニテ作此症  
一度祭スレハ難再復又自任脈連少陰吹管ノ  
如ク  
テ死ス  
**胃府**ヲ候フノ法自心下神閑一テヲ按テ循テク  
ロスニ三腕平<sup>ニ</sup>メ無搏有カ者少脾胃為無病ス

スツト順ニシテ按ニ下ルニ多ハ中腕ニ段アル  
者ナリ常人多ハ段アルモノニ但ニ臍竒ノ後考  
以上任脈ト通  
陽明ハ乳下ノ通リニ然ニ乳ニ有廣狹難定ノ第  
二肋ノ端ヲ以テ為陽明通ト第三肋ヲ為少阴ト  
明<sup>陽</sup>經ノ拘挛ハ胃氣不知<sup>知</sup>或飲ニ以芍薬和胃氣佳  
ニ右モヒツハラヌナハナニ建中ノ症左一方  
アルハ多クハ茯苓左右共ニ拘挛スルハ建中ノ  
症必心<sup>評</sup>アヨリ硬滿ス心ナリ陽明經ハ臍ニ屬ス  
ルモノ下リ臍竒ニテ考フヘニ假令雷飲ト云凡  
陽明至無拘挛者甘遂大戟ノ萎不用用  
○少陽至三肋又通リニ右ヲ以テ主トス三助ヨ



元ノ氣以キ  
モノナリ  
例ハ  
堅キモノ

テモ然リ又淺ナル者カ短命者、アラヌ只固  
キヲ以古トス最四十以上ノ者ハ臍動クモノ之  
然レト古ヘ推ハ右寄者ハ病人ナレハ必死ス  
老人ノ臍ハ不苦自然ト精氣衰ニ臍之輪郭トハ  
腸ノ服ノ位ナリ之ヲ輪ト云是ハ堅キモノナリ  
其ヨリ上云、歳リツテ堅キモノヲ孰ト云細管  
頭ノ如シ動ノ堅キ者ハ真輪郭全ノ臍不動ヲ真  
元ノ氣全トス虽久病不死  
難經十六難云肝ノ病ハ臍ノ左、動氣アリ、按之  
字ク若クハ痛也扁鵲五行ノ理テ以テ云、吾  
門臍ノ左、動氣アリ、按之字ク若クハ痛也  
病臍〇上有動氣、按之字ク若クハ痛也、吾門也、臍ノ

者ニ右ノ  
堅キモノ  
ハ肝藏ヲ  
クハカク陽  
陰拘也

左、取又云肺病臍右有動氣、吾門於臍右、肝  
膽ヲ候、又云腎病臍下有動氣、按之字ク若クハ痛也  
傷寒論所謂奪胎之病、ニ食養生ヲ節、スル人ハ  
臍ノ左、無動者ニ是ト三脫ノ乎ナレトヲ別合  
ニテ其人食養生善惡ヲ云、遷ノ、ナレ臍ノ左ヲ  
按シ、ル、字、ニテ動氣アルハ胃之不知ナリ  
按之痛者、留飲之陽明、連テ硬、停ニテ痛者、下之  
陽明至、不連臍之左字、ニ陽明至、無拘也  
小腸アリ、其症、瘀血又ハ痼症、驚腸之莖、臍、引  
ツカス少陰至ヨリ小腹一テ引張疑アル者ハ痼  
血ナリ、サヲ臍上、有動臍下、動上、丸之、女、イ、少  
陽ヲ把カス、之病甚トス臍上ノ動ハ圭支臍下ノ

動ハ附子ニ陽明無物寧臍ノ左ニ動アルハ子毒  
ニヨロシ臍ノ右ニ動アルハ牡丹度臍ニ當テ動  
アルト病甚シ傷寒論ヨ臍築微而痛背病難治是  
之然ルト外ノ症カ、ロケレハ無大害之臍回リ  
從横貫物其ヲ痼瘕ト云皆是屬寒、何者臍ハ陽  
氣ノ往來スル処ナリ滯結スル故ニ必陰寒又虛  
寒アリ所用立附子子赤白有七症  
臍下賢間之動氣ノ下臍下ニ才丹田ノ他丹ハ陽  
氣ナリ天ヲ煉ツツメ陰氣ヲ層生スル処故ニ名  
丹田氣海リ陽氣ノ海故名ツク石門ハ開テ明カ  
ス丁故名ツク賢間ノ動氣難往ハ難ハアリ古今  
医家所難ニ然ル人サニ指ヲトタト候ハハ隱ニ

神門  
見可後

トアルニ女生氣乏有ニシテ若ナケレハ必死ス  
臍下ヲ見ルニ因滯シテ光沢アリ是ヲ真氣有ト  
ス女症ハ神門色スレハ必不病死ス又吞下ノ甲  
錯ニテ按テクサニスル者ハ頓死ハ病人ハ不治  
ナリ○陰虛ニハ火動者ハ動自臍下臍ヲ挟ニ上  
ケテ臍膜ヲ迫ル故ニ短氣ニ白沫ヲ吐スルナリ  
不天動但陽虛者ハ拙之其子帶青黒者陽氣絶ニ  
極ルナリ○初回本丹滋陽丸先補陽丸星錫丹ノ子子父  
動者金夜丹  
○壯實者吞下丹田ヲ瓜ニテ搯テ之ニ硫黄ノ  
氣アルモノナリ大酒肉食ニテ血勢強ク者吞下  
ヨリ大出ス

○後崩漏

アリトイハ  
又任脈ノ左  
シアルモア  
妊脈ハ口滿  
ニシテ血塊  
ハ向アルモ  
ノ如シ

陰虛シテ不<sup>火</sup>動者ハ臍下ニ寄ノ如キ節カタツ  
ニ<sup>火</sup>動者ハ臍下任脈ヒラノヲアリ攝ノ如シ兩  
旁虛勞ト瘵ノ未<sup>火</sup>アリ必死ス總<sup>火</sup>動者ハ皆多  
ク水飯ナリ又熱毒<sup>火</sup>久病不食中腕ノ左右ニ動  
スル者ハ胃氣絶スルナリ 趺上ナリ腫不至トモ  
必ス死ス奪脈氣ハ必ス任脈少阴ヲ間<sup>火</sup>アリ

○令妊娠瘀血

妊娠ハ任脈中極下ニアリト虫<sup>火</sup>又右ニ寄モア  
リ瘀血ハ少服ノ右ニ然<sup>火</sup>レ其甚<sup>火</sup>テモ分チカタコ  
是<sup>火</sup>ヲ分ツニハ痛ムリ瘀血トモ不痛ヲ任脈トス是  
捷至<sup>火</sup>ニ妊娠ハ横骨ニカ<sup>火</sup>ツテ不痛<sup>火</sup>ニ瘀血ハ横骨

ニカ<sup>火</sup>ツテアレハ必ス痛ムナリ其妊娠子ニサ  
ハルハ百日ヲ経テ別也△相<sup>火</sup>法ニ好門ニ赤色ア  
ルハ必有妊<sup>火</sup>觀<sup>火</sup>音ノ由ツラ目ノ下ニカケテ張出タ  
ル処ナリ左ニアレハ必男<sup>火</sup>之右ニアレハ必女<sup>火</sup>ニ其氣  
色口滿ナルハ其子育ス口滿ナラサレハ其子不  
育若クハカクハナリ夏ハ朝冬ハ昼ニテナケレ  
ハ見エテ之婦人ニテ見カタキユヘ丈夫ノ面  
テコルナリ是ハ孕日ヨリ見ルナリ男子ナレハ  
初日ニ明<sup>火</sup>ニ見ユサ子ハニニ日ニテ見ユ

○痢病腹之候

心下左ノ陽明不客<sup>火</sup>美滿ノアタリ左右ノト<sup>火</sup>服  
以<sup>火</sup>ナ胡桃ノ如ク宇<sup>火</sup>ニテ動<sup>火</sup>氣アル者ハ皆<sup>火</sup>宜<sup>火</sup>ニ但

心ヲ左ノ不客梁門辺ニアル者ハ皆曰喘口利也  
多クハ死ス在小版者魚重可治此版無候者為  
輕症

○痘瘡之候

胎下或左或右有筋其筋低者輕高者重  
之又虚里動甚者ハ險症其筋然トノ赤夕  
散セサル内、急、可下之

○診脈法

△診脈弦脈要精微論ヲ以テ據トス脈動ノ一ハ平  
人氣象論ヲ拠トス尤難經一二難、所解者批脈  
、当法變法ト云フ以當法ハ三部ハ右肺  
脾命門左心肝腎ヲ浮中沈ニシテ候ス延ク云其

当法ヲ証ハ書傷寒金匱、詳ナリ浮、ノ脈ヲ候

レ況、メ藏ヲ候テ自腕骨至尺沢一尺一寸ト定

ム其内九分ヲ取リテ三部經位ヲ突ム

△病人ノ脈ヲ診スルニ中ツクハ、コレテ候ハ惡ニ脈批

上ニテ一、診脈批ナキハ右ノ膝ヲ立テ上テ

セ可診人サレ指ヲ最候ノ要トス

△一脾動ホノ止魚際ノ辺、至ル者ハ上衝地其地

、テ弦而大者頭痛ニ如流者ハ痲症、幼メ流

細有癩痲又尺外、向テ大者目カヌムナリ直中

アリテ夫者口中病

△二才部附上下滑者頭痛ナリ寸部見、者疼飲

滑在下者下疽便毒可知弦者水喘息又此部ハ屬肺

疑耳

気ヲ至ルナリ故脈結カナキハ気ヲ干タル人  
 ナリ三辨骨、中ニ関郡ハ中焦脾胃ニ其処浮ア  
 沈ト疹フニ共ニ腫ヒシマリツマアヒヤウナル脈  
 寒ナリ不同アルハ脾胃其頓ニ按ヒテ不在モ法  
 ナ同ニ又得滑者取中、水アルヲ可知  
 又浮數有脈、婁アリ脈上ス、ハハ惡心嘔吐ト  
 可知又浮中沈ニ候、微細、ハ弦ヲ得ハ腹中痛  
 可知又見滑脈者停モアリ弦ヲ帯ハハ痛ト又又  
 膈<sup>ツ</sup> 関骨ヨリ外<sup>ニ</sup>向ヒ滑者章門ヨリ肺、至<sup>リ</sup>水身  
 アリ又其処、テ弦ヲ得ハ章門ヨリ臍ノ間切、  
 痛ナリ  
 四足之頭ハ腎ヲ候フ、三候共ニコレアリアハリ

賢実トスコレマリナキヲ腎虚トス又浮コレテ無  
 カリ逆精トス浮之中、ウイテ針ニテ下ヨリ上  
 ヘツクヤウナル脈アル者、近日肩背ヲ犯シ夕  
 ルナリ沈ニメ得之亦然リ又婦人其処、浮テ下  
 へ行クヤウナルハ經水アルナリ又其ヨリ細キ  
 脈ヲ浮ハ背之太骨ノ辺痛ト可知又其処脈ニカ  
 有テ動脈見セハ下疝瘡ナリ微ニ見セハ近日疝  
 瘡病カ或余喜ニ  
 六其処ヨリ少コレ下ルヲ膝コムヲトス其処内へ  
 寄リ其脈弦細ヲ得ハ膝若ゴムヲ痛トス又ハキ  
 モアリ又外ニ寄リ其脈ヲ得ハ、數骨痛トス是  
 ノ処ヤニ下ル足トス其処ヨリ内ニ寄テ弦細者

ハ足心痛トス外ハ膝上疼トス  
五其処ヨリ少シ下ルハ左右ノ股取リ脈弦細者温  
冷ヲ受クル人ナリ但シ内ハ寄ルシ股ノ内トス  
外ハ寄ルシ股外凡テ之速冷与アルトス其処若  
痛

一左手右手ト部位同シ但シ左ヲ以テ背ニアテ  
シ假令ハ左ノ一ニ弦細ニメ上ニ進ム脈ヲ得ル  
ハ百會ヨリ大椎之辺痛トス少シ下レハ二ノ部ニ  
肩凝リ疼ニタルク堪ニ難キナリ但シ一ニ部ニ  
シメ進ム内ニ自然トムツクリト持上ル脈ヲ得  
ハ百會大椎肩ノ辺ニ有腫物ニ但シ右ノ脈浮ナ  
レハ今病ムニ右ノ脈沉ナレハ余毒ニ寸口ニア


ルハ平脈ニ弦細ヲ得ハ大椎ヨリ九椎ノ間有疼  
ナリ其処ニ撞テ得ハ少撲大灸カ灸背ノ後ニテ  
ハ血氣通シ難シ故得瀉脈之何ニ部ニテモ是  
テ可推

一三候共有カ若血実トス三候不調ヲ血虚トス  
浮ニシテ診フハ無カ潤ニ無キヲ血虚トス冲沈  
亦同シ又カアル内ニ三診不調者ハ痼積之其脈  
微ハ胸ヨリ右ニ塊アリ其脈進ニ上ルシ脈昂ト  
ス女子經水来ル毎ニ其部浮數ニ脈ヲ得ル但シ  
經水少者其脈反テ見ハレシニ〇一尺部其部当  
肛門之數脈ヲ得ハ下血血箭ニ其部針ニテ刺ス  
如クナル脈ヲ見ワスハ頭病ニ但シ寸口ト持テ

有力者ハ爛痔之処部ニ数ヲ得ハ大便秘結ト可  
 知又脈ニ無気下ヘサカル脈ハ下利病ニ  
 △脈ハ左ハ升リ右ハ降ル故ニ左甚進ハ脈ヲ得  
 ハ吐血衄血或蓄血石ニ甚タ下ル脈ヲ得ルハ  
 下血亡血トス  
 △脈命ニ癰毒ノ脈ヲ論コタレハ無差別  
 △筋癆ノ脈ハ浮而無力脈ノ来ル仲別コテ無力  
 無者者ニ  
 △蛔虫之脈ハ左ノ関部ヲ浮而疹フニ小魚ノ餌  
 ニツクガ如ク沈而疹之無熱浮若クハ中ニ診  
 可  
 △中風之脈浮而帶数ヲ奇沈実者況之洪大如

彈石者死ス  
 △一瘧之脈ハ全シニ評ナリ  
 △一痢病ノ脈不浮不沉而緩者吉トス数ヲ陰トス  
 弦数微ヲ為逆但利減而右脈微弱者亦吉  
 △水腫之脈不浮不沈而通緩者吉数者水气迫ト  
 ス沈実而数者重ニ  
 △一霍乱之脈ハ伏者必勿驚中焦和レハ脈自還  
 △一弦脈ハ刀劔之觸ル心持ケスルナリ法ハ少  
 陽雷飲ノ脈ニテ阴阳相争ニ又弦ヲ為減精血衰  
 之脈ニ也脈見内傷病者多死之先自天部始ル也  
 時得可治及才闔者乃血气共竭心死又  
 △一三部脈全見門脈絶者死也神絶引於旁官者生

一内傷病ノ脉ハ細シメ純弦ニ余症之弦ハ滑カ數  
 カノ阳脉ヲ帶ンナリ總テ弦ハスルハ寸氣並アリ  
 テ劍カノハミサワルル如クナリ



台州園服診記

○一ニ即両脇ナリ疲ナト赤身カラ西乳之間  
 カ別テ契コテ掌ヲ燒カ如クニ覺ユルニ其ニク  
 処ト巨黒ノ動ヲ見ル片ハ寸掌ヨリ指サナレテ  
 見ルニ外ハ食中ノ二指ニテ知之巨里ノ動ハニ  
 シ見ルカヨキニ又虚阳ノ上冲モアリ又穀氣テ  
 高イモアリ其ハ過食スルト尅氣上冲スルナリ  
 ○三即心下ニ積氣サニツノガモノニハ其処ヲ大  
 指ニテツヨク押テ下トノ四指肋骨ノ上ニヒラテ  
 シ下指スル者ニ  
 ○四ノアタリヲ押コナフツト水ノ鳴ヲトス  
 ルハ雷飲ニ飲ハヨクハ以テ聚ルニ

○五<sup>コ</sup>、多食滯ス強キハ三辺へモ及テコノ辺  
カラ三四ノ辺ニテ堅ク石ノ如キモノハ食ヲ節ニ  
セサル故ニ是カ多ク<sup>大</sup>店ノ寸<sup>下</sup>積<sup>積</sup>ナト、アルモノ  
ナリ小兒ノ時疫或咳嗽ノ治セサルハ按版ニテ如  
此ハ平胃散ニテナケレハ不<sup>治</sup>ニ○六<sup>コ</sup>此辺ヲ按  
ニテ痛カ中焦ノ虛ニ

○七<sup>コ</sup>血塊カコノ辺カラ九ノ辺迄アルモノアリ  
○八<sup>コ</sup>燥屎カ此辺ニアルモノニテヨツト按ニテ  
モ痛ニシテハノ処ハ即<sup>即</sup>明胃ニ此処筋ハルハ建  
中ニテナケレハ不<sup>治</sup>  
○九<sup>コ</sup>即臍下ニ此処溝ノ如キハ腎虛ナリ又綿ノ  
如キモノアリ難<sup>治</sup>ナリ然ト云モ治スルモノ有

○十<sup>コ</sup>一見スレトモ大支ナキモノニ疝テ塊アルモノ  
ハヨクナ<sup>一</sup>ノ辺ニ捧ノ如キモノアル

○十一<sup>コ</sup>十三<sup>コ</sup>即章門ニ此処綿ノ如クグサツクハ氣虛  
ナリ虚勞瘵疾ニ、版ヲ按ニ綿ノ如キモノハ  
不<sup>治</sup>

○一<sup>コ</sup>一遍見テ始終ノ迹ヲ留メテ臍上ニテ一<sup>辺</sup>  
摩<sup>レ</sup>コトスレバ不<sup>治</sup>ノ厥逆ハトコトモナク肌  
ニメリアリ物ノニメリタルヲ摩<sup>レ</sup>スルカ加<sup>コ</sup>  
○疫ノ病人ハ版ヲ見ルニ我身ハヨリテ頭ハ跡  
引ヨク夜着<sup>ク</sup>ニタル片<sup>片</sup>塊<sup>塊</sup>クサキニホビスル  
ナリ其<sup>其</sup>氣<sup>氣</sup>鼻<sup>鼻</sup>ニ入<sup>入</sup>テ病<sup>病</sup>ハアリ故<sup>故</sup>、其<sup>其</sup>時<sup>時</sup>ハ横<sup>向</sup>  
テ居<sup>ル</sup>ルカヨ<sup>コ</sup>

台州園脈診

△巨里乳下三肋之間ニアル人。因テ乳上ニア

ルモノモアリ。胸中気多キ者死ス。ト云ハ右ノ動

気ノ胸中ニ散漫スルニ女子十四歳巨里ノ動乳

上ニ及フモノアリ。経来シハヒキノナルニ

△胸中ツヤアリテ鏡ノ如キモノ死ス

△小見胸中高者。龜胸ト云以。整丹下之五六オニテ

レハ漸ニ低クナルモノニ。整丹ヲ以テ下ニテシ

カ子ハ必龜背ニナルゾ

△任脈ヒツハツテキ<sup>セ</sup>ルノ管ノヤフニ<sup>ナ</sup>ツテ神関

ヨリ心下ニ連ルモノハ死ス。是実花ニ出ス百發

百中ニ





時上  
衛厚也

リ鞭満ノ動氣スル水飲ノ動ト同シフコテ混コヤ  
スコ直按之築然ト細カニ又大サニ動スルモア  
リ其動胎停ヘ連ナラヌニ外候時心煩等ノ墮ト  
右ノ動氣参考コテ右以鷓鴣菜下之ニ蛇虫之脉  
ハ數或ハ大ニ脈中ノ動氣テヨウト其脉心ス  
ル丑ニアテナラヌニ

右ノ陽明厥陰係リ鞭満スルモノハ肝胃之肝  
胃別血不知故紫胡或四物ノ類通例喫フナリ  
左リテ腹痛スルモノハ虫積カ食毒或水飲右  
依テ痛ムモノ皆血之右係ルモノハ葦雲微矢笑  
散高良善血劑ヲ帶タモノヲ以テユカ子ハ治セヌ  
久腹痛ハ皆水飲ニ輕キ者ハ附子粳米之男ノ右午

蓄血癰囊

淋

之直ニ飲物カハルニソレヘソツテ運化セス故  
吐水スルナリ癰囊醫學正傳曰痞為心窠囊  
者用紅花托人トアリ東坡ノ説ヲ引テ昔クゾ是  
ニ因テハ癰囊ハ水癖ハカリヲモナク畜血モ  
アルトコエ温脾血劑ヲ兼テ療コテ佳ニ矢笑  
レノ差可ニ癰囊ニ吐ク処ノモノト時疫ニ畜血  
トス処ノ物ノ色大旨同色ニテ血ノコウナルナリ  
赤小豆ヲツイタヤウナリ吐キ下スコアルコレ  
ニテ癰囊モ血ヲ兼ルヒノト見ユルナリ癰囊  
昔キ汁ヲ吐ク者ハ苔汁ヲ吐クニ法  
右ノ少陽厥陰ノ方ニ係テタツニハハリ筋束  
ヲアリコレヲ痞氣ト云其味テ癰囊コテアルモノ

シ癰ト云是七所當ニ小見ナラハ竜會丸  
右ノ通り痰癰アレハヨク物ニヲドロクスヘ抑肝  
レ竜會丸若クハ吐之モ可ニ小版ハ腎氣衰レハ  
脊下任脉通りクサツクニ甚キオハ任脉通りハ  
漏カ山ニ束ルナリコレヲ精竭ルトスコレハ且非死  
スルニ其漏ノ間ハクサミト~~ハ~~皮指ニ版カ左右  
ハ開クヤウニナルニ腎氣衰レタルモノハ小版膨  
滿ノ不軟カタイニイワレス禪地立坐禪ナトシ  
キツウニタモノハ少腹ニ堅セリアルナリ  
**△**腰痛ヲモノシ皆疝氣ト心得ルハ惡ニ疝テ腰  
痛スルモノハ脊ノ廻リ滯結ニテ痛クモノハ疝ニ  
ソレカ甚コリナレハ右ノ方ヘヒツハツテ腰ノ方

ヘ連ナツテ痛者疝ニ腰ヲメテ凝結スルヲナクシテ  
腰痛スルハ是腰痛ニ小版クサクニテ腰痛スルモノ  
是皆勞ニ得ル腰痛ナリ腰肉脱スルモノハ死ス  
ルナリ臍骨アラハルニ必死  
**△**腎間動ノ一按ニテ得之ハ怯懦ノノ静ナル者  
ハ甚ニ腎氣ノ衰ニ指下ウルヲモ腎氣ノ衰ニ  
腎ハ主五液故脊下ハ別ニテウレシモノニ輕ク  
按テフハニスルハ陰処ニ動ニ重ク按テ不持モ真  
陽ノ虚ニ頓死スモアルニ勿版ハ膨滿スルヲ以テ  
良トス  
**△**小便閉ハ任脉回骨ニセツテ塊ヲナスソレ  
小便ニユキヲカルニ

衛脈  
脈ノ  
フ以テ血  
フ以テ血  
フ以テ血  
フ以テ血

△血室膀胱ノ裏ヲニ其裏カ直腸ニ直腸ト膀胱ト  
間、アリ膀胱ノ先チカ陰莖直腸ノ先チカ肚門血  
室ハ肝藏ニ係テアル肝血ニテ血室ヲアシナフ小  
児ノ胎トカク右ニヨル子嗣右カラツカケル  
カレテ肝ニ係リ居テ明白ニ婦人畜血トカク右  
ニアルニ搏ハ痛ニ肝カラリクエニ右ニアリ  
ウチニ右小脈ニ瘀血ニテアルハ皆畜血少脈ノ  
イタムニ食積虫積ナイン皆畜血カ病ニ左リ小  
脈凝結ニテ痛ニ其ワケハ任脈陽明至ノ寸衛ヨ  
リ分一陽明至ノ寸口ニ瘀結ニモノアリソコ  
テ温経リ、吳茱萸羊夏麥門アルハ陽明位、ア  
ケタモノト見ユルナリ菴人承氣モ大黃ヲ陽明

ノ節下ストナラザリ  
△少脈、燥屎ヲタクワユルハ必左ノ横骨ニセツ  
テ累ニト塊ヲムスフ左リ十分ツ一タ上ハ右ニ  
連ナルニ搏之イタニ又ニクレツキ且長キニ  
△婦人始娠ヲ知ル法百日ナラサル寸ハ知レカタ  
ニ百日スレハ任脈ニアタリ横骨ニセツテ雞  
卵ナトノ塊ニ来ル豊滿、ノ正キニ血塊ハ稜立  
テ堅ニ任脈ハ任脈ニアタリ血塊ハ少ニ右ニヨル  
但ニ始娠ニ又右ニヨルモノニ稀、アリ然ルハ  
血塊ト分ナカタニ其分ナハ痛ニ不痛、アルニ  
サテ始娠ハ少脈膏潤ニ血塊ハ皮膚枯燥ニサテ  
月、五、六日テ胎神闕連ニ者コレヲ按スルニ痛ム云

ノアリ胎ノ痛ハハアラズ癥瘕ノコトハナリ然レ  
疝痛ニアレシ胎ノヤ否ヤヲ分ケカメシ心卒  
ノ拮之場ハナメ節モノアリ且中子精氣尤備ル  
備<sup>カ</sup>カタノ少脈薄淡カリ是胎ニ

△脈ノ備ヘ蟬肚ノ如キモノヨトス心下スイテ下  
張リヲ云但コカ見ハ反之脈ノウフ毛膏淡アレ  
モノヨシ脈拮之ハアツトリスルカヨシ

△神闕大<sup>輪</sup>メ深キモノ壽シ臍ノ小ニノ淺キモノ  
ハ精ヲ養ハ子ハ不寿且臍ノカタキヲヨシトス  
ルニ突コタル人ハ臍ノクタク部アリテカタシ是大

△病ヲ得テモ治シ易キハ臍ノクタク部アリテカタシ是大  
病ヲ得ルハハ治ト心得ルニ又腹皮ト肉ト離レル

モノハ虚ニ虚勞ナト多如女ニ皮ハカリツフノ  
ルニ章門チカラナリ綿ヲ拮スルカ如キモノ其  
方後甘遂章門竅チスルモノハ偏身拘急ス拘急  
スルモノハ止ムヲ得子ハ下スニカタ失フハ多  
スルニ

△任脈アタリテハコノヤリナムモヨメクアルモノニ  
コレアルモノ、アラハル、ナリ

終

嘉永四年 亥年 六月七日 早之

縫系ラ切ハ深淺ヨラス。凡七日程テ切可最瘻口愈合タルカヲ見テモ  
引ヲ以テ系ヲサワリ見愈合タルハ系ヨクナリクサクトナル寸一針ツ間  
ヲ置切取左右用セ置其上膏葉ヲ貼。明日膏葉ヲハキ取時自膏  
葉付キ抜ルナリ。板取タル跡ニテ木綿ノホツコヲ置ソノ上。木綿。白明膏ヲ  
攤敷。淺瘻テレハ六日。目深瘻ナレハ八日メナリ。但白明膏キリニテ無覺來時ハ  
白明膏ニ鶏卵ノ黄味ヲサシ加テ平ニメ可貼。平知膏ヲ貼ス。無用ナリ度  
暑中ノ瘻ハ三日或四日メヨリ白明膏ニ鶏卵黄ヲ加テ貼ヘ。久シク金葉膏ヲ貼  
ス。ハ瘻口腐肉ヲ切ルモノナリ。焼酒無時ハ酒或天水ニテモ良。但婦人少兒ナトノ  
氣弱キ者ヲ洗寸ハ花ノ水ヲワカシ卵ノ白味ヲ入。焼酒ヲ加ヘ洗フヘシ  
婦人少兒ノ縫ナリ難キ者ハカスカイ膏テ瘻口ヲ合スヘキナリ。

○カスカイ膏 玉乳膏 三枚 蕪香油 一匁

右挿揉蕪香油ヲ鍋ニ沸シテ乳膏ヲ入以挿煉リ至テ微火ニテ  
色黒クナル程ニ煉リ出エキヲ良トス。若換膏油無寸ハ油ニテモ良シ  
カスカイ木綿之膏

夫カスカイヲ扱ハ大袈裟痲痺肩剛イ何レモ深痲絶タル上亦縫ヘソヘルモ尺以テノ痲ニコレ処モ見合ニ扱クヘシ

〇ニ 手掌痲縫

手掌痲直中ヨリ縫初也先瘡ヲ正方ノ通中ニ糸ヲタクラカシ亦正方ヲ通置次ノ針ヲ縫寸右ノ糸ヲ手得コ手前ヘカ正ニ幾度モ右ノ通コテ縫フニ不残糸ヲ通置一同ニ結是之故也直ナル針ヲ縫フニ是一流ノ秘ニ

三

〇鼻下或眼下周レモ針ノカワラヌ処ハ手掌ノ痲ノ仕掛縫フヘシ指ノ間モ同前ノ耳ノ痲モ手掌同前ニマリ処ヲヨク考フヘシ但コ耳ノウレヲ肉ニ縫付ルニ

四

〇腕ノ一文字痲血筋ヲ切タル寸イカヨウニモ出血止サル寸ハ焼針ヲ當ヘシ当杖ハ焼針ヲ赤ク焼キ水ヲサットヒヤシ草色ニナリタルヲ血出ル筋ノ小口ヲ焼燂ス此サレナレバ大梁ノ岐ハ瘡斗リ皮ヲツマミアケテナリ縫ヘシ左ニルモ此痲痲縫様ハ奥ノ縫亦集ニ縫フヘシコ傳ヲタシ

〇六 缺唇ノ縫掛

缺唇ノ仕掛ハ先双方ノ肉ヲ按テサ計切リ先エサ切ルヘシ是ハ唇ノ方ヨリ縫初政先ニテイサル故ニ先エ切置ヘシ扱湯キニ焼酒ヲ浸シ痲口ヲ暫置伏ヘシ縫杖ハ唇ノ小ヨリ縫始メ是ハ唇ノ肉中ヲ通コ下エ糸ヲ見ハサノ扱ニスヘシ中ノ針ハ下ヘ糸ノ見ルヤウニ縫フヘシ是ハ肉ノ方ヨリ縫ヘキ処ヲ縫縫故トヨリ右ノ通リ縫フナリ縫ト針細ニ縫ヘシ双方痲口ヲツマミ上ケ縫ナリ但療治ニ成トナラサルトシ能見合療治スヘシ患者年十二四迄ニ最堅キ食物或安或アクヒナト能ニ不致扱養生大ナリ能ニ万葉合点致サセ置ヘシ療治大ニ得ヘシ

右缺唇ノ仕掛奥ニモ一條アリ双方見合ヘシコ一流ノ仕掛ナリ

七 水カキノ瘡

水カキノ瘡ノ指ノ間ニ薄皮縫ク者アリ其色ニツアリ指ノ間タルツリト付タルアリ針木綿糸ヲ通コアポスヲ塗指本ヨリ通先テ縫書ハ府田切ルナリ又ラニセツタテ切テモ良瓦常ノ仕掛ナリラニセツタテ切ル寸ハ氣付ケ

廿中反燒針亦用意心得有ハハハ傳

八 鉞鉤玉管電疾ノ疾

南蛮國ノフニスト云物ヲモノ入口ヨリ入レハ則玉出ルニアマン五無寸ハ章腦燒酒テモ水空ラ以テ洗煉膏ヲナシ龜ヨリ魚ルヨウニスヘシ。如圖ノハタル玉玉板テ難板キ故右ノ任掛ニテ玉出ルモノナリ。卷不綿ノ拉ヲ作テ結付シ

九 疔疾釣竹函

金倉縫テ右二日或三日経テ血走ルテアリ其時テレナシヲ不綿浸シ縫タル上ニ付ル三日余モ其終置ヘシ

十 軍中早療治ノ疾

手負數多有寸ハ常クノ療治ニル上日漸三人ナラテハ難成夫故先燒酒テ常ノ通リニ洗フヘシ扱縫扱オハ心得先療ヲ押合セ針長糸ヲ通シ疾ノ初ヨリ縫シ始メ申テ又夕一針ヲ通シ糸ヲ掛合セ亦共ニテ縫一針ニ針呈宛縫初針如常ニ卷ニ縫シ結ヒシトモ結ヒ中針ハ左右ヨリ掛合セ三針目ハ初針同前ニ卷結ヒ右ノ通リニ針ヲ結ヒヘシ明日中ノ針ノ糸ハ

十一 鼻血留ノ疾

前ノ糞ニツ三ツ 右大ニ林大ナラ糞則留又方鯨ノヒケ焚自糞

○南蛮流金創治方口訣大意

凡金創治法ハ先患者ノ容体ヲ見疾應シ夫々用貝拵ハ置熱湯燒酒加見加減ニ湯キヲ以テ血留リ洗去ヘシ但シ老人小兒婦人萎何モハ可痛ト思フ寸ハ花ノ水ニ印ノ白味ヲ加ヘ若花ノ水ナキ寸ハ天水テ良備瘡口シ双方ヨリ押合テ大指ト人指指ト瘡口ヲ押奇世疾ノ真中ヨリ縫始メ左右須ニ能縫ヘシ疔疾ハ六筋大袋袋瘡肩用此疾何レモ大瘡ハ八筋用尤瘡ノ大小淺深ヨリ増減アルヘシ本方ニ筋ト有サレ厄間ニ肉ヲ切テアル故當代ハ細ナル糸ヲ數条用キハ糸平目ニナルユヘシ肉ヲ切テナシ備初テ縫タル糸強シメ結ヘシサスレハ吹テ縫合タル中同シマリニナルナリ又夕大瘡ニ針多

掛ルハ初二三針ハ上結引トキニスヘシ是次々縫寄、從テ初針全ルモノナリ  
夫故、不殘縫任并、メ初ノニニ針ヲ又タシメ直スヘシサスレハシメ加減四枚  
ナルヘシ加減不同ナルハ必田ク切ルモノニシテ一流ノ秘ニ且之也ト傳

○金瘡生死見令

面目肌色白ハ生

面目同色成ハ半生

面黒目青ハ生

面赤目黄ハ必死

面目色黄ハ生

面青目黄ハ死

○手足ノ悪性

眼空、付洞有

額、有汗、瘡口燥色黒

誤言妄言

鼻ヒユメク

吐逆シコ明アクシ冷テ唇乾シ

身伴スクニ振

腹痛心物吉シク

脈大張リ、手足熱有汗

○創脈

脱血ノ脈公沉小者生、浮大ハ惡、出血過多ノ脈ハ虚細者生、浮大數實ハ惡  
瘀血内、有時ノ脈ハ弦實者生、虚弱者死

糸川方

頭面ハツリ疾、肉ノキ瘡口合ス肉不足時ハ先焼酒ニ能ク洗、瘡口綿メイチ  
ヤ或ホツシメイチヤ、煉膏ヲノヘシシコモ其上ヲ左右ヨリシテ合縫ヘシト  
ヘハ深疾、捺ラサス上同意ナリ、左ニ因リ記ス、母

一文字疾、腕首四方呈上三切落手ノ肺経脈筋通肉ヲ掛リ皮一寸五分  
呈付落下リタル其上三腕ノ付平筋、骨半分余切タル事アリ右左寸ハ

先落下リタル腕、カリニ添木ヲシテ跡先ヲ縫付置キナクシサレ、致シ

置扱夫々ノ道具拵ヘテ療治仕掛クシ骨ノ切ラ改メトカリナキヤ

ウミ切取焼酒ニ能ク洗助速ナキ、杖ニ随ヒ見合セ念ヲ入能縫ヘシ、傍平

怪

目、添木ヲシテ黄膏ヲ塗付結付亦不縛、モ入り付、臍ノ通処ヲヨケテ添木四

ケ処呈モアテ木、黄膏ヲ塗エリクビリ其上ハ金創定ノ仕掛、スヘシ、傍卷、

随添木ノ間、亦添木ヲ入次カ、巻ヘシ但シ四ヶ処、添木ニ疾愈分迄動サス置

ヤトウク四ヶ処、添木ナシハ、巻ハ、瘡口動ク政不動置物ヤ、且四ヶ処、添木ハ

大方愈合申一々ツ、杖ニ、詩不動杖ニシテ七日、宛坐直シラスヘシ、血通ルヤ

ウ、スヘシ、傍卷、毎テ腕ノ置杖ハ、横、女竹ヲヒキ、トシテ、母竹ヲ上、度、本

綿幅ヲ輪ニテ腕カケ上ヘノ竹ヲ加減ヨキヤウニツリ置亦腕下ニ腰カ  
ケヤウナルモノヲスレサセ其上ニ衣服ヲ和ノ置ヘシ縫扱口付

△眼中ノアヌ或ハ竹不テ突破タル疾ハ先湯花ノ水ヲ加ヘハ之焔高シテ又夕  
乳汁テ紅粉ヲ解其中ヘ拍辰砂糸ヲホク合支メ付ヘシ

△口中ノカマニテ破リ古切割タル疾ハ針ヲ掛ラルヘキ処ハ縫ヘシ膏ハ焔膏  
ヲ付安療收珠傳授アリ坎中リ疾ナラハ蜜ト糞子膏トキ合セ乳香  
ホツカ加ヘ付ヘシ

△婦人産産テ産門破ルコト有リ疾ナラハ縫ヘシ細ナル疾縫ニ及ス胆腸  
ニ焔画ヲ加ヘ花ノ水糞子拍ヲ加ヘ惡血ヲ以去ルヘシ久布 熱性ノ膏シテ  
スルコト勿亦産后子宮出タルハ艾ヲ剪シ以テ能ク圍メ具上知ノ油ヲ塗リ又

△腰腹ハイノトノ油ヲリテ良即入更奇妙ナリ

△小兒湯火燒テ頭ナト焔毛不生ハ雄伊由ヲ塗付若又毛生シサル寸ハ毛生  
ケシ此スヘシ マコモ キン草 小鮎 右ニ味鶏之由テトキ立付ル

類先切サケタル疾ハ足年口中木綿ナト内ヨリ類ヲ張セ然ルヘシ然ラサルハ切  
能紋リ付其上酢不綿ヲ付ヘシ又打身クシキ身直身何モ仰酢焼るナ  
後方金剣同然能巻ヘシ(辨)如埃ノ疾ハ上ヨリ一麥ニ縫込テ下直  
下ルニ 若又口ノ方ヨリ 耳ノ方ニ文字切名疾ハ口ノ方ヨリ縫込  
ノ但コ口内ヨリ能ハテ両方ノ疾口取合見テ腕ト握ヨセ撮アケテ糸ヲ内粘

通テサル様ニツフニ縫ニスヘシ壁ハ給ヤ縫ヒテ給扱縫心持テ縫フナリ  
内付ルハ糸葉ニ吹込テモ良 又仰ノ黄自扱交付モ良巻木綿如常 物ノ類是ナ  
トノ疾ハ皮肉匠ニキリト巻込故夫ヲ能ハハ階ハ皮ヲノツマニアクオニ  
但コ又口迄切ワリタルハ口ノ方切端ヲ一麥ニ縫留ルナリ (患)瘻ハ豎直切タ  
ル疾ハ先口ノ際ヲ縫置糸ヲ女縫セス解ヨキヤウニコラキ夫ヨリ上ノ針中  
ノ針縫テたノ結ハスヘシテ置タル解ハナシ血留シ以テ出シ夫ヨリ女縫ス  
ルナリ口付アリ

縫扱口付但シ縫江糸ニカスカイ掛ルニ 加扱  
ニツカイ切治タルハ巻キ木綿中リニテハ切口開キ糸テ肉ヲ切ル故右ヤウカ  
ス掛ルナリ最有障目ノ通リニシ疾口ニ針ニ縫結其上木綿ヲタテ合セ  
一瘻見合右ニ針ノ上ニツイイ右ノ縫目ヨリ三四歩至モ深ク掛壁ハ



ニツカイ切治タルハ巻キ木綿中リニテハ切口開キ糸テ肉ヲ切ル故右ヤウカ  
ス掛ルナリ最有障目ノ通リニシ疾口ニ針ニ縫結其上木綿ヲタテ合セ  
一瘻見合右ニ針ノ上ニツイイ右ノ縫目ヨリ三四歩至モ深ク掛壁ハ

フヤスルヤウニ縫置ニヌカスカイノ下ニ金脂膏ヲ塗リ置上ニ常ノ金創ノ仕  
撒ニ仰不綿ヲ覆ヘ其上卷ニ燒酒ニテ白ク成星使テ縫シヨシ一々惡血止ラ  
ナルヤウ專ナリ又柳子由心得アルヘコ口付アリ大キ

△缺唇ノ仕撒先療佐ヲ請ルモノアラハ其人ノ口元ヲ脛ト見合能々恰好シク  
メ療後撒ルヘコ随少療後叶フモノナリ西方ヘ引介ケ見レハ薄皮アリ其齒  
皮ヲ缺テ切疔ニ取肉ト由ト合ヤウニメ恰好ヲ見合燒酒ニテ白セルニ  
ラ上常ノ疔ナラニ針ノ処ヲ三針ニ撒縫ナリ但ニスキイ縫ノ心得テツ  
ニ縫フニツマニアケ淺ク撒系ノ中ニ出ヌヤウニ肉中ヲ通シ縫フヘコ随少  
際物ナリ其後金創ノ仕撒スヘコカスガ正膏ナシ卷木綿スルナリ

△水カキトテキ足ノ指ノ間ニ薄皮續々者アリイクナト切心テ左右肉際ヲ切リ  
方ノ金創ノ療以メ括リ別々ニ卷木綿スヘコ

△三指ノ肉痛指ハ先骨有テ根本ハ骨疔テ有ナリ先切処ヲ極メ二三日モ膏ヲ付  
スレテ糸デ収メク卷置其糸ハ肉切膏ヲ塗リ付き切ラント思フ処ニ毎々卷ヘコ  
洗ヒヤウ兼テ心得アリ眼ニ疔通リ湯洗山洗フヘコ疔口ヨリ燒酒ニ入  
ヤ息ニ障リ縫仕并后咳ヲ奈テ糸ヲ弛切ルモノニ疔廻リ常ノ通リ洗フ  
疔口ヲ洗フナハ湯手燒酒湯ソビタト付湯手ヨリ不流ヤウニシテ疔口ヲ洗  
フヘコ兎角疔ニ燒酒ノメサルヤウニ洗ヘコ是レ疔ナリ縫扱付有

△腹痛タルハノイテヤサズ惡血ハ大便ヨリ下ルモノナリ然レ比初ハ燒  
酒ニテ血ノカタリナキヤウニ洗フヘコ若腸兼ハ平生ヨリハ随少燒酒アツク  
メ洗テ亦兼ハ眼カシホコロハシ入ルナリ腸今疔縫仕并該付ト又々内疔疔  
処スハルモノナリ又ヨリ助鳴或ハ血ヲ吐浮スルト有驚ク一勿レ縫扱兼ハ扱口疔

△疔差生レ付テ皮カカリタルヲ世俗ニホト云小便ナト至テ惡キモノニコ  
切如針カチシ曲ケ内切膏ヲ塗エカト扱置自然ニ切入腐ルモノナリ思扱  
切入夫ヨリ扱切見古文ニ直ルモノナリ口傳

△十文字疔傳ハ切箇ノ如ク切タル疔先常ノ如一通リ縫シキ中シガ  
ツ疔置並又横疔ヲ右ノ如縫仕并直疔ノ角ト角ト針ヲ撒較ト縫切  
リ又外ノ角ト角ト針ヲ縫フナリ先口傳ト云ハ是ナリ外十文字内十文字

△疔置並又横疔ヲ右ノ如縫仕并直疔ノ角ト角ト針ヲ撒較ト縫切  
リ又外ノ角ト角ト針ヲ縫フナリ先口傳ト云ハ是ナリ外十文字内十文字

痲瘋杖左同ス外十字字~~目~~内十字字~~目~~

シクヒキツ~~カ~~ノ通リサケタルリ上下地痲縫添ルナリ但切下ケタルハ針通  
ナス縫添ヤ~~カ~~杖ナケレハヨリカタニ番目モ聴ト縫添ルナリ跡ハナトリカ  
是ヨツテヨクヒハ秘傳物ヤコ付アリ  
丹~~此~~シクヒ~~ノ~~杖ナリ

ソケ痲~~ノ~~リケ方落ルナリ故深タト糸掛ルナリ是即ナコ付ナリ物惣面ガ  
キタルヤウニサツハリトナキモノニ急用照機度変ニスヘシトシクヒ~~ノ~~杖  
ウナリ~~カ~~杖ハカスカイノコ付アリ~~ソ~~ケ杖~~ナリ~~  
其間夕廣故~~ニ~~続カス是シクヒ~~ノ~~杖ナリ

○卷不綿ノ法尺

頭痲	八九尺	四割	頭柱	五尺	四割ヲ二割
腕痲	六七尺	四割桂尺五寸	頬痲	四尺五寸	四割
腕痲	八尺	四割	心痲	二尺	三割
耳痲	六尺	四割	豆心痲	七尺	四割
豆甲痲	七尺	四割	膝痲	一丈	二割
談唇	五尺	幅一寸	同柱	二尺	四寸

○南蛮流金創師語録金書

人手肩~~ノ~~向テ可心得~~テ~~尺尺々~~ニ~~差多ク~~ニ~~縫理深故紙面難書~~ル~~尺~~ノ~~糸~~ノ~~切イ  
道~~ノ~~引~~ノ~~夕~~ノ~~不~~レ~~死仕~~テ~~撒~~テ~~前後~~ノ~~不~~レ~~力~~ニ~~扱~~テ~~記~~シ~~諸~~ノ~~深~~ニ~~手~~ニ~~テ~~モ~~浅~~ニ~~手~~ニ~~テ~~モ~~先  
風~~ノ~~不~~レ~~当~~テ~~扱~~テ~~早~~ク~~痲~~ノ~~口~~ノ~~木綿~~ニ~~テ~~モ~~巻~~テ~~痲~~ノ~~底~~ニ~~ス~~ル~~夫~~レ~~々~~ノ~~用~~テ~~貝~~ノ~~拵~~立~~先~~ニ~~木綿~~ニ~~燒~~テ~~何  
至~~テ~~酢~~ニ~~針~~ニ~~糸~~ニ~~燒~~テ~~金~~ニ~~添~~テ~~不~~レ~~仰~~テ~~浸~~シ~~木綿~~ニ~~是~~レ~~ハ~~ノ~~痲~~ノ~~底~~ニ~~ス~~ル~~ハ~~ノ~~酢~~ニ~~木綿~~ニ~~蓋~~テ~~木綿  
石拵~~置~~痲~~ニ~~取~~テ~~撒~~リ~~少~~ク~~モ~~ノ~~間~~ノ~~不~~レ~~扱~~テ~~扱~~テ~~一時~~ノ~~ハ~~ノ~~外~~ノ~~ト~~レ~~仕~~テ~~撒~~テ~~任~~テ~~見~~テ~~可  
致~~シ~~是~~レ~~語~~ヲ~~兼~~テ~~心得~~テ~~可~~レ~~置~~テ~~者~~ナリ~~

燒酒煎木綿ノ湯手~~ニ~~ツ~~ツ~~モ拵置~~テ~~燒酒ノ内~~ヘ~~入~~テ~~堅~~ク~~固~~ク~~間~~ノ~~扱~~テ~~ナルヤウ~~ノ~~痲  
ノ血~~ヲ~~サラ~~シ~~ヤウ~~ニ~~コ~~シ~~能~~ク~~ス~~ル~~ハ~~ノ~~必~~ズ~~痲~~ノ~~内~~ヘ~~座~~ニ~~色~~ニ~~者~~アル~~モ~~ノ~~ナリ~~随~~  
念~~ム~~痲~~ノ~~口~~ノ~~改~~メ~~可~~レ~~是~~レ~~若~~ク~~痲~~ノ~~内~~ヘ~~ハ~~ノ~~カ~~アル~~ハ~~ノ~~愈~~テ~~后~~ノ~~痒~~ク~~或~~ク~~フ~~ク~~上~~ル~~

有ナリ況ニ疾淺深ヲ能可心ハ其寸サクリシテ深サヲ尋置亦冬ノ疾或  
同タツテ冷タル疾ハ燒酒ヲ以哲洗可温或時ハ疾ハハルシイオテ能者ハ  
縫扱ハ瘡口ヲ四ヨリ押合大法五分穴タルニナキ扱可縫切下去疾延依  
テ二分四分或五分寸可縫疾或穴大張少立割或肩ツカイヲ切縫ニ夕  
ルニハカスカイシ揶享アリ付

△疾ヲ縫江身テモ心ハキ有縫圓ニ血留リ流シ不出支有糸テ疾下ノ  
一針ニ針糸シ結ハス置ヘシ左有寸ハスカイ一疾横疾管疾テモ疾底ニ  
切ノ上ヨリチテ和サクリ流血ノ上流取糸ヲ結双ヨリ縫圓ヲ更夕  
バリユカシチマリ扱可也左

△深手ニメイナヤ可指疾有其時ニ疾ノ深ト思外ノ縫目ヨリ一針ニ針下ケ  
テメイナヤ下ノ上ヨリ上ノ下ハ可指ナリ

△疾ノ深淺大小ヨラス柳子仲ノ區メ瘡ニ入ラサルヨウニ疾左右ノ廻リエリ  
ヘシ鶴印ノ黄白ニ煉石木綿ノ切ヲ大小切リ積蓋ヲ指印ノ黄白浸シ  
取上ケ能加減指テスユキ疾口ニ重三重付又木綿ノ切木酢シ浸シ取

ツノ間ヲ置可切淺疾ナレハ二日或ハ三日テモ切ヘシ深疾ナレハ五日七日テモ切支右  
備系扱扱ハ今日切置明日扱ヘシ系扱取跡ハ木綿下ツレテ疾口ノ面ソ付創  
高シ可付付

△頭面ノ疾ハ先腦ノ内切破リ名カ不破カヲ能可心付腦ノ内ニ大刀ヲ入ハ必死  
スルモノニ疾ノ仕揶前同シ下去頭迎ヲ別タル疾骨処ハテ肉サク愈  
云氏瘡ノ骨キワミテ肉ノリツ兼ルモノナリ其寸骨ニソケヲ以テ瘡ヲ  
骨角ヲ双方瘡ナルヤウニソビトコソケ取テ肉ノ行合ヤウスヘシ  
必肉双ハヨリカハルモノナリ

△頬先ヲ切或ハ鼻ヲ切割或ハ口ヲ切割或ハ唇ヲ切割或ハ舌ヲ切割或ハ  
ニ物テ面瘡縫扱如宛心得有針糸縫扱兼巻木綿等夫々瘡底ニ付  
ヘシ

△頬先瘡縫テ唇肉ヘククリ込有有其心得テ瘡口一分半至二ヨリツク津  
ケ四五分至ツク置テ可縫付  
△縫扱ハ上唇ニ処口縫又下唇ノ方ニ処口縫ヘシ下唇モ見合縫ヘシ

白 缺唇ノ縫扱ハ先面ヨリ肉ヲ切リ能ウエラトリ今次オニ可縫口傳アリ

白 耳ノ縫扱ハ肉外ヨリニシテ所ヲ考見合ニ可縫口傳アリ

白 鼻ノ縫扱モ右ノ如押合セ見合ニ可縫口傳アリ

白 頭鬢巴ノハツリニ疾者創扱ハ心得アルモノ之余リ上リカノリスクレハ創テ跡

肉高クホテ見ニクキニ何レモツリニ疾ハ創口疾ノマハリヨリ創テ行者

ニ肉多クカニテハ肉ノクルリニ多クスイ肉ヲ可押或肉流カツテモ良矣命

合疾ノ合ハ茶碗物ノツキモノト因事ナリ本ノ如ク合セテモ出入ナクヨウ心ヲ須

可縫最難ニ疾ハ手履養生肝要ニ先怒リ收立高聲或笑或坐合知

堅可慎免痛物ヲ見レハ心面テ頭高クニ疾ノ出テト十口ニ創テテ切ラサル

間ハ人ニ不令痛深静ナル処入テ心気ヲ沉テ能養生肝要ニ 缺唇片大支

ハ字更ヲ堅ク可

白 咬ニ疾ノ次ヲ横カキ切リ或筋違カキ切或ハ突タレ疾アリ 仁掛前ニ同倍先焼

酒テ疾ヲ押合テ頭ヲラセテ咽ノ高骨ニ目ツ付テエカサルヤウニ

針縫テ治ヲツ見合セ可縫扱ハ息ノるル処ニ息ハスニ強ニ四ツ針縫ニ

大小ニ應テ治ヘコ突込深ク疾ハ大アラハ疾ノ内ハサクリヲ入レ考見ニ

メイチヤラサスヘコ右疔疾ノチ頂ハ居位身ノ持様肝要ニ頭カタカ

サルヤウニ寄カラセニ疾カマイナキヤウニ可置又夕疾縫仕テ直

ハ何ニテモ用間布必吞タカル者ニ無用ニ疾ノ物ヲモ吞セル寸ハ

疾嗽出血夕吹ホコウツリニ惡布者ニ 療治は毒 咩 通ニ葉

カニツ用ヘシ焼酒ノ加減縫扱頭ツ上ヨリワリ竹ノ仕法各傳アリ

白 ツカイ疾ノ次オ一文字疾ノ心得肝要ニ 肩関肘腕腕腰ノ大関

手是扱ノ指同膝同其最善多オ一文字疾ノ療治大要トス或ハ筋違

疾立疾ニ一文字疾ノ骨三分一切ルモ有或ニ合ニ切或骨ニナ切レ肉許

ニテ留テ有最善通ニ疾モ其最善多ニ筋縫テ筋違ニ疾立疾ハ肉ニ付合

有故仕扱モ心易者ニ 口ニツケ布ニ疾ハ一文字疾心得ヘシタトハ関


続タルモ本ノ如ナルヲ稀ナルヘシ余ニ療治ヨリテ十ノモノハ四分六分是自

田叶スル者ニ 虎角スル者ヲツケハ創テ曲ルト心得ヘシ曲ルモツケ

ハ愈テ直ナルト心得ヘシ関々ヲヨク考テ取合縫才綿ヲ疾ノユカマサ

ルウニ可巻又右疾添不シテ合口遠ハサルヤウ可巻クホシアル此ハ  
カイ本綿ヲ入添不ト身同扱ニ思付タトハ手振豆ヲ勤スル此疾ヨサ勤道  
サルヤウニ可取合是才一所要之亦指切落シ或ハ腕切落シ血不止  
有其時ハ幾金ノ心得可有肩同疾大加緊以ハ腕扱シコイ肩先ノ  
下ヤタレサルヤウニ本綿テ輪ヲメ腕ト首ト掛サセ置ヘコ付有  
ハ脈疾オハ脈傷ガハ先凡ニアタテサルヤウ早ク夜ヲ掛同テ防ノヘコ付  
ハ脈必ス強者ニ諸ハ撒ハ先度酒ヲ以テ血留無扱ニ能可燒燭ノ加減  
ヲルクスレハ腸必悪腸内ハ心持手ニ纏故燒酒ノカニテ扱ニ可サスレハ  
腸ニツカリトシテチハ心有テ有キ者ト腸不入時兼府ノアル此ヲ能合  
メ扱タ高クナリヘスリ下リニ治セテ是ハ後ヨリ人ニイタカセナリヘ  
ニイタシノ豆延コ左ノコシテ座セハ腸入者ニ腸ノモツレサルヤウニ  
左ノ豆ニテ腸ノ根ヲ出ル所ヲ迄ト右ノ手ニテ腸サキノサワリク  
コテ須々ニ可入手腹ト迄モ心ヲ乱スモノニ按理テ可入引息腸張リ  
ミツル時ハ手ヲヒカヘ何ノ子細モナクハル者ナリ縫扱ハタトヘ五サ六  
引ステ一処ニ縫置テ須々ニ縫フヘコ治ニ腸入テ后一日モ或ハ二日モ腸ノ肉  
甚ク痛或ハ吐逆或反強振或同舞セテ守絶ス一有具寸チフ醫石扱  
有モノニ余介腸女ニテモ疾付タルハ無加減能可巻タルニナキ扱ズヘシ  
惣メ居タルヲ巻ハ扱タル可ハユルモノナリ能ハ心ヲ付大莫スヘシ又手腹  
扱ヲ下クサセルコト宜ク可禁能心ヲ付テスアスヘシ血留リ色々ノ悪性出  
モナリ又手腹扱サセ脈疾不愈内ニアタノチニ寐スレハ悪血膿水臍  
臍へ後入必ス病ヲ生ルモノニ去ロ士ニ脈疾ハ愈迄悪血膿水ト下流ルヤウ  
舟持サセ高扱シ祇下ニ血留サセ置者悪血膿水ト下流ルヤウ  
能ハ心付ヘキナリ腸入シハコ付シタシ

**鉷** 鉷根鉄鉤 痲何レモ燒酒ヲ以テ水穴ニテ洗惡血滯クサルヤウニ可流  
取メイナヤハ煉膏ヲ痲口へ指入ルヘシ縫ハ表裏ム子ワテ痲ナラハ必スヨリ  
メイナヤ同ニ可シシキ指合スヘシ堵愈隨テ短クスヘシ亦鉄鉤ノ玉壹  
皮肉ノ間ニ近ク有ラハ玉ノ通リテ  
有玉ハ痲愈ニシタカツテ肉ヨリ張出ス一有出カタ玉ナラハ具供置ヘシ



煖身ハ先ハシメル事ヲ勉メシニ膿水お煩タラハ和ル給テ以テソノト膿水ヲ  
 細掛去高シホシ此替ヘシ  
 折身打以クキ身ハモ煖シテ温可洗沖茶ヲ塗付或印ノ黄白ヲ  
 棟名タト塗其ノ木綿テ可巻又骨折タルハ先引伸シ骨合焼酒ヲ  
 温茶ヲ付吞ヘコトトヨリニリ裡置付替又モ有テ折タル處以テ  
 夏代折ト云ハ能ク工夫スヘキモノナリ  
 一々ハケ所曰ハ耳ノ下動氣ニ所 子口ノ脈ニ所 喉反心尾  
 蟻戸渡脈ノリニニ所  
 亦曰西乳ニ下ハト下照有動氣是心脈ノニ処一製所ニ 具別  
 ハ痺ナルヘシ

壬子、秋於皇京半蘇家早

越中州

宮永正純

藏書

橘家腰候録

○脈大標

○夫病人ニ對シ、腰ヲ考ル丁、古書ニ委ク  
 記シオク丁ナレ、故ニ脈ノ昔云フ知ル  
 者至テ鮮シ、予若メ洛湯ニ在シ時、鍼術  
 ノ一老人アリ、腰ヲ考テ死生長短ヲ知  
 ル丁、掌ヲ指カ如ク、妙ヲ得タル者ニ余  
 彼老人ニ深ク望テ、腰一通ノ教ヲ習得  
 タリ、然ヨリ以來三十余年、病人ニ對メ  
 ハ常ニ脈ヲ考驗ルニ、漸ク脈ノ道理ヲ  
 得タル者ニ似タリ、故其有増テ言述、且

又暖ノ教一通ヲ傳授ヲ立テ我門下  
ル者ノ療治ノ助トスル者ニ然レハ  
書ヲ讀記臆ニ教ノ法ヲ得心メ病人  
向テハ常ニ心ヲ付テ考ヘ費ヘシ然ル  
寸ハイツトナリ。脈ノ虛實死生ノ分  
自<sup>然</sup>ト知ル者<sup>ハ</sup>。脾胃論云。脾胃病則  
當<sup>有</sup>筋<sup>之</sup>氣<sup>之</sup>。痛有者。其乃脾胃  
虛<sup>無</sup>者。其乃非<sup>心</sup>ト云ヘリ。是能脈ノ教  
ハニカナヘルト云。總ノ内傷煩ニ何病  
氣ニテモ脈ニ滞リノナキトハ無キ者  
之。脈ハ藏府ノ居処ユヘ。脈ニアラウ  
シ

スト云イナシ。既ニ病人見レナル以前  
ヨリ。脈ノ煩ノ萌シハ先テ出ル者ニ其  
身モ不覺イツトナク。脈ニ滞リ痞ハ出  
來テ。以右ニ病痞ニ見ハル者ソ。無病  
ノ人ニテモ。脈ヲ考ヘテハ。病氣ノサ  
出ル処知ル者ナリ。脈ニ太極ヲ立陰陽  
五行ヲ令テ。災生ノ教有之ト云モ。口授  
セニ。めニ。今茲ニ論セス。大法暖ノ痞積  
暖ノ美在ニ在ルハ。大方大莫ナキ者ニ  
メ。右ニアアル痞<sup>大</sup>事<sup>ハ</sup>ナルリ。如何トナシ  
ハ。在陽右陰ナル故ニ。陽令ノ左ハ治シ

易ク陰分ノ右ハ治シ難シ、同シ左右ノ  
痞ニテモ其形ニヨリテ差別アルトシ  
疾大事ノ痞ト云者ハ脾胃ノ元氣衰テ  
飲食ヲ刻化スル運用ノカ弱ク邪氣イ  
ツトナク滞リ集リテアハラヨリヒサ  
シクオロシタル如ク板ノ様ニ痞ル者  
ニ或ハアハラヨリ高キモ有り、免角ア  
ハラノ下ニクツロキチキ者ゾ、是中氣  
ノ虛ニ因テ自然ト集リタル数年ノ痞  
ニメ大變ノ痞ナリ、其痞アル人、大方  
ニハ腫起脹滿ノ症トナリテ最死病ニ

ナル者ニ然ル故ニ腫氣脹滿ノサニ出  
ル病人ハ先テ脈ニテ知ル者ナリ、絞  
テ人ノ腹ヨキト云ハ胸ヨリ下ニカ強  
ク下フクラニメ鳩尾ノ下上腹ノ処和  
ラカニメ動氣静カニ胸ノ上ニ滞リナ  
キヲヨキ脈ト云ナリ、然ルニ脈尽ク上  
ヘ取上リ胸ヨリ下ニカ弱クチニテ扱  
セハ夕ワイモナク胸ヨリ上ハ痞ハ強  
ク左右ノアハラ下マテ指ニ痞ハ或ハ  
袋ノ中ハ石ヲ入タル如ク脈ニダリヒ  
ズコ有テ動氣強ク或ハ曾テ以動氣カ

イナク、脈、カタズリノ有テ、変実トステ、  
悪キ脈トハスルニ、摠テ病者ナル者々  
脈、痛ヨリ上へ取上ラサル者ハ、無キニ  
世間ノ長病、又病者ナル者ハ、皆脈ノ悪  
キニ依テ、然ルニヨリ、脈ニ心ヲ付テ、  
脈ノヨク居リナオルヤリニ、瘵治スル  
カヨキリ、長病持病ナトリ、脈ノ居ナオ  
ラサル中ハ、煩ヒ本<sup>復</sup>セ、又者リ、今時世  
間ニ、多キ、疝疾ナトリ、皆脈ノ滞リエハ  
ナリ、サテ瘵強キテモ、大事ナキ瘵ト云  
者ハ、中ニ、ほニ、手ニ、隨テ、浮ニ、沉ニ、アル

者ニ、左極ノ瘵ハ、左右トモニ強ク瘵テ  
モ、瘵治ナル者ニ、去レ、左ノ瘵ヨリ、右  
ノ瘵ハ、大事ト心得、ハ、摠テ、脈ノ瘵未  
夕、胃氣尽サル中ハ、其瘵ヲ強ク、按テ、  
テモ、サノミ痛マサル者リ、假ソメニモ、  
瘵ヲ、按メ、甚痛ハ、脾胃氣ノ弱キ故ニ、大  
喜ノ瘵ト思フ、ハ、且、又、一旦、食傷、脈痛  
手オモ、近テ、進キ、程、甚痛ラナス、ア、リ、  
是ハ、亦、格別ノ、了、食滯、瘀血ナト、滞テ、  
工、有ル、故ニ、痛ラ、内傷、長病ノ、了、今、  
論スル、処ノ、痛ハ、内傷、長病ノ、了、今、

世間ノ人ニ、要所ノ瘡一種アリ、十人カ  
七八人ヲテモ、人々コレ有り、其ルニヨ  
ツテ、其瘡ハイカヤアルソト云ニ、左  
右ノ臍ノ暇ヨリ、左右アハラ下ヘ指シ  
瘡ハ、其瘡スル処ニ、動氣アリテ、其動氣  
胸中マテ響キ、必ス左ノ乳ノ下ニテ、動  
氣アル者リ、或中股真中ニ瘡ル人モア  
リ、或股ノツク根ヨリ、サコ張ル者アリ  
其瘡アル人ハ、胸ノ廻リ筋ハリ、或ハ陰  
囊ヘ引キ、寧或ハ拳ノ如キ物、時カニ墜  
テ浮況ス、是ヲ云サレ、此、病氣ノ瘡、此イ

夕ニテモ、驗氣コレナキ故ニ、兎角病氣  
ト云者ハ、スキトナオラサル者ト云テ  
病人モ、医者モ、持病ト云テサレオク、  
皆其瘡ノ人ハ、病氣ノ瘡ト云者ハ、亦瘡  
別ノ下ニ、病氣ハ、厥陰肝經ノ煩ヒナル  
故ニ、臍下筋ハリ、或ハ陰氣畢、凡ニ拘攣  
專ラ筋ヲ引レ、心持アリ、或ハ惡寒、  
寒熱時有テサレ、出ル脈ハ、弦緊ニメ、作  
ル中ハ、甚妙、甚ク中ハ、常ノ如クナル者  
ソ、然ルニ、脈ニ瘡ナレ、是アレハ、何ノ道  
理モ、令タスメ、病氣寸白ト、コレ云テ、理

ニモ非ル療治ヲ致シ或は草杯ヲ無作  
ト用テ治ニハ脾胃損シ元氣衰ハ病者  
トナリ終ニハ死症トモナルナリ今時  
ノ療治其病ノアコウイ合點致サ、レ  
ハ、療治モトヨリ難シ何煩ニテモ件ノ  
瘡ハサシツトフ者リカヤウノ処ニ終  
工夫ヲ用ヘシサテ動氣ト云者ハ人間  
天生ノ動氣止時其身モ滅スルニ其動  
氣ノ然ル所以如何ト云ハ天地人間  
ノ道理一致メ陰陽五行ニ外ナラスト  
ハ陰陽ノ精妙合メ凝リカマリテ初

ウナク男女未分先ニ先ツ腎ヲ生ス假  
令草木ノハエ出ル中一葉ニメ中間ノ  
根蒂根原ノ氣ヲ含テ生々不息機ヲナ  
スカ如シ即命メ動氣ト云其原氣ハ即  
陰陽ノ根蒂太極ノ本存ニ是ヲ動氣ト  
云名ル者ハ動中ハ物生ス即陽ノ動ニ  
是太極ノ用ノ行ハル所以ニ在右ノ  
而腎ハ静ナル者ニ静ナル中ハ物化ス  
陰ノ静ナルハ太極体立所以ニ如女  
動静ヒマナク陽ハ寢ニ陰ハ合メ木火  
土金水ヲ生ス女ヲ即子命ト云云ハ

ルニ故其動氣ハ人ノ根也原氣ノ本也  
心即子腎同ノ動氣也其動氣ヲ考テ死  
生吉凶ヲ知ル丁ニ腎同ノ動氣トハ何  
シカ指メ云ルヤハ難云死生原者謂十  
ニ經之根本ニ謂腎同之動氣也五藏六  
府之本十二經脈之根本ト云リ右ノ  
如ク扁鵲カ腎同ノ動氣ト云ヘリ膈下  
一寸五分ノ氣海ノ穴也人々考ヘ見ル  
ニ動氣アリ人モアリ無キ人モアリ一  
邊ニ難シ也其動氣アル中ハ不死ナキ中  
ハ死スト云リ扁鵲カ腎同ノ動氣ト云

ハル丁何ソ無キト云ニヤ是工夫  
ルヘキ処ニ黄帝經云西部之水腎水對  
生門ト云リ生門ハ膈ニ是即子扁鵲カ  
云ハル腎同ノ動氣也能ク叶ヘル語ニ  
其動氣ノ下第一ノ秘傳ナル同々ト  
比レテ第又リト虽モ其人ニ非ニ公是ヲ  
許サス故今其ニ述ズ脈ヲ胃氣ト云丁  
モ其動氣ト一理ニ扱右ノ天生ノ動氣  
ノ外ニ亦一種ノ動氣アリ即チ病氣邪  
氣ノ動氣也其動氣ハ或ハ右ニアリ左  
ニアリ上ニアリ下ニアリ其痞邪氣ノ

アル処ニヨリテ人々不同アル者ニ人  
毎々陰気衰ル寸ハ陽氣亡リテ動氣鳩  
尾ノ下マテ指コ上ル者リ故ニ陰虛火  
動ノ疾ニ動氣ノ不元ハ一人モナク然  
ルニ因テ其動氣下ヘラサマルヤウニ  
致スヘシ火動ハ動氣治リ難キヲ以テ  
冷ニ難コトスルニ或脾胃虛ノ症モ中  
氣弱キ故ニ運行足ズメ邪氣聚テ胸ノ  
マハリ膈ノ上ニテ動氣強キ者ニ其動  
氣ハ胃氣強クナリテ運行ノ氣滯ラサ  
ル件ハ自ラ動氣静ニナル者リ或ハ瘕

ナトナスクフルイ邪氣滯リ聚レハ瘕  
トナリテ動氣強クナル者リ名テ瘕母  
ト云或膽虛心虛ノ症モ動氣強ク胸膈  
マテ動氣ヒク者ニ其時怔忡驚悸  
眩暈等ノ症ナトサレ出ル者ニ右ニ云  
処ノ世回ニ身キ瘕ノ症ニ動氣強キ者  
ソ大方ハ左ノ方ニツイテ動氣アル者  
ニ或中脘真中ニアル者アリ其動氣ウ  
按メ見レハナル程カ強クオサユルホ  
ト動氣強ク御音リ者リ其症動氣アル人  
ハ無作ト死症ニナラヌ者リ故ニ今時

此病ノ症ニ多ク是アルサシ当テ大妻  
ナリ又一旦ノ傷食ナトモ胃中ニ邪氣  
アルナク動氣強キアリ吐ノ症ナ  
トモ動氣鳩尾ノ下マテサシ上ル  
リ安時ハ茶モ湯モ俱ニ不受メ吐リ者  
ニサヤウノ糸モナク強テ茶ヲ与レハ  
夕トハ相應ノ茶ニテモ動氣ニコバマ  
レテ受ヌ者ニ其時ハ針ヲ立レカ或ハ  
氏散ノ養ヲ用テ鳩尾ノ下ニ灸コナリ  
氏動氣ノクツロギアル片茶ヲ与テ効  
アル者リ久ク吐逆メ止リカ又ルハ皆

動氣ノサシ上ルユヘテリ

○一暖ニ陽虚陰虚ト云ル下アリ陽虚ノ

脈ハ大抵纏メ脈ニカ弱ク動氣モ齒ニ  
メ右一偏コトサラ脈ノ弱キヲ陽虚ト  
ス陰虚ノ脈ハ摠タイ脈ニ潤ヒナリ乾  
テ動氣ナルホト早クサクト虚勞ノ  
脈ノ如クコトサラ左一偏脈ノ乾クテ  
陰虚ノ脈トス

○一右ニ云左石ノ両腎ニ就テ古人ノ説

マナク先陽虚ト云ク腎中ノ真陽ノ  
虚ニ陰虚ト云ク腎中ノ真陰ノ虚ニ左

ヲ以テ左腎ノ水トシ右ヲ以テ命門ノ  
火ト云ルハ誤説ニ古人モ安道理ニ誤  
レル人多ク竊ニ古人ノ論ヲ併セ考ル  
ニ腎ニ両牧アリ西腎ニ水ニ屬ス只  
左一徧ハ陽ニ屬ス右一徧ハ陰ニ屬ス  
命門ハ即チ西腎ノ中央ニ内經ニ於テ  
左ヲ腎トシ右ヲ命門トスルヲ未タ之  
ヲ見ズ勞ニ所謂一陽二陰ノ中ニ陷ル  
ト云ヘル道理ニ安命門ヲ真君真主  
トメ一身ノ太極トシ元氣ノ安宅トス  
然ニ三十六難云其左ハ諸精神之所舍

原氣之所繫ニ男子以藏精女子以繫胞  
ト云ヘル安説一ヒ出テヨリニノカク  
後世ハ人其理ヲ不悟者甚以其理ニ迷  
フ左ヲ腎トシ右ヲ命門トス男子以藏  
精女子以繫胞トセハ何物ヲ右腎ノニ  
繫ニヤ左腎ハ又何物ヲ繫ケ何物ヲカ藏  
スヤ是難經ニ疑ナキニ非ズ越人リ匠  
道ノ聖人ニ何ソ道理ナキアリ云ニヤ  
是皆引テ不奈ト云者ニ去レハ書物ヲ讀  
トモ能古人心ヲ探リ取テ見ル者リ  
ウワリラニ昏ラ見テハ夕トハ萬意ラ

数ルト云何ノ益カアラニ或ハ誤リ  
命コタレトモ故ニ尽ク書ヲ信セ  
ハ書トキニカスト云リ信越人カ如  
安云ル味深キト云ニ命以テユト  
ハルヘコ右ニ云如ク腎ハ左右氏ニ腎  
ニメ左ハ陰ニ屬シ右ハ陽ニ屬ス命門  
男精ヲ胸ニ安ニ存ル男女ノ合交ニ其  
命門ニヨツテ胚胎ヲナス故ニ命以テ  
子宮氏云然ル同子宮ハ男女ノ通称ニ  
夫人母ノ胎内ニ在ル母ノ呼吸ニ隨  
テ氣ヲ受ルナリ既ニ生ルニ及ニテ

一 點ノ元氣胸下ニ聚テ自ラ呼吸ヲナ  
ス名テ氣海ト云丹田氣海皆一ノ子宮  
ニメ命門ノ舍ナリ内經ニ主不明則チ  
ニ官危コト云ル主ノ一字ヲ命門ノ丁  
ニ若コ心ノ藏シ以テ主トセハ何リ十  
一官危クト不言メ十二官危コト云ニ  
ヤ十二官ノ外ハ一等君主ト云ル者有  
テ神明不測ノ妙用ヲナス是即チ天真  
ノ元氣ニメ命門ノ丁ニ腎同ノ動氣ノ  
丁大抵ハ胸ト同コト心得ハコ胸ニ濡  
ヒアル如ク其動氣ニ濡アリテ穩ナル

中ノ重キ病人ニテモ胃守元氣絶ナル故  
ニ死セサル者心動氣マリツツリ如ク  
纏目アリ受元氣尽テ邪氣ノ主人ト  
ナル動氣ユマ死生疾心又腎同ニ何ト  
メモ動氣ノ不者アリ是亦元氣絶タ  
ル者ニメ疾心且又説雷ノ如ト下  
ニ元氣尽ヌハ其動氣衝上メ喘促ノ  
下ニイナヒカリナトノ如クヒカト  
費ルアリ是又死症ニメ三日ノ外ハ  
受サル者ツ揔メ脈ヲ診メ早キ遲キヨ  
キソ、アヒキリト人ノ手ヲ取テ疾生者

西ヲ考ル其根本何ヨリ来リ来ルツ  
ト其根エヲ穿鑿スレハ彼情同ノ動氣  
ニ因テ胸ハウツ者心故ニ疾ノ動氣ト  
云者ハ胸ノ根原ニ人々常々胸ヲ取テ  
其理ヲ考ルト云ヘ其然ル所以ノ理  
ヲ知者鮮シ故ニタニカナル丁ナク推  
量ツモリノミ胸ヲ取ニヨリハ直ニ  
取ニテ考ヘキニ或病人胸ハヨキヤリ  
ニ疾スル者教マアリ如何ト云ヘリ  
是疾ノ元氣尽タレハ心去ニヨツテ  
如何ト胸惡ク心腹ノ動氣ヨモウチ

ハ死セ又者リ加様ノ処療治ノ上ニテ  
ハ第一ノ事ナリ畢竟腎同ノ動氣ハ脈  
ノ心ニテ考ルト云ニテ大ヤウ合點ス  
ヘシ故動氣ヲ元トメ摠メ脈ノ動氣ヲ  
考ルニ摠メ外感ノ煩ヒ返ラ夕ノ之難  
キ者ナリ傷寒ナトハ急病ノ邪氣ナル  
故ニイカホト返ヨクテモ死スル者  
去テカウ傷寒モ腹ヨクテ元氣強キ者  
ハ假令担病重クテモサメ易シ其人固  
ヨリ元氣強陰分衰ヘ虚火ノ元ル者ハ  
虚火トモコアビテ担氣サメ難ク疾疢

ニナリ易キ者リ現病ナトモ左扱ノ処  
ニ心ヲ附ヘシ摠メ内傷ノ煩ヒ腹ヲ  
ホ一トメ考ヘシ病疢重クテモ脈ノヨ  
キ内ハ死セ又者リ左扱ノ処ヲ考ヘテ  
療治ヲ夕シカニスヘシ大抵ノ医者ハ  
胸モ不変脈ノ道理不弁メ見ケタル病  
疢一徧ニ拘リテ療治ヲ致スウラツ  
モリノ心ニ疾生ノ令モ不変素人ノ  
目ニ叶ハスト見ルハハハハハハハハハ  
ト云タグヒ也其等ノ人何ソ醫師ト云  
ンヤハソ日本ノ医者紛テ疎キ者ハ

胸之今ノ世ニ脈ヲ能ク診スルト思フ  
医師未タコレヲ見ス、此何トテモ、費束  
ナシ故ニ脈ノ教一術ヲ立テ、死生虛  
實ヲ考ル由トスル者ナリ、

○一任脈ノ丁、腰第一ノ持接ニ回ラ以テ  
口傳タル可キ因テ、其ヲ不説ナリ、

○一腹ニ乾シト云フアリ、人ノ顔色ノ乾  
クカ如ク、腹ノ水盡ノ潤ヒナキ寸々、燒  
出ライロウカ如ク、内外共ニ乾ク者、  
臍ヲ患ル病人ノ、腹ノ乾カ如ク、在株ノ  
処ニ心ヲ附リヘキナリ、

○一腹ニ離ル、ト云フアリ、腹ニ元氣ア  
ル中ハ、内ニ主人アル故ニ、檢メ脈ニツ  
リアビテモ、チアル者ソ、既ニ元氣尽ク  
ナハ、主人無ユヘニ、獲ノツリ合メ、ア  
モ無クナリテ、弓ノ弦ヲ弛ヤルガ如ク、  
中腕上肢俱ニ水ノ中ヘキヲ入ル、カ  
如ク、殊去而ノ衝脈ノ大綱キレシル如  
ク、張り合ナクナル者リ、是ラ腹ノ離ル  
ト云リ、其時ハ、死三日ノ中ナリ、小兒  
殊者、母キ者ナリ、殊者、母キ者、慢驚  
風ナトハ、大方腹離ルノ者リ、脈ノ離レ

又中い慢驚モ療治ニ拘ル者ニ小兒ト  
云者ハ第一痞ノ穿鑿所要ニハ兒痞ナ  
ク大煩フ下ハ希ナル者ハ驚風ノ症リ  
皆痞ヨリ起ルナリ。痲氣カタカイ杯  
ハ勿論痞ヨリ起ルナリ。去ニ因テ小兒  
ノ瘵治痞ノ品リ心得ルハ素ヨリ  
安キモノリ。  
○一版ノ痞ヲキニテ考ニ水ニ浮シタル  
者ヲ手ニテイラウガ如ク腹ノ痞ノ中  
ニ浮シタル様ニテ手ニ隨テ動ク痞ア  
リ。是内ノヒカハ無キ痞ニシテ終ニ死

症ノ版ナリ。  
○一臍下左右モ股ノ付キワヨリ痞ヘカ  
クマリ有テ時有テ按コ上リ浮キ沉エ  
アリカリマリ世ニ是ヲ專ウ疝氣疝  
積ト云ハ痞即チ各脈ト云者ニハ世話  
ニ云フ。腎積ノ下ニ世間ニ女痞アル人  
多シ。是皆精ヲ忍ビ腎氣ヲ動スニ依テ  
自然ト滞リタル者ニ腎積即チ是ニ  
○一年久キ積ナトシ、某ニテ下ニ破ル様  
ニ致スヘカラス。必大事ナル者リ。内經  
ニ無動是ト云テ積ヲ動シ積ヲニトス

レハ中気ノ元氣損シハテ、終ニハ死  
ト死病トナル者リ積ラハ按ニ脊テ動セ  
サルヤウニスル者リ胃氣サヘ強ク十  
レハ積ハ自然トハカクヘヤラン。匿ニ  
テ見ヘヌヤウニナル者リアラタツレ  
ハ必大衰トナル者ナリ。当令ノ食滯積  
血杯ノ痞ハ是ハ疎シツロケテモ不  
苦ニ極メ版ノ痞ト云者ハ中気ノ虚ニ  
因テ起リ来ル故ニ其根本胃氣ノ弱キ  
ト云。処ニ服ヲ付ヘニ是痞瘰ノ本意  
ニ又婦人血塊ノ一揮アリ。男子ノ久積


杯ト心持差シ血塊ハ積ラコナス。某ニ  
テスカコクツロケモテ不苦トナリ。血  
令ノ積ナル故ニ胃氣ニサワラヌ道理  
抑リ然ニ其人ノ虚実ヲ能ク考フヘシ  
○一腫氣ノ病人版ノ考ヘ專ラニ脾胃虚  
ヨリ起ル腫氣ハ版ノ病脾胃虚ノスナメ  
ク見ス者ニ湿氣ヨリ来ル腫氣ハ胃氣  
元氣サノ損セサレハ湿氣ニ因テ腫  
氣サシ出ルアリ。或ハ中気元氣実ス  
ル人疼深クメ水道ヲ塞キ或ハ疼癢メ  
痞上下ノ弁降ヲ妨ル故ニ腫氣ハ同ニ

腫氣ナレハ其お処員々ニ販ニテ令子  
考ヘシ其ニ因テ瘡白ノ趣夫々ニ隨フ  
ヘコ右ニ論スル有増ニテ諸病ノ腹ヲ  
考ヘテ腹ノ了ハ以心傳心ノ道理ナレ  
間常々心ヲ留テ工夫用ヘシ然レハ  
白ラ會得メ無量ノ品々是アルナリ人  
ハ腹中一ノ考テハ故ニ療治ノ西節目  
初中食腹ニ眼ヲ付テ夜ノ然ク居テ才  
ルヤウニト致スヘシ假令一旦ノ病氣  
退テモ其人販賣クテハ程ナク大病再  
發メ大支ノ症トナル者リ無病ノ人ニ

テモ腰ヲ考ヘ見レハ病ノ起ル処又ハ  
其人ノ長命短命モ自ラ知ル道理ニ  
販ヲ然ク考ヘ劣費ヘテハ病病ニ見ワ  
ルハ処脈ニ出ル処脈ニ備ル処三ツノ  
者ヲ合ヤ考ルニ因テタシカナル者ニ  
病病ト云者ハ心ノ煩ニテモ類症ノこ  
多ク脈ト云者ハ神明不測ニメ今日ノ  
医師取ル明ル者鮮ニ販ハ即チ藏府ノ  
滞リ痞ノ尸ル処虛實ノ差別死生ノ考  
直ニ知シルハ教也原ニ其佐依希  
ナリト虽余常々心ヲ尽シ且ツ師傳ノ




益田流脈診之図




巨里ノ動左ニアリ甚者左ノ乳逆  
モ及ニテ有モ動疼欠、虚ス早生  
其動アルモノ疼ツヨシ治方至左  
木甘湯又傷寒中風初發可心中  
悸ニ身潤動スルハ真武湯ノ症

ハ脈ノ左右及胸下ノ動上へ升リ故者必死ス水分ノ動高  
フルハ内傷ナリ


ニ死生ヲ決スル之動ハ其動高ク上へ升レハ死ス奪極  
気動也脈ヨリ上テ心ミツクナリ



ハ大陷胸ノ脈心下及肘上高クナル  
故以骨ノ逆四陷ナリ  
ハ小柴胡若滿章門之逆ナリ  
ト大柴胡急痛ニ付  
ナ妊婦ハ按テモ痛マ又ハ痛燥席ニ  
又結胸曉ノ候ニ桃仁承  
気ノ証ナリ



ヨ 小陷胸湯モ心下痞ニ故ク按セハ痛  
ム又三停ノ如兩胸ナシ  
夕半夏写心生善甘草海心ノ心  
下痞硬服乎雷鳴  
脚身ハ其大印立ツ




心建中湯打亭  
 舌益象二本持二本竹ト云  
 口蛇舌面色青白唇紅目下腫赤  
 シ悪心或清水ヲ吐ナリ  
 カ燥屎ノ塊ニ按ニ痛ハ三承氣ナリ  
 脈中石ニ研タリ



アル人ハ瘧スルナリ  
 ナ  
 斯ニ疑有人ハ平生足痛ク之又振気  
 胎下ニナリ関元ト云其穴ニ動氣アル


人ハ耳鳴人又関元ノシマリヨキ人ハ房室ノ慎ノヨキ人  
 ナリ  
 ラ  
 斯ニ塊有人大便道ニカレ亦亦トス又痔漏脱肛ト云



ウ斯ニ筋ハリテツヨキハ洞水 井 斯ニ  
 筋急ノ嚙鳴スレハ疼アル症トス  
 ノ 斯ニ塊アル人ハ其病小便道ニカリ淋  
 疾或陰茎痛下疳便毒  
 才 氣海動  
 シ水分ノ動強キハ風邪入ル人トス又  
 水分ノ動段々ニ上ヘ弁リ本ノ処ニカケ  
 許有ハ微ニ死ニ近トス又本処カケ  
 有ハ動氣ニ海ヲ引ツ、キウツル

ハ承死トス氣海ハ胸トリ取マワシ氣死ナリ  
 ヤ股脈ッサノトシヨリナク瓜ノ白クナルハ其人中風ヲ病ヘキ  
 候ナリ但クサツキタル方ハ不仁スルナリ又チヨツト節  
 ハリ有ハ其筋骨引ツルナリ

齊川家為ハ塊者益田流氣塊食無秘不可往




益田流食塊  
 益田流氣塊  
 益田流痰塊  
 益田流水塊  
 益田流血塊

烏頭圭枝湯之脈



サ此節胸ヨリ陰尺或陰寸至マテ及ン  
 テ痛筋リントハルモノナリ  
 正純曰女則病之輕則桂枝附子湯亦効  
 或桂枝四逆頭又良

大陷胸湯之脈



リ心下及胸上高クナル故は骨ノ史  
 四陷スルモノナリ  
 心下ヨリ小腹迄硬滿メ病不  
 可逆

○一男子年三十余四月下旬江及ヨリ帰京ス從來ノ痲癩症  
 二何トナク寒熱往来ヲ加重ス日ヲサヘテ飲食不進惡心  
 三大便微下利小便常ノ如シ或ハ溢汗出咳嗽晝夜ノ夜多  
 四初自ラ小葉胡ヲ服ストイハレ切ナシ依テ予ニ治ヲ求  
 五予之ヲ診スルニ脈狀浮數ニ弱ク舌胎白色ニ中黄  
 六薄黄ニ心下痞硬胸膈苦滿臍上ノ動高クカチニ小抄滿  
 七元來草急ニ治増長ス予ニ云フ按ニ見ルニ奈班ノ微ナレ  
 八トカク微冷ノ味ナキニモアラズ元神微衰スルニ  
 九似タリ依テ七味大葉胡加麥門冬蘆薈中瓜呂實ヲ投シ五六  
 十日同候トカク人ヲ叱レ或ハ憂色アルカ如シ依テ前後ヲ  
 一觀シ葉胡養榮湯去地黄加麥門冬服スルヲ九日七八日  
 二ノ日々ニ快ク沐シ浴スルニアタルヲナク愈タリ然レモ

遊中

宮永齋之助藏書



尚フ後日ノ方医王去參ノ煙葉ヲ平常ニ服サシ  
○一男子来テ治ヲ求ル者アリ年四十許リ予脈脈ヲ診シ四  
知ヲ備テ考ルニ其症三月下可ノコヨリ何トナク盗汗  
出テ咳嗽アリ風邪ヲ得タル如ク得タルカ如ク時ニ飲食  
味ナシ小便不利大便下利依テ死至ク同ニ小石元瑞カ門  
下ニ藥ヲ受クト予其藥古ク因スルニ作クク不良專掃骨木  
花同不写矣根精委續ハ腐ハ致ハ槐ハ別ニ兼用アリ其刻小葉  
胡加ハ松子ハ橙皮ハ不ハ分毫モ却アラス予ナク精神ヲ失ニ  
疑ニ思フ深クニ極スルニ兼瘡ノ疑ナキニシモアラス先  
ツ紫胡善圭加善治紫蘇子ヲ投シ刻ニ十葉加荷荷根根杜  
松子ヲ兼服セシムルヲ十三日許リ少ク快得テ来夕  
却テ奈クス其コト古上白胎ニ旁黄ヲ帯ヒ心下痞硬脈痛

シ小便不利大便極ス食カク飲溲ニ微々トメ奈班ス依テ  
大紫胡加ハ牽角ハ投スルヲ三瓩大便下利スルヲ五行前症  
ヲ夕退クトイハニ精神爽ナラスメ尙虛スヨツテ紫胡養  
半湯ヲ服スルヲ十瓩許リ諸症快ク而便快通飲食モ常ニ  
復スレモカニ心ヲ勞スルヲ有テ常復ニ是ヨリ咳血スル  
ト時ニ遺精キアツテ血色甚悪ク眼中黄ニメ虛勞狀ヲ備  
ハ夕リ依テ臣王加腐ハ少妻門或幾奈乾地ハ吐味ハ子用ル  
ト數日進ニ全ク愈ユ尚後日ノ方味地黄ヲ与タリ  
一章子年十四三月二十四日初テ診察ス三日以前風邪ニ  
感ニ其後入湯ニ俄ニ大熱ヲ發シ血症瘕トナルルニ予其  
症ヲ考ルニ臍浮大數言黃胎兩邊白ク眼中紅筋ヲ顯シ飲  
渴ニ小便赤色大便セサルヲ六七日ヨツテ先ツ痰連ヲ投

○次日之先生：同テ心ヲ定テ、幸而化血湯兼、鼓干苗、續  
ハ消石花、花、致、咳、ノ、忌、リ、用、上、次、日、血、血、ハ、飲、湯、モ、ハ、リ、コ、ソ、  
レ、ヨ、リ、下、陰、ク、タ、ル、班、畫、ク、榮、起、シ、微、ク、精、神、々、タ、リ、  
七日、夕、血、血、ス、ル、フ、哥、分、頭、痛、頓、ニ、止、ム、八、日、同、症、九、日、同、  
証、十、日、朝、ヨ、リ、大、抵、シ、古、久、ク、焦、黃、胎、ニ、班、夕、減、ス、調、胃、承、  
氣、ニ、欺、ク、投、シ、テ、胎、減、シ、退、ク、コ、レ、ヨ、リ、メ、十、五、六、日、ノ、日、  
數、モ、湯、ク、進、テ、諸、症、快、守、ス、七、日、明、十、七、八、日、目、ヲ、テ、聖、胡、養、榮、  
加、去、門、鹿、角、ヲ、投、シ、調、理、セ、シ、ハ、調、理、ヨ、カ、ラ、ス、メ、十、九、二、十、  
日、目、面、ヒ、大、熱、ス、尚、ク、前、方、ヲ、用、ル、フ、二、十、七、日、目、ニ、至、テ、  
夕、大、熱、飲、湯、諸、ハ、ケ、シ、マ、夕、解、シ、テ、十、日、七、八、日、ニ、至、リ、更、  
亦、メ、飯、ス、ル、ニ、感、邪、メ、大、便、下、利、ス、ル、フ、十、二、三、行、裏、急、後、重、  
ス、依、テ、升、陽、散、火、去、參、朮、加、腐、ヲ、投、ス、ル、フ、五、六、日、夕、吐、氣、

アリ、衄、血、ス、ル、フ、微、々、當、リ、前、方、ヲ、連、進、シ、日、夜、フ、ハ、口、ヨ、ク、  
メ、溢、汗、ス、ル、フ、每、夜、其、後、區、王、加、去、門、ヲ、用、イ、ヨ、シ、吐、比、  
聖、胡、清、涼、加、腐、ヲ、用、テ、進、シ、全、ク、愈、ユ、  
一、膏、子、年、五、十、：、近、シ、成、シ、衝、疝、ク、患、フ、依、テ、大、連、中、加、花、苓、  
兼、一、奇、凡、ク、用、ユ、次、日、ヨ、ク、シ、ク、三、日、亦、夕、心、痛、徹、背、時、刻、  
痛、ス、ヨ、ツ、テ、前、方、ヲ、連、進、シ、五、日、ノ、後、應、鑄、凡、ク、投、シ、其、後、三、  
黃、耆、相、敷、ク、ム、服、セ、シ、メ、テ、愈、ユ、  
△一、膏、子、年、三、十、八、九、嘗、テ、病、ヲ、得、タ、リ、一、區、症、ナ、リ、ト、シ、瘰、ス、  
ル、フ、日、アリ、其、ノ、後、脈、方、ノ、刻、症、ヨ、ク、ナ、レ、疔、疔、ノ、患、ア、リ、ト、  
云、予、先、其、症、ヲ、較、ス、ル、ニ、脈、數、：、メ、舌、上、白、ク、頭、痛、シ、而、便、ハ、  
常、ノ、如、シ、割、シ、脈、部、疔、ノ、候、アリ、其、餘、ニ、微、可、アリ、依、テ、肝、門、  
ノ、逆、ヲ、考、ル、ニ、腸、痔、カ、ク、アリ、會、陰、ノ、中、丹、ク、女、ク、ハ、ナ、レ、解、

門：近メ腐セリ依テサクリヲ入テ痔漏カト考ルニ全ク  
肛門：通セス然レモヨク見テ破鍼メ膿汁ヲ出ホリ出  
コヨリ廣ケント云レ病數悲テ服セス依テ毒蛇ヲ貼レ遺  
メ腐田ヲトル葦方ハ托裏消毒者參リ用ニ其後風邪ノ氣  
コキアリ當飯四逆加煎及葛根ヲ用ニ其後骨節疼痛ニ惡  
寒コ頭痛且ツ飢渴等アリテ風毒狀ヲ示シ痛ケレ依テ麻  
杏薤甘加犀角ヲ用ニ寸効ナレ故ニ十越加犀角ヲ投レ別  
ニ大紫胡ヲ隔日ニ二貼貼服セシ疾痛減才ニ善ハ膿口  
膿汁ツキテ精肉ヲ生レ益快行ス膏ヲ疔突ニ膏ニ葉刺大  
解リタラ全ク愈ユ

△一婦人年二十六四日二十二日初テ診ス一兩日前ヨリ心  
邪ヲ得タリト云予之ヲ診スルニ其脈浮數舌上白胎厚乾

テ飢渴心煩心下痞硬胸膈ニ冷氣アリ小腹滿チ是微レク  
浮腫眼中微黃其肩背ヲ見ルニ是モ腫氣アルニ似タリ耳  
鳴リ手足ノ指甲スカレテ見レハ其色惡ク其食事及大便  
ヲ同ニ小便不利大便秘食無味ト云尚才其經行或ハ寢ハ  
カ否ヤヲ問ニ經水ハ毎同下旬有リ夜ハ其頃痲痺ト云フ  
強參考シ若シ骨節ノ痛ナキカト問ニ是モ一兩日時々ア  
リテ痛モ諸所シメグルト答フヲ認テ之ヲ尿水トシ其事  
ヲ精コクホシ小便ヲハカラシメ食量シ定メ菜ハ麻杏薤  
甘加犀角茯苓ヲ投スル丁三四日疼痛アイ益レ惡風浮腫  
亦減セス依テ十全越婢加犀茯苓薤等ヲ不制トシ葦チ葉  
凡或黃鐘ヲ斟酌ノ用ル丁女同三日頃ニ至リ小便快利シ  
初メ尿數晝夜七八合許今通スル丁一升ハ食ハカリト云

依テ卒割十越<sup>名</sup>ニ差ルニ座鐘毎日一更五分連進スル  
五日飲食如常大便日ニ三行小便日々快通ニ浮腫去リ痰  
痛尽ク上ハ熱気久モナシ喉緩ニノ諸症次第ニヨリ依  
テハ新ノ疾ヲ示シ史ツ三軍上虚下虚ニ懸ス其日モ次日  
モ次中ニ快行ニ因ノ十一日即以客来在テ少ク心勞セリ  
後俄ニ咳嗽ハケシク夕小便不利大便不快通急ニ予  
也ク之ヲ診スルニ熱候ナク舌モ常ニ脈部幸急ニ水気マ  
夕渴ル依之咳喘ヲ又奈スルニコレ急事ノ逆スルニア  
ストホス病数少ク予リ疑ヒ大逆カト雖も予可若ク大逆  
ナラハ何リ以日之ヲ生セスノ今日如斯ナルヤ亦熱候ナ  
シ一ツシ頭痛セス要風セス格別ノ逆上モナシコ、ヲ以  
テ割スルニ全ク醫家ノ戒禁ヲ用ズ飲食不悞調理不悞心

常不除服葦亦急ル況ニヤ水与未全吸メ其等ノ所ヨリ再  
奈スルニ尚リ疑アラハ且ク也且ク諸フヘシト病数具  
於テ大ニ理命メ是非私シク比ナリ死生共ニ控クセント  
云予ヤリヤク記シ臥言板実湯兼テサフラン用ニ其夜再  
ヒ急ニ招ク往テ診スルニ痰喘壅盛メ呼吸促迫脈沈數手  
足厥冷ニ呵言アリ心下ニ衝クフハケシ依テ強神散ヲ用  
イ整膏ヲ施シナリ臥言板実湯共母加竹參大蒸菜羹ヲ  
控ニ次日黎明亦往診シ微ク快ク諸症ユルハニテ同候ニ  
故ニ再三也且ク諸レフリス、レモ病数取テ控セス蓋  
予リ信ス予亦虎穴ノ曙敗コノ時ニアリト和田山照ノニ  
子ノコト思テ曰生死有命唯其病毒ヲ治スル余カ仕ニ臣  
ノ職ニトホニ午後ニ夕診ニ日暮ニ夕診ニ兼テ猪苓湯甘

甘善湯ノ方ヲ投シ況日夕早旦之ヲ診メ和明湯加  
石生等用紫雪サフラニ其同リ攻メ似呂叔實其同リ攻  
其大子ヲ擊タレハ厥冷本ニ復シ持喘大ニユルニ心下大  
經リ唯冰沈敷ニメ飲食不圖進小便快通メ大便秘スヨツ  
テ應鐘ヲ用次日大ニ快通シ況日夕子ノ時コトスコ  
レ候急位伯ス即テ紫雪ヲ用テ工ルニ夕リ依テ方制リ  
相考ヘ本方聖制人參養榮云參加竹參兼用石生加款冬  
蜀葵外ニ應鐘凡夕用日ニ快ク遂ニ平復セリ  
一男子年二十八嘗テ疾ヲ患一巨瘰メ遂ニ全ルニ行夕  
リ然ルニ其節ヨリ右股及肩背四方並注疼痛セリ今ハ唯  
股ノニ腫テ痛ムト云テ予之ヲ診スルニ脈數古上量白微有  
在テ瘰癧症具ル予日皇同毒流注ニ先臣以テ瘰トスル者

ハ蓋ニ其ニ固ル担ニト即テ烏頭湯ヲ用ハ兼テ紫丹莖制  
リ年ハ日夕其腫処ヲ診スルニ三寸マワリ程腫レ痛強ク  
膿汗中央ニアリ前方ヲ服スルニ十一日不消散依テ托裏  
消毒欠ニ廣五參リ加ハ用而後ヨクハ膿管ヲサクリ鍼ス  
ルニ膿血一碗ハカリ出流ス膏ハ疔突紅尖鋒ヲ用兼テ強  
神散リ与フコトヨリ數リ経ル中ニ如ク破傷風ス依テ当  
帰四逆加荊芥廣南リ用服スルニ四日メ快氣口リ且  
後臣玉加幾奈廣參リ東進ニテ又數日ヲ経タリトカク膿  
汁モ夕マリテハ發熱ニ病者羸弱ニ依テトクトホシ遂ニ  
ヒスリ以テ腫塊ヲ切折シマテハサシナトニテ腐肉ヲ切  
去リサクリリ以テ遺管ヲ吟味ニテ疔突紐ヲ入レ士ノ十  
有五日ヨリ予カ茲ニ隔日來リ瘰口生肉全ク愈タリ

醫問 梅

一婦人泣う請ふ者アリ之ヲ診スルニ心下硬痛小坂ヨリ  
上衝ニ手豆微冷脈沈數舌上白胎ニメ黄ニ黄色アリ指甲  
モ甲サクニ眼色サウヤカナラヌ小便不利大便二十數行  
裏急後重ニ飲瀉アリ食ヲ惡ム其因ヲ問ニ主人カ言ニ  
曰ク去年八月小産ニタリ五日前用有リテ他處エ行キ帰  
路ヨリ忽然トノ件ノ諸症ヲ奉ニ夕リト余先ツ昔飯苧  
散加炒參ヲ投ニ兼テ寧強神取リ服サシハ翌日ニ至リテ  
小便益閉ニ一瀉オモ下サス依テ葱白ヲ以テ温蒸ニ猪苓  
湯加石膏ヲ兼用ス曰午後之ヲ診スルニ舌上焦黄ニメ  
將黒尚熱秘メ居ルニムラトメ白點アツテ散乱ス以カ  
是レ蛇毒ナラト大紫胡加海人ヤ一紙ヲ用果又其メニ

一蛇ヲ研出下ス其翌早朝朝病家主人來リ其容辨ク聞ク  
轉胞メ小便一瀉リ下サス食ヲ欲メ甘カラヌ大便ハ前ニ  
同ニト云予熟々之ヲ考ルニ脈ハ舌証ニ不合ニ脈候ヲ以  
テ予是ノ發班ニアツレハ是モ亦不順ナリ非疫非瘧其右  
シ云ハ調胃承氣ノ症ニ其人必スヤ墜胎ニメ其ノ變アル  
ニ決セリト思ハ母ヲ彼主人ニ問ハ決メ其事ナント云  
予曰豈其事ナカラシヤ脈ヲ切シ証ヲ觀テ之ヲ考ルニ必  
定音カ曰所ニ決セリ汝必スイツワルヲ勿レ彼主人大ニ  
取入頼然タリ捕アツテ即テ曰フ予罪々々假令毒死スル  
モ悔ナシ願クハ生テ同テマカスト予曰フ然ラハ我  
云所トアタルヤ否ヤ主人遂ニ白狀メ曰松原ノ悪婦ノ手  
術ヲカタルコトニ於テ其病婦ヲ川村完吾ナル者ニ一診

口シムルニ号モ予可堪ニテ曰ク破水後ヨリ未詰メ寒冷  
ニ感シ或ハ血不順ヨリ生ストニ轉胞術ヲ今暫クマツ  
テ桂枝茯苓丸加猪苓茯苓浮然ルヘシ其後術ヲ施スヘシト  
云帰ルヨツテ予更方ヲ専服サシム然ルニ小便ニ三滿ヨ  
リ徐トシテ快通ニ其次日亦タ然ラ下ス丁三度大便下ナ  
クニユルコリ古黒胎トナレハ担候モナシ飲食次第ニ本  
後ニ後回物持苓令方ヲ投シ漸ク愈ルコリ得タリ  
一老婦病アリ四月ニ十日ハ初テ之ヲ診ス後来其人  
勞瘵症ニメ未夕服薬セズ唯夕夜事ニ常スルコリ常ニ夕  
又然ルニ近年ハ好トコロノ酒ヲ徐々ニ忌ム所味ヲ生  
其餘ニ当ニ月上旬ヨリ黎明ニ下利ス而此頃背ノ七椎ハ  
椎ノ七ノワキ石トナクキリト痛ニ腫物ヲ生ス其初ケ

山ノ如ク之ヲ指シシルニ痛マスト云予之ヲ診スルニ皮  
肉ニ余程ヤセ食モ好テ水浮ノ寸ハ快コト云心下痞連里  
ノ動急ク脈滿ノ所味アリ予是微腫古上黄胎ヲ中央ニ生  
己眼中微黄ニ脈ハ微數ニメ有力其肩ヲ觀レハ色モナク  
之ヲ批セ氏痛マズ号ニ於テ先匠ノ処方ヲ見ルニ香砂云  
君或ハ味亦与方去將ナトニ予先ツ理中加茯苓ヲ用從ノ  
煥物ニ楚歌數ク火ニ連進スルコリ三日ノ又之ヲ見レハ  
如ナル哉ニ十日許ノ煥過半トケテ尾底ノ上ニ煥ヲ得  
作ス後又手脈或ニ膝ヌハ彈骨指頭ニ各散ス依テ尚ヲ整  
歌數ヲ諸痛ニ甄コリノワキ緩痛ナル所ニハキワ夕夕附  
ス而ノ肩背ニセマシト蔓ニ本方當情巧蒸槩木去根  
加于參ヲ用善テ麻杏薤白加梓大蒲ノ鹿角ヲ投メ益以レ

ハ水浮ノ數ヲ減シ且ツ疼痛日ヲサシテユルマリタリ然  
レト唯其七八推ノ処ハ高ク自若タリ依テ鼻頭ヨク鼻  
代附子四兩公庭角リ投シケレハ諸痛又ニ減セリ大便下  
利ハ日毎五之行ハカリ食物不化メ通ス予痔瘻門ノ卷男  
湯ヲ連進メ數リテ終ル然ルニ其親戚四臣ニ次リ請フニ  
トノフニテ先一臣ヲ請フ臣診メ曰風毒腫ニ又下痢トス  
又一臣ヲ請フ臣診曰流注ニ非ス唯痰血ヨリ生スト云フ其  
比又一臣ヲ請フ臣診曰肺痿瘵瘵ニト云フ之ヲ診セサル  
十余日後再ヒ之ヲ診スルニ意弱益甚瘵ニ膿ヲ混メ臭  
アリ大便秘ト便少ク食モ進マズ渴モナク脉數ニ人振ニ  
カサシクハ黄眼ノメ其餘咳嗽ナトモ屢おテ強ニト死証  
ニ迫キテ四日病歿肺痿瘵瘵ト曰ク臣ニ葉ヲ請テ服セ

タリ其葉ヲ見レハ香潤極米吉飯持極人參甘中紫胡茯苓  
第扱アトナリ其後ハ瓜石セシカ今ニ考儀ヲ得ナルニ  
一女子病アリ田月朔日初テ之ヲ診ス其症昨九月以前ニ  
冒指風ニテ右ノ掌背痲痛ス一臣之ヲ又キテ順更快氣ス  
其後右掌背ニ付疼痛メ耳下ヨリ人迎迄モ浮腫ニ眼ヲ閉  
サス程ニ然ルニ其痛者服葉セスメ五月許リモ送リケ  
ル其後亦ニ流シ請フ予診スルニ右ノ掌背痲痛有テ勤キ  
書ハカクノニ稟葉ヲ動シ見ルニ二本ハ先形ヲ成シ一本  
ハクタクノメ指ニテ取レリ依テ二本ヲ破鍼メ毛引ニヒ  
キカケテカラメテ切リトル食テ三本ヲ又キ給々之ヲ見  
ルニ上鬚ニハニサイナシ然レモ白色ヲ現シ右葉ノ裏ハ  
靨ヲヨボト下辺ニクサリコニ其惡臭甚ニ予カマラテ

母ライドに破リテ出血ス腐肉ヲ去リ取リ金環ヒツ用テ  
 吹キコミソノ外狀耳下而所ト頤ノ同府骨疽トナレルカ  
 如シ之ヲ考ルニ喙口中ニ通メ蠶蠶ニ微メ痛ヨツテ尤突  
 紐リサシテ上ニ中黄ヲ施ス或ハ先鋒ヲ施シ彼兒ハギノ  
 頃ヨリ紫ノクワイ雲ニト云且ツ坎術ヲ恐テ其ヌ母ノ  
 抱セス其翌日ヨリ紐ラニ治療ヲナシ其ハ三黄加石膏膏  
 膏ヲ投シ後ハ加味清胃加鹿角細辛ヲ与テ其後漸ク衰弱  
 ニ食無味溼汗出脈弱依テ王生脈ヲ卒創トス其後耳下  
 ノ結毒ヲ皆破切メナラ切ラントスレハ病象恐テ不批依  
 テ然ルニ結喉ノ過ニ流注メ色赤シテ其腐セニコト恐テ  
 楚歌タラシキ右肩井ノ所ニ灸瘡メ呼膿多ク施メ時々瀉  
 注ノ旨味望シ然メ瘡ノ瘡身モ大ニ減シ飲食常ニ停シテ

之旨本ニ術ニ口中ノ腐リモ過半去レリ尚ラ本創ハ四物  
 加石菖蒲ヲ投シ愈軟ク兼シ且ツ膏瘡ノ形ヲナス依テ先  
 ツ仙人ノ方此ニテ見合セ長ケルニ追ニ膠汁ノサハケテ

是ニ合創ナリ

99  
5198


*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

正誤

一枚ノ裏六行中 隨ノ次(外)ハ升  
 五枚ノ裏八行中 坐ノ次(剛)ハ剝  
 五枚ノ裏十三行中 膝ノ次(他)ハ對  
 十枚ノ裏八行中 文ノ次(耳)ハ目  
 十二枚ノ裏初行中 無ノ次(間)ハ聞  
 十四枚ノ裏三行中 來ノ次(住)ハ往  
 十五枚ノ裏四行中 恨ノ次(元)ハ亢  
 全 裏十三行中 菊ノ次(川)ハ水  
 十七枚ノ裏八行中 比ノ次(は)ハし  
 廿三枚ノ裏十一行中 隨ノ次(拋)ハ抛  
 廿五枚ノ裏八行中 幾ノ次(子)ハ乎  
 廿六枚ノ裏初行中 一ノ次(舉)ハ拳  
 卅九枚欄外孟子曰云々中其ノ次(撥)ハ撥  
 卅三枚ノ裏六行中 樂ノ次(友)ハ反ノ誤  
 又一枚ノ裏十行中 全ノ次(醒)ハ醒  
 卅九枚ノ裏九行中 濱ノ次(子)ハ干  
 卅枚ノ裏七行中 水ノ下(祭)ハ之祭

二枚ノ裏八行中 一ノ次(匹)ハ區  
 全上 十二行中 坐ノ次(疎)ハ看  
 七枚ノ裏二行中 喚ノ次(醒)ハ醒  
 十一枚ノ裏二行中 關ノ次(追)ハ追  
 十三枚ノ裏七行中 微ノ次(益)ハ益  
 十五枚ノ裏二行中 虛ノ次(苦)ハ苦  
 全上 裏 衣ノ次(靈)ハ零  
 全上 裏 已ノ次(靈)ハ零  
 卅二枚ノ裏初行中 毛ノ次(之)ハ而  
 全上 裏十一行中而ノ次(之)ハ觀之  
 全上 裏十二行中 其ノ次(之)ハ詩  
 卅七枚ノ裏五行中 初ノ字(又)ハ支  
 又(後)謂聖湯武ハ後聖謂湯武

十二枚ノ裏一行中 過ノ次(牛)ハ半  
 卅枚ノ裏一行中 不ノ次(來)ハ求



99  
5198

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be organized into several columns. A small red mark is visible in the middle of the text block.

