

附子 乾薑 芍藥 黃芩 甘草 每服四錢以水一中盞入葱白二莖煎至五分去滓不計時候熱服

大陷胸湯方

大黃 芒硝 枳實 芍藥 每服四錢以水一中盞煎至五分去滓

至正公去毒不信制熱盛服以水一中盞煎至五分去滓

赤芍藥並醋洗每服半兩以水一大盞入土薑半合煎

太平聖惠方卷第八

蕭蘆

太平聖惠方卷第九

凡二十門 病源九首 方共計一百三十一道

治傷寒一日諸方 二十四道

治傷寒二日諸方 一十四道

治傷寒三日諸方 一十一道

治傷寒四日諸方 二十一道

治傷寒五日諸方 一十六道

治傷寒六日諸方 一十四道

治傷寒七日諸方 五道

治傷寒八日諸方 五道

治傷寒九日已上諸方 七道

治傷寒發汗通用經效諸方 二十四道

治傷寒八日諸方

治傷寒十日諸方

治傷寒六日諸方

治傷寒五日諸方

治傷寒四日諸方

治傷寒三日諸方

治傷寒二日諸方

治傷寒一日諸方

太平聖惠方卷第九

共情一百三十一道

太平聖惠方卷第九

宋 王懷隱 王祐 鄭奇 陳昭遇 等奉 勅 編錄

日本 濃陽 春齡 菴馬元恭 訂梓

治傷寒一日候諸方

夫傷寒一日太陽受病太陽者膀胱之經也為三陽之首故先受病其脈絡於腰脊主於頭項故得病一日而頭項腰脊痛也

治傷寒一日太陽受病頭痛項強壯熱惡寒宜服桂枝湯方

桂枝 半兩 附子 半兩 炮裂 去皮臍

乾薑 半兩 炮裂

甘草半兩炙麻黃二兩去根節

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入葱白二莖

煎至六分去滓不計時候稍熱服如人行五里以稀葱

粥投之衣蓋取汗如未汗一依前法再服

治傷寒一日頭痛身體百節痠疼惡寒宜服麻黃散方更

麻黃一兩去根節桂心三分杏仁三分湯浸去皮尖

甘草半兩炙附子三分炮裂芍藥一分

赤芍藥三分白朮三分芍藥一分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服如人行五六

里再服厚覆取汗

治傷寒初患一日宜服解肌湯方

麻黃一兩去根節甘草一分炙赤芍藥半兩葛根一兩

石膏一兩桂心三分杏仁半兩湯浸去皮尖

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋以汗

出為效

治傷寒初得一日壯熱頭目四肢疼痛宜服細辛散方

細辛一兩赤芍藥一兩桂心三分乾薑半兩炮

附子半兩炮裂甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服良久喫葱粥投之衣蓋出汗

治傷寒一日脉弦而數頭項腰脊痛身熱煩滿不得睡臥宜服此方

麻黃根節一兩去 乾薑半兩炮 石膏一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入豉半合葱

白二莖煎至五分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋出汗

治傷寒一日壯熱頭痛惡寒宜服桔梗散方

桔梗一兩去 細辛半兩 川烏頭一兩炮裂去皮臍

麻黃半兩去根節 白朮半兩 防風半兩去蘆頭 桂心一兩

乾薑半兩炮裂剉 吳茱萸一分湯浸七通焙乾微炒

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢衣蓋出汗如未汗出即再服

治傷寒一日頭痛壯熱煩悶其脉洪數宜服人參散方

人參半兩去蘆頭 桂心三分 赤芍藥半兩 白朮半兩

乾薑半兩炮裂剉 麻黃三分去根節 甘草一分炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服併四五服汗出效

治傷寒一日頭痛壯熱心神煩悶宜服石膏飲子方

石膏二兩 搗碎

柴胡半兩 去苗

豉一合 微炒

麻黃一兩 去根節

葱白二莖 薄荷一分
右件藥細剉都以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候稍熱分為三服如人行三二里相續服盡厚蓋取汗

治傷寒一日邪毒氣在皮膚肌肉宜服解肌湯方

麻黃半兩 去根節

桑根白皮半兩 剉

赤芍藥一分

梔子人一分

前胡一分 去蘆頭

甘草一分 炙 微赤剉

杏人一分 湯浸 去皮尖雙

人麩炒 微黃

桂心一分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

煎至五分去滓不計時候稍熱頻服以厚衣蓋出汗

治傷寒初覺頭痛膈上痰壅宜服前胡散方

前胡一兩 去蘆頭

人參一兩 去蘆頭

細辛半兩

陳橘皮一兩 湯浸去白

顛

桂心一兩

赤茯苓一兩

附子二兩 炮裂 去皮臍

訶梨勒一兩 半用皮

甘草一分 炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒初覺一日頭項腰脊痛惡寒麻黃散方

麻黃半兩 去根節

乾薑半兩 炮裂剉

葱白三莖

豉一合

右件藥搗細剉以水二大盞煎至一盞三分去滓不計

時候稍熱分為三服衣蓋出汗

治傷寒初得一日壯熱頭項腰脚疼痛宜服此方

麻黃

一兩半 去根節

葛根

一兩 剉

柴胡

一兩 去苗

桂心

三分

石膏

一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入豉半合椒

二七粒葱白二莖薄荷二十葉煎至六分去滓不計時

候稍熱服藥後喫葱豉粥投之以衣蓋出汗

治傷寒初覺增寒壯熱頭痛口苦宜服此方

桂心

一兩

赤芍藥

一兩

甘草

三分 炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計時候稍熱服須臾喫葱豉

粥投之衣蓋取汗未汗即再服

治傷寒一日頭痛項強上連風府壯熱增寒體痛口苦宜服

知母散方

知母

一分

麻黃

半兩 去根節

乾薑

半兩 炮裂

葱白

四莖

豉

半合

右件藥細剉和勻分為二服以水一大盞煎至五分去

滓不計時候稍熱服之衣蓋取汗未汗即再服

治傷寒一日初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱脉洪大宜服葛

根湯方

葛根 一兩
葱白 五莖
生薑 一兩
黃芩 半兩
柴胡 半兩
去苗

右件藥都細剉以水三大盞煎至一盞五分去滓不計時候稍熱分為三服如人行五里再服衣蓋取汗

又方

麻黃 一兩
根節剉
附子 半兩
炮裂
去皮臍剉
生薑 半兩
切

右件藥都以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候稍熱分為三服如人行五里再服衣蓋出汗
治傷寒一日頭痛偏身壯熱時時惡寒宜服發汗神丹圓

方

人參 一兩
去蘆頭
川烏頭 一兩
炮裂
去皮臍
半夏 三分
湯洗
七遍去滑

赤伏苓 一兩
朱砂 半兩
細研
右件藥擣羅為末鍊蜜和擣百餘杵圓如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下十圓良久喫葱鼓粥投以衣覆取汗未汗即再服

治傷寒一日壯熱頭痛其背惡寒者宜服附子湯方

附子 一兩
炮裂
去皮臍
赤伏苓 半兩
赤芍藥 半兩

人參 半兩
去蘆頭
白朮 半兩
桂心 半兩
右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒一日壯熱頭痛先煎蒴藿湯淋背發汗方

蒴藿 五兩

槐枝 三兩

柳枝 四兩

桃枝 三兩

楮葉 四兩

豉 一升

葱白 十莖

右件藥細剉以水三斗煎取二斗去滓於無風處着冷

煖淋背訖便喫葱豉粥了以衣蓋取汗

治傷寒初得一日壯熱頭痛宜服葱豉湯方

葱白 三莖

麻黃 一兩去根節剉

豉 一合

生薑 半兩拍碎

右件藥以水二大盞煎至一大盞三分去滓不計時候

稍熱分為三服頓服衣覆出汗

治傷寒一日服葱豉湯不得汗宜服此方

葛根 兩

葱白 三莖

豉 一合

右件藥都以水二大盞入生薑半兩同煎至一盞三分

去滓不計時候稍熱分為三服頓服衣蓋取汗

治傷寒初得一日在皮膚頭痛項強四肢煩疼宜用青膏

方

當歸 三兩

芎藭 二兩

川椒 三兩去目及閉口者

吳茱萸 三兩

白芷 三兩

附子 三兩去皮臍生用

川烏頭 三兩去皮臍生用

莽草 二兩

右件藥細剉以醇酒浸之良久漉出以鍊成豬脂四斤

煎至藥色黃絞去滓不計時候以溫酒服如半棗大日
三服稍稍增之若頭項強即摩之

治傷寒一日勅色頭痛頭項強直賊風所中宜用黃膏

方

川大黃 半兩

附子

半兩去皮
臍生用

細辛

半兩

乾薑

半兩

川椒

半兩去目
及閉口者

桂心

半兩

巴豆

二十一粒
去皮心

右件藥細剉以醋浸一宿漉出以臘月猪脂一斤煎之
附子色黃即出漉去滓瓷合中盛之傷寒勅色發熱酒
服一圓如梧桐子大又以摩身數百徧兼治賊風及毒
風走注肌膚之間隨風所在摩之甚良

治傷寒一日勅色惡寒肢節疼痛並療惡瘡小兒頭瘡牛

頭馬鞍瘡癰腫摩之皆差宜用白膏方

天雄

三兩去皮
臍生用

川烏頭

三兩去皮
臍生用

莽草

三兩

躑躅花

二兩

右件藥以酒二升浸一宿漉出用煉了猪脂三升與藥

一處於銅器中文火煎令諸藥焦黃色即成膏去滓以

瓷器中盛有患者摩之百徧即藥力行如傷寒咽痛含

如棗核大日三嚥之差其膏不可近日

治傷寒二日候諸方

夫傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脉

絡於鼻入於目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在於皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈也治傷寒二日陽明受病陽明者主於肌肉其氣往來寒熱鼻乾不可眠臥面赤身熱有此病證宜服桂枝附子湯方

桂枝 一兩 附子 一兩炮裂去皮臍 甘草 半兩炙微赤剉 赤芍藥 半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱頻服汗出即愈治傷寒二日頭痛鼻乾面赤壯熱四肢煩疼宜服人參湯方

人參 三分去蘆頭 訶梨勒皮 三分 乾薑 三分炮裂剉 桂枝 三分

赤茯苓 一分 附子 三分炮裂去皮臍 甘草 一分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服頻服之汗出差

治傷寒二日頭痛發熱煩悶宜服麻黃湯方

麻黃 一兩去根節 桂心 三分 石膏 三分 黃芩 半兩

甘草 一分炙微赤剉 赤芍藥 半兩 杏仁 二十一枚湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱頻服汗出愈

治傷寒二日頭疼壯熱骨節煩疼宜服解肌湯方

乾薑 二兩炮裂剉 麻黃 一兩去根節 赤芍藥 三分 黃芩 三分 石膏 一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖豉半合煎至五分去滓不計時候稍熱服如人行三五里再服汗出差

治傷寒二日皮膚頑痛項強四肢煩疼宜服吳茱萸散方

吳茱萸 一兩湯浸七遍焙乾微炒 當歸 一兩剉微炒 芍藥 一兩

附子 一兩炮裂去皮臍 白芷 一兩 川烏頭 一兩炮裂去皮臍

麻黃 二兩去根節 川椒 一兩去目及閉口者微炒出汗

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至七分去滓不計時候稍熱分為二服頻服以衣覆取汗出差

治傷寒二日頭項強四肢煩疼宜服荆芥散方

荆芥 一兩 附子 一兩炮裂去皮臍 前胡 一兩

麻黃 一兩去根節 甘草 半兩炙微赤剉 白朮 二兩 人參 一兩去蘆頭

陳橘皮 一兩湯浸去白瓢焙

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服以衣覆出汗

治傷寒二日不解宜服發汗白薇散方

白薇 半兩 麻黃 一兩半去根節 貝母 三分煨令微黃 杏仁 三分湯浸去皮尖雙

人麩炒
微黃

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫酒服二錢衣蓋出汗愈

治傷寒二日頭項四肢煩熱疼痛宜服柴胡散方

柴胡 一兩 去苗
人參 一兩 去蘆頭
甘草 一兩 炙
麻黃 一兩 去根節

黃芩 一兩
赤芍藥 一兩
桂心 二兩
石膏 二兩

葛根 一兩 剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服以衣蓋取汗如人行五里未汗再服

治傷寒二日心中悸而煩者宜服建中湯方

桂心 二兩
甘草 一兩 炙
白芍藥 一兩
桔梗 一兩 去蘆頭

人參 一兩 去蘆頭
白朮 一兩
陳橘皮 一兩 湯浸去白瓢焙

厚朴 一兩 去麩皮金生薑汁炙令香熟

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒二日頭疼壯熱發表附子散方

附子 一兩 炮裂去皮臍
桂心 一兩
麻黃 一兩 去根節

白朮 一兩
吳茱萸 半兩 湯浸七遍焙乾微炒

右件藥擣羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服宜頻服令有汗出即差

治傷寒二日發汗立效方

附子半兩去皮膚 白附子一分 半夏半兩

右件藥並生搗細羅為散每服一錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服衣覆出汗

治傷寒二日痰逆頭疼四肢壯熱宜服半夏散方

半夏一兩水煮一伏時晒乾 澤瀉一兩 桂心一兩

乾薑一分炮裂判 甘草二分炙微赤判

右件藥搗細羅為散每服一錢以水一中盞入生薑半

分煎至六分不計時候和滓熱服

治傷寒二日頭痛壯熱宜服走馬散方

草烏頭半兩燒灰 桂心半兩 硫黃半兩細研

右件藥搗細羅為散每服一錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓稍熱頻服衣蓋出汗差

治傷寒二日頭痛腰背強硬增寒壯熱偏身疼痛宜服霹

靛散方

大黑附子一枚入急火內燒唯存心少多在臨出火時使用甕器合蓋不合立成烟焰

右搗細羅為散每服一錢不計時候以熱酒調下汗出立差

治傷寒三日候諸方

夫傷寒三日者足少陽受病少陽者膽之經也其脉循於脇上於頭耳故得病三日胸脇熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於臟可汗而解也

治傷寒三日不解頭痛肌肉熱管眼麻黃散方

麻黃 一兩去根節
甘草 半兩炙
葛根 一兩
厚朴 一兩去皮塗生姜汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋汗出差

治傷寒病三日腹痛小便不利而嘔者屬少陽病證宜服

赤伏苓散方

赤伏苓 一兩
赤芍藥 半兩
白朮 半兩
附子 半兩炮裂去皮臍

乾薑 半兩炮裂
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒已經三日不得汗頭痛發熱宜服石膏散方

石膏 二兩
桂心 一兩
麻黃 一兩去根節
杏仁 二十一枚湯浸去皮

尖雙人欬 炒微黃
黃芩 一兩
甘草 一兩炙
赤芍藥 一兩

白朮 一兩
芍藥 一兩
香附子 一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候分為二服
治傷寒三日咳嗽胸膈不利四肢煩疼壯熱頭痛宜服細辛散方

細辛 一兩
麻黃 一兩去根節
葛根 三分剉
荊芥 一兩

白朮 一兩
赤芍藥 一兩
紫苑 三分洗去苗土
桔梗 一兩去蘆頭

桂心 一兩
甘草 三分炙微赤剉
五味子 三分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒已經三日頭疼壯熱不解咳嗽痰逆宜服丁香散方

丁香 一兩
前胡 一兩
附子 一兩炮裂去皮臍
細辛 一兩
桂心 一兩

麻黃 一兩去根節
白朮 一兩
細辛 一兩
桂心 一兩

甘草 一兩炙微赤剉

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服之

治傷寒三日壯熱不解發汗香豉粥方

麻黃 二分去根節
葛根 一分
梔子人 一分
石膏 半兩

荊芥 半兩
生薑 一分
豆豉 一合
糯米 一合

右件藥細剉以水三大盞先煎麻黃等七味至一盞半去滓入米煮作稀粥不計時候服之衣蓋出汗差

治傷寒三日雖發汗後頭痛壯熱未得全解毒氣猶盛宜服石膏散方

石膏一兩 薺苳一兩 葛根一兩 黃芩三分

麻黃三分去根節 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒三日不得汗煩熱悶亂宜服麻黃散方

麻黃二兩去根節 葛根二兩 桂心一兩 鼓二合

赤芍藥一兩 石膏二兩搗碎

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計時候熱服使喫葱粥投之衣覆取汗如未汗出即再煎服之

治傷寒三日不得汗四肢不利宜服通關散方

附子一顆炮裂去皮臍 乾薑半兩炮裂剉 桂心一分

麻黃一分去根節

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入葱白二莖煎至五分去滓不計時候熱服

治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利宜服正湯丹方

太陰玄精二兩 消石二兩 硫黃二兩 礞砂一兩

右都細研入瓷瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸

焫之約近半日候藥青紫色住火得冷取出用臘月雪
水拌令勻濕入瓷罐中堂屋後北陰下陰乾又入地埋
二七日取出細研以麪糊和為圓如雞頭實大先用熱
水浴後以艾湯研下一圓以衣蓋汗出為度

治傷寒三日服藥之後不得汗宜用蒸法

右以薪火燒地良久掃去火微用水洒地取蚕沙桃葉
栝葉糠及麥麩等皆可用之鋪著地上令厚二寸布
席臥上蓋覆以汗出為度不得過熱當審細消息汗出
周身良久不止後以粉粉之勿令汗出過多

治傷寒四日候諸方

夫傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也為三陰之首是
故三日已後陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脉絡
於脾主於喉咽故得病四日腹滿而咽乾也其病在胸膈
故可吐而愈

治傷寒四日太陰初受病宜服恒山散吐之方

恒山 三分 甘草 三分 鼈甲 三分
生用 塗醋炙

石膏 三分 柴胡 三分 知母 三分
去苗

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入淡竹葉十
片煎至六分去滓不計時候溫服之當吐頑涎後却服
和氣治中湯主之

治太陰初受病服恒山散吐後宜服和氣治中湯方

人參半兩去蘆頭 藿香半兩 白朮三分 甘草一分炙微赤剉

乾薑一分炮裂剉 白伏苓一分 陳橘皮三分湯浸去白瓤焙

右件藥搗羅為細散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分即去生薑和滓不計時候溫服

治傷寒四日吐後或壯熱頭疼身體酸疼口苦心煩宜服

麻黃散方

麻黃三分去根節 葛根三分剉 柴胡一兩去苗 知母三分

赤芍藥一兩 梔子人三分 石膏一兩半 陳橘皮半兩湯浸去白

生乾地黄一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒四日頭痛背膊急疼心腹壅滯宜服柴胡散方

柴胡一兩半去苗 川大黃一兩剉微炒 恒山一兩半

茵陳一兩 知母一兩 赤芍藥 甘草一兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以淡漿水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服以微吐為度未吐再服

治傷寒四日嘔噦頻煩頭疼大渴此證是脾胃痰滯宜服

半夏湯方

半夏 三分湯洗七遍去滑

甘草 半兩炙微赤剉 人參 一兩去蘆頭

厚朴 二兩去麋皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

煎至五分去滓不計時候稍熱服藥水大盞煎至六

治傷寒四日脉浮大發熱惡寒身體疼痛無汗而煩者宜

服大青龍湯方

麻黃 二兩去根節 桂心 一兩 甘草 一兩炙微赤剉 石膏 二兩

杏仁 三十枚湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至五分去滓不計時候溫服水一中盞入生薑半分

治傷寒四日因下後大渴服冷藥過多喘息者陰盛故也

宜服小青龍湯方

桂心 一兩 白五味子 半兩 麻黃 一兩去根節 白芍藥 一兩

細辛 三分 乾薑 三分炮裂剉 甘草 一兩炙微赤剉 半夏 半兩湯洗七遍去滑

杏仁 二十枚湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒四日雖經發汗後心胸不利頭目多疼胃氣不和

少思粥食宜服前胡散方

前胡 半兩去蘆頭 半夏 一分湯洗七遍去滑 甘草 半兩炙微赤剉

桂心 半兩 人參 半兩去蘆頭 赤伏苓 半兩 白芷 一分

白朮 半兩 乾薑 一分炮裂 當歸 半兩剉微炒 葛根 半兩剉

柴胡 半兩去苗 陳橘皮 半兩湯浸去白瓤焙 木香 半兩

旋復花 半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒四日腹脇脹滿心胸不利四肢疼痛欬惡寒喘

急壯熱宜服白朮散方

白朮 三分 前胡 三分去蘆頭 葛根 三分剉 桑根白皮 三分剉

合川升麻 半兩 赤芍藥 一兩 石膏 一兩 荆芥 半兩

子芩 三分 右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去

豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒四日煩熱不解大小腸澀宜服朴消散方

川朴消 三分 犀角屑 三分 梔子人 半兩 赤芍藥 三分

黃芩 三分 陳橘皮 三分湯浸去白瓤焙 川大黃 三分剉碎微炒

柴胡 一兩去苗 右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入淡竹葉三

十片生薑半分煎至六分去滓不計時候溫頻服以利

為度

治傷寒四日頭重身強腰脊痛宜服葛根散方

葛根一兩

剉

甘草

一兩炙

桂心

一兩

大青

三分

黃芩

半兩

石膏

一兩

赤芍藥

三分

麻黃

二兩去根節

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒四日煩熱不解大小腸秘澀宜服犀角散方

犀角屑

三分

黃芩

一兩

柴胡

一兩

梔子人

半兩

地骨皮

三分

川大黃

一兩半

剉

川朴消

一兩

木通

二分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服微利為度

治傷寒四日頭痛肩膊急悶骨節煩疼心躁口乾宜服茵

陳散方

茵陳

一兩

柴胡

一兩

甘草

半兩炙

赤芍藥

二分

防風

二分去蘆頭

附子

一兩炮裂

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒四日未經吐宜服瀉心湯方

川大黃

二兩剉碎微炒

黃連

一兩

黃芩

一兩

附子

一兩炮裂去皮臍

聖惠方
右件藥搗麩羅爲散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒四日三陰受病其脉浮而滑腹滿口熱舌乾而渴大便不利宜服三黃散方

黃芩一兩 梔子人一兩 川大黃一兩半剉碎微炒

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片朴消末二錢煎至六分去滓食前溫服大便利卽藥止未利再服

治傷寒四日毒氣入胃喉中閉悶宜服吐痰散方

瓜蒂一分 丁香一分 赤小豆一分炒熱

右件藥搗細羅爲散每服以溫水調下二錢空腹服之當吐後便可喫葱豉粥補之

治傷寒汗出不歇已三四日胸中惡阻欲吐宜吐之方

豉二合 鹽半兩 蜜一分

右件藥以水一大盞煎至七分去滓空腹頓服之良久當吐如人行十里未吐再服

又方

苦參半兩剉 甘草一分生用剉 赤小豆三七粒炒熟

右件藥以水一大盞煮取半盞去滓空心都作一服服之當吐吐不差者更以苦參一兩生地黃二兩別以水

二大盞煎至一盞分再服甚者作葱豉粥投之以吐出毒為度

治傷寒四日寒熱不退頭痛百節煩疼此毒氣在胸中宜吐松蘿散方

松蘿半兩 川升麻一兩 甘草一兩 恒山半兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞煎取七分入藥末二錢更煎一兩沸去滓空腹溫服如未吐相去如

人行三四里再服以吐為度
治傷寒四日已嘔吐更宜吐方

苦參末二錢

右以溫酒五合調服之得吐即差

治傷寒四日心胸中滿悶取吐方

猪膽一枚
取汁

右以醋一小盞酒一小盞內猪膽汁相和溫過分為二服當吐之差

治五日傷寒候諸方

夫傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脉貫於腎絡於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腸故可下而愈也

治傷寒五日舌乾而渴煩熱不解大小腸皆澀宜服柴胡

湯方

柴胡一兩 去苗

犀角屑一兩

赤芍藥三分

黃芩一兩

梔子人十四枚

川大黃一兩 剉 碎 微炒

川朴消一兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七

片煎至六分去滓不計時候溫服如人行四五里再服

以利為度

治傷寒五日頭痛目眩大渴飲水口乾小便不利增寒壯

熱腿膝酸疼不可忍宜服猪苓散方

猪苓一兩 去 黑皮

赤伏苓一兩

白朮半兩

桂心半兩

澤瀉一兩

正合陽州之醫士唱送

右件藥擣細羅為散每服不計時候以新汲水調下

二錢日三四服若嘔吐不可下食者服之亦效

治傷寒五日口熱舌乾頭痛脚脛酸疼四肢壯熱宜服麥

門冬散方

麥門冬一兩 去心

子芩三分

葛根二兩 剉

前胡一兩 去 蘆頭

知母三分

玄參半兩

赤芍藥三分

犀角屑半兩

檳榔三分

甘草半兩 炙 微赤剉

川升麻半兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒五日熱在胸中不能言語者宜服麥奴圓方

麥奴 一兩

川大黃 一兩 碎微炒

川芒消 一兩

竈下黃土 一兩

黃芩 一兩

麻黃 一兩 去根節

梁上塵 一兩

金底墨 一兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵圓如彈子大每

服不計時候以新汲水研下一圓

治傷寒五日發熱惡寒肢節煩疼微嘔吐心下痞結外證

未解柴胡桂枝湯方

柴胡 二兩 去苗

桂枝 一兩

黃芩 一兩

人參 一兩 去蘆頭

甘草 一兩 炙

半夏 一兩 湯洗七遍去滑

赤芍藥 一兩

赤伏苓 一兩

厚朴 一兩

一兩 去麋皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒五日煩熱未退大小便澀宜服川大黃散方

川大黃 一兩 碎微炒

黃芩 一兩

赤芍藥 一兩

知母 一兩

川升麻 一兩

鼈甲 一兩 塗醋炙令黃去裙襴

赤伏苓 一兩

梔子人 半兩

柴胡 一兩 去苗

川朴消 二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服以大小便稍利為度

治傷寒五日不能言語熱在胸中宜服抵聖圓方

犀角屑 半兩

麻黃 半兩 去根節

川大黃 一兩 碎微炒

川朴消 一兩

黃芩 半兩

釜下黃土

半兩 梁上塵

半兩

竈突墨

半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵圓如彈子大每服不計時候以新汲水研服一圓如渴飲新汲水當有汗出良久未汗即更服一圓汗止熱退能語若小兒量力服之

治傷寒五日熱毒氣在藏令人心腹煩躁壅悶不得眠臥

宜服此方

川大黃

一兩到碎微炒

杏人

三分湯浸去皮尖雙人熬炒微黃

枳殼

三分熬炒微黃去瓢

犀角屑

三分甘草半兩炙微赤到

川朴消

一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服取利為度如不利再服

治傷寒五日心腹壅滯煩熱不退宜服前胡散方

前胡

一兩半去蘆頭 杏人 三分湯浸去皮尖

川大黃

一兩到碎微炒

黃芩

一兩

川朴消

一兩

檳榔

一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服取利為度如不利再服

治傷寒五日少陰受病口舌乾燥煩渴欲水心膈不利大

知
字
考

腸秘澀其脉滑者生小弱不足者死若氣逆不順宜以檳榔散下之方

檳榔 一兩 牽牛子 一兩微炒 川大黃 半兩碎微炒

青橘皮 半兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫茶調下二錢

快投字恐

良久喫薑粥投利三兩行自止如未利再服

少陰病服檳榔散下之後宜服和氣白朮散方

白朮 半兩 人參 半兩去蘆頭 枳殼 半兩微炒去瓢

白伏苓 半兩 厚朴 半兩去麋皮塗生薑汁炙令香熟 白芷 半兩

陳橘皮 半兩湯浸去白瓢 桂心 半兩 白芍藥 半兩

高良薑 半兩 甘草 半兩炙微赤剉

右件藥搗麋羅為散每服三錢以水一中盞入葱白一

莖煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒五日但身體熱面如桃花皮膚乾燥無潤澤口乾

渴此名陽氣攻胃大腸結澀宜服升麻散方

川升麻 一兩 黃連 一兩去鬚 川大黃 二兩剉碎微炒

地骨皮 一兩 黃芩 一兩 大青 一兩

右件藥搗麋羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半

分淡竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒五日頭疼口舌乾燥煩渴欲飲水宜服石膏散方

石膏 一兩
黃芩 半兩
甘草 一分炙
川大黃 半兩剉
葛根 半兩剉

右件藥搗篩為散都以水二大盞半入竹葉三七片煎至一盞二分去滓不計時候分溫三服

治傷寒五日吐利後身熱不去煩而腹滿臥起不安宜服此方

梔子人 一兩
厚朴 二兩去麁皮塗生薑汁炙令香熟
枳殼 二兩微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒五日頭痛壯熱四肢煩疼不能飲食嘔逆不定宜

服梔子散方

梔子人 三分
黃連 三分去鬚
黃蘗 一分剉
川大黃 二分剉

蘆根 一兩
葛根 一兩剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入豉半合葱白二莖煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒五日口熱舌乾頭痛脚脛痠疼宜服三黃承氣湯方

梔子人 一兩
黃芩 一兩
川大黃 一兩剉

陳橘皮 一兩湯浸去白瓢焙
川芒消 一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分

去滓不計時候温服

治傷寒六日候諸方

夫傷寒六日足厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰絡於肝故得病六日煩滿而陰縮也此則陰陽俱受病毒氣在胃故可下而愈也

治傷寒病六日其病深結在藏是三陰三陽俱受病若五藏六腑榮衛皆不通其人難治宜服小柴胡湯方

柴胡 二兩 去苗 黃芩 一兩 赤芍藥 一兩 半夏 半兩 湯洗 七遍 去滑

枳實 半兩 麩炒 微黃 人參 二兩 去蘆頭 甘草 半兩 炙 微赤 剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候温服

治傷寒六日體重四肢煩疼多渴或譫語不知人事如是病證者胃中皆結燥宜服大承氣湯方

川大黃 一兩 剉 微炒 枳實 一兩 麩炒 微黃 川朴消 二兩

厚朴 一兩 去麩皮 塗生 姜汁 炙 令香 熟

右件藥搗鹿羅為散每服四錢用水一中盞煎至六分

去滓不計時候温服以利為度如人行十里未利再服

治傷寒六日心胸妨悶煩熱不解面赤大渴壯熱身體疼痛此證是毒氣攻心宜服瀉心湯方

半夏 半兩 湯洗 七遍 去滑 人參 半兩 去蘆頭 木通 一兩 剉

甘草 一兩炙 黃芩 一兩 川大黃 一兩剉碎微炒

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒六日嘔噦不定頭痛體疼時有虛汗此證是冷熱未和宜服人參散方

人參 二兩去蘆頭 柴胡 二兩去苗 黃芩 一兩 甘草 一兩炙微赤剉

白朮 一兩 半夏 半兩湯洗七遍去滑 厚朴 一兩去麩皮塗生姜

汁炙令香熟

右件藥搗鹿羅為散每服三錢用水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒六日發汗不解嘔逆小便不利胸脇痞滿微熱而

煩黃芩湯方

黃芩 一兩 桂心 一兩 赤伏芩 一兩 前胡 二兩去蘆頭

半夏 一兩湯洗七遍去滑 甘草 半兩炙微赤剉 厚朴 二兩去麩皮塗生姜

汁炙令香熟

右件藥搗鹿羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒六日發熱惡寒肢節疼痛微嘔心下痞結外證未

去柴胡桂枝湯方

桂枝 一兩 柴胡 二兩去苗 芍藥 一兩 人參 一兩去蘆頭

黃芩 一兩

赤芍藥

枳殼

一兩 煨炒 微黃去瓢

甘草

半兩 炙 微赤剉

半夏

一兩 湯洗 七遍去滑

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒六日其人已發汗而不解胸脇滿小便不多利渴

而不嘔但頭汗出往來寒熱而煩宜服牡蠣散方

牡蠣

一兩 燒 為粉

甘草

一兩 炙 微赤剉

乾薑

一兩 炮 裂剉

柴胡

一兩 去苗

木通

一兩 剉

桂心

一兩

黃芩

一兩

菰藶根

一兩

厚朴

二兩 去鹿皮塗生 姜汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去

滓不計時候溫服

治傷寒六日吐瀉百骨疼痛脚冷腹熱宜服人參散方

人參

三分 去蘆頭

柴胡

三分 去苗

白伏苓

三分

牡蠣

三分 燒 為粉

黃芩

三分

白芍藥

三分

桂心

三分

半夏

三分 湯洗 七遍去滑

甘草

三分 炙 微赤剉

乾薑

三分 炮 裂剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒六日發熱煩悶渴欲飲水得水而吐其脉浮數小

便不利者宜服猪苓湯方

猪苓

三分 去黑皮

白朮

三分

澤瀉

一兩

桂心

半兩

赤伏苓 三分 丁香 三分 甘草 三分 厚朴 一分 鹿皮塗生

姜汁炙 令香熟

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒六日心躁煩渴肢節解痛小腹急滿陰縮宜服葛根散方

葛根 三分 石膏 一兩 柴胡 一兩 川升麻 三分

知母 三分 梔子人 半兩 甘草 三分 川大黃 一分 兩到 碎微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒六日心躁煩悶四肢疼痛小腹滿急宜服大青散方

大青 三分 柴胡 一兩 梔子人 一分 川升麻 三分

知母 三分 石膏 一兩 甘草 三分 微赤到

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒六日脉沉細不定者宜服通關散方

附子 一兩 乾薑 半兩 甘草 半兩 炮裂 去皮臍 裂到 微赤到

黃耆 三分 桔梗 半兩 防風 三分 羌活 半兩 剉 蘆頭 去 蘆頭

五加皮 半兩 桂心 三分

聖惠方
右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒六日頭痛壯熱百節疼痛宜服柴胡散方

柴胡一兩 去苗 川升麻三分 黃芩三分 知母一兩

赤芍藥一兩 大青三分 石膏二兩 梔子人一兩

川大黃一兩 剉 碎 微炒 杏仁三分 湯浸去皮尖 雙入 微炒 微黃

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分 豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒六日熱毒在臍胸中煩悶口噤不能言唯欲飲水成壞傷寒醫所不療宜服黑奴圓方

麻黃三分 去根節 竈下黃土二兩 川大黃二兩 黃芩二兩

川芒消二兩 竈突墨二兩 梁上塵二兩

右件藥擣羅為末煉蜜和圓如彈子大每服不計時候以井華水研下一圓

治傷寒七日候諸方

夫傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病終故也今七日已後病反甚者欲為再經病也再經病者是經絡重受病也

治傷寒七日不解頭痛有熱在裏大腸秘澀與承氣湯後其小便清者病不在裏屬在表也當須發汗若頭痛者必

虱宜服桂枝湯方

桂枝 一兩

赤芍藥 一兩

甘草 一兩

微赤剉

麻黃 一兩

去根節

芍藥 一兩

柴胡 一兩

厚朴 二兩

去麋皮塗生

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一大盞入生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服衣覆取微汗

如人行十里未汗再服

治傷寒七日脉浮發熱無汗渴欲飲水無表證宜服知母

散方

知母 一兩

石膏 二兩

甘草 半兩

炙剉

粳米 半兩

半兩

人參 半兩

去蘆頭

葛根 半兩

剉

右件藥都剉以水三大盞半煎至二盞去滓不計時候
分溫五服

治傷寒七日發熱汗出不解心中痞堅宜服前胡湯方

前胡 三兩

去蘆頭

赤茯苓 三兩

白朮 二兩

川大黃 一兩

剉碎微炒

白芍藥 一兩

枳實 一兩

炒微黃

木通 一兩

半夏 一兩

湯洗七遍去滑

厚朴 二兩

去麋皮塗生

甘草 一兩

炙剉

右件藥搗鹿羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半

分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒七日大下後脉沉遲手足厥逆喉咽不利胸膈煩

躁宜服麻黃散方

堅作

麻黃二兩去根節 當歸一兩剉 川升麻一兩 知母一兩

赤芍藥一兩 天門冬一兩去心 桂心一兩 赤茯苓一兩

甘草一兩炙 石膏二兩 白朮一兩 乾薑一兩炮

右件藥搗鹿羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半

分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒七日不解心煩腸中有結燥謔語宜服柴胡散方

柴胡二兩去蘆頭 半夏一兩湯浸七遍去滑 赤芍藥一兩

甘草半兩炙 知母一兩 黃芩一兩 川大黃二兩剉

陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙 人參一兩去蘆頭

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半

分煎至五分去滓不計時候溫溫頻服稍利為度

治傷寒八日候諸方

夫傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣不盡所以病證猶在也

治傷寒八日熱勢彌重大便結澀心腹痞滿食飲不下精

神恍惚謔言妄語宜服鼈甲散方

鼈甲一兩塗醋炙令微黃去裙襴 細辛一兩 吳茱萸三分湯浸七遍

白鮮皮一兩 附子三分炮裂去皮臍 枳殼一兩炙炒

茵陳一兩 川大黃一兩半剉 桂心三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服微利為度

治傷寒八日煩熱不退四肢疼痛宜服犀角散方

犀角屑 一兩 川升麻 一兩半 柴胡 一兩半 葛根 一兩半

吳藍 一兩 甘草 一兩 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去

滓次入馬牙消二錢更煎三二沸不計時候溫服

又方

柴胡 一兩 黃芩 一兩 犀角屑 三分 伏神 三分

人參 一兩 蘆頭 兩去 甘草 半兩 炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至七分去

去滓下
恐脫次
入二字

滓川朴消二錢更煎三二沸不計時候分溫二服

治傷寒八日不解默默煩悶腹中乾燥大腸結澀狂言宜

服柴胡散方

柴胡 一兩 赤芍藥 半兩 知母 半兩 人參 一兩 去 蘆頭

川大黃 一兩 碎 微炒 甘草 半兩 炙 半兩 夏 半兩 湯洗 七遍去滑

威蕤 半兩 黃芩 半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

煎至五分去滓不計時候溫服以微利為度

治傷寒八日風濕相搏身痛心煩不能自轉側不嘔不渴

下之脈浮者宜服附子湯方

附子 一兩炮裂 去皮臍

桂心 一兩

白朮 一兩

白芷 一兩

甘草 一兩炙 微赤剉

人參 一兩去 蘆頭

陳橘皮 一兩湯浸 去白 剉焙

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至七分去滓不計時候分温二服

治傷寒九日已上候諸方

夫傷寒九日已上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷或三陰傳病已畢又重感於寒名為兩感傷寒則腑臟俱病故日數多而病候改變

治傷寒九日不解心腹堅滿身體疼痛內外有熱煩嘔不安宜服前胡湯方

前胡 一兩去 蘆頭

半夏 一兩湯洗 七遍去滑

白朮 一兩

枳實 一兩微 炒

赤芍藥 一兩

黃芩 一兩

甘草 半兩炙 微赤剉

厚朴 一兩去 姜汁炙 令香熟

鹿皮 塗生

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

治傷寒病九日曾經發汗吐下未解三焦生熱其脉滑數昏憤沉重欲成百合狀證宜服石膏湯方

石膏 三兩

黃連 一兩去 鬚

黃蘗 一兩

黃芩 一兩

豉 二兩
梔子人 一兩
麻黃 一兩 去根節
川大黃 二兩 碎微炒

甘草 一兩 炙
微赤剉

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服如人行十里再服以微利為度

治傷寒九日下之後胸膈煩滿小便不利譫語一身不可轉側宜服赤伏苓湯方

赤伏苓 二兩
柴胡 二兩 去苗
黃芩 一兩
龍骨 二兩

川大黃 三兩 剉
碎微炒

人參 一兩 去蘆頭
牡蠣 一兩 煨為粉

桂心 一兩
陳橘皮 一兩 湯浸去白瓢焙
半夏 一兩 湯洗七遍去滑

甘草 一兩 炙
微赤剉

右件藥擣鹿羅為散每服四錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

治傷寒九日心肺熱氣急喉中有膿血宜服犀角散方

犀角屑 一兩
柴胡 一兩 去苗
青竹茹 一兩
桔梗 一兩 去蘆頭

川大黃 一兩 半剉
碎微炒

麥門冬 一兩 半
去心

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下芒消末一錢攪令勻不計時候温服

治傷寒九日心中滿悶腹脹喘急宜服檳榔散方

檳榔 半兩
訶梨勒皮 半兩 湯浸去白瓢焙
陳橘皮 半兩 湯浸去白瓢焙

甘草 半兩灸 桑根白皮 三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

葱白一莖煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒九日不解往來寒熱狀如溫瘧胸膈滿悶時有痰

逆不止半夏散方

半夏 二兩湯洗七遍去滑 葛根 一兩 白朮 一兩

人參 一兩去蘆頭 柴胡 二兩去苗 陳橘皮 一兩湯浸去白瓢焙

厚朴 一兩去麋皮塗生薑汁灸令香熟 黃芩 一兩 甘草 一兩灸

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入棗三枚

生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒九日不解胸膈滿逆日晚即潮熱此由失下內實故也宜服芒硝散方

川芒硝 二兩 前胡 一兩去蘆頭 枇杷葉 半兩拭去毛灸微黃

葛根 一兩 川大黃 二兩剉碎微炒 半夏 一兩湯洗七遍去滑

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服以利為度

治傷寒發汗通用經效諸方

治傷寒解表利四肢和胃氣人參散方

人參 二兩去蘆頭 桂心 二兩 陳橘皮 二兩湯浸去白瓢焙

厚朴 二兩去麋皮塗生薑汁灸令香熟 乾薑 二兩炮裂剉 赤茯苓 二兩

杏人

二兩湯浸去皮尖
雙人麩炒微黃

白朮

二兩

甘草

二兩灸
微赤剉

麻黃

四兩去
根節

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

治傷寒頭痛壯熱心胸躁悶不得汗者宜服通神散方

麻黃

二兩去
根節

厚朴

一兩去麁皮塗生
姜汁灸令香熟

川大黃

一兩剉
碎微炒

附子

一兩炮裂
去皮臍

甘草

半兩灸
微赤剉

白朮

半兩

人參

半兩去
蘆頭

五味子

半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以新汲水調下三

錢良久以熱水漱口三五度後喫薑茶一盞衣蓋出汗

治傷寒解肌抵聖散方

麻黃

二兩去
根節

甘草

一兩灸
微赤剉

桂心

一兩

附子

一兩炮裂
去皮臍

白朮

半兩

五味子

半兩

陳橘皮

半兩湯浸
去白瓤焙

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服汗出為度

治傷寒頭痛項強壯熱增寒四肢不利宜服此方

附子

半兩炮裂
去皮臍

羌活

半兩

桂心

一兩

乾薑

半兩炮
裂剉

防風

三分去
蘆頭

吳茱萸

半兩湯浸七
遍焙乾微炒

甘草

半兩灸
微赤剉

桔梗

三分去
蘆頭

當歸

三分剉
微炒

五加皮

三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎

至六分去滓不計時候熱服

治傷寒偏身壯熱頭痛腰疼肢節不利宜服通關散方

吳茱萸湯浸七遍 焙乾微炒 羌活 附子炮裂去皮臍

芍藥 五加皮 桂心 防風去蘆頭

麻黃去根節 旋復花 甘草炙微赤剉 已上各半兩

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分薄荷七葉煎至六分去滓不計時候稍熱服汗出為

度

治傷寒頭痛壯熱鼻塞惡風宜服此方

羌活一兩 五加皮一兩 桂心一兩 乾薑半兩炮裂剉

海桐皮剉一兩 青橘皮去白瓢焙一兩湯浸 麻黃根一兩去節

甘草一兩炙微赤剉 附子去皮臍一兩炮裂 吳茱萸半兩湯浸七遍

焙乾微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

治傷寒頭目四肢疼痛正氣散方

麻黃三兩去根節 桂心二兩 甘草一兩炙微赤剉 乾薑一兩炮裂剉

川大黃二兩剉碎微炒 青橘皮去白瓢焙一兩湯浸

吳茱萸一兩湯浸七遍焙乾微炒 厚朴一兩去麁皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

治傷寒頭痛身熱四肢不利宜服解表附子散方

附子 一兩炮裂 去皮臍 乾薑 一分炮 裂到 麻黃 半兩去根節

桂心 半兩 芍藥 半兩 烏頭 半兩炮裂 去皮臍

右件藥搗細羅為散每服一錢以水一中盞入生薑半

分煎至六分去生薑和滓不計時候熱服良久更以熱

酒調下一錢當便汗出

治傷寒陰陽二毒出汗敗毒圓方

乾蠍 半兩 微炒 麻黃 一兩去根節 躑躅花 一分 羌花 一分 醋拌炒令乾

朱砂 一分 細研

右件藥搗羅為末以水研豉心和圓如梧桐子大陽毒煎薑豉湯下七圓陰毒熱水下七圓不用衣覆汗當自

出

治傷寒表裏不解宜服三神圓方

附子 半兩燒令半黑 羌花 一兩醋拌炒令黃 皂莢 一兩不蛀者去皮炙

焦黃 去子

右件藥搗羅為末以豆豉心宿用湯浸至來且研絞取

細稀者用和藥末圓如梧桐子大每服不計時候以粥

飲十圓服藥後或吐或瀉若得一般當便為效

治傷寒發汗極效方

聖惠方
蒼朮四兩 削去皮 甘草 二兩 猪牙皂莢四兩 去根節 麻黃 二兩 去

右件藥生用搗細羅為散每服一錢以水一中盞煎三兩沸不計時候和滓溫服蓋覆令汗出立效

治傷寒發汗神驗白散方

白附子 半兩 附子 半兩 去皮臍 半夏 一分 乾薑 一分

天南星 一分 皂莢子 一分

右件藥皆生用搗細羅為散每服一錢入生薑半分以水一中盞煎至六分不計時候和滓熱服當有汗出便

差

治傷寒發汗方

太附子 一兩 炮裂 去皮臍

太陰玄精 一兩 細研

硫黃 半兩 細研 馬牙消 半兩 細研

右件藥研令勻每服不計時候以生薑熱酒調下一錢良久以稀葱粥投之通身有汗

治傷寒發汗浮萍草散方

浮萍草 一兩 四月十五日者 麻黃 半兩 去根節 附子 半兩 炮裂 去皮臍

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出立效

食前至六食不食和熟藥者特服不出立效

古丹藥其味難辨者以水一中盞入生薑半

兩十五兩草一兩四錢煎外服半兩去煎于半兩飲去便

飲藥者宜早將草煎飲

夏人以蒜蒸藥好之服食百病一錢入生薑半分以

水并藥研令勻每服不惜和熟以生薑藥研隨不一錢

蒜黃一兩天麻一兩

太平聖惠方卷第九

太尉文誥

