


丹溪心法附餘

卷 六

暑門

痢 癰



丹溪心法附錄卷之六

丁集

暑門

新安居士方廣

瘧十八

丹溪心法

○瘧疾有風 暑 食 痰 老瘧 瘧母 大法風暑當
 發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也 惡飲食
 者必自飲食上得之 無汗者要有汗散邪為主帶補 有
 汗者要無汗正氣為主帶散 一日一發者受病一月 間
 日一發者受病半年 二日一發者受病一年 二日連發
 住一日者氣血俱病 瘧病感虛者須以人參白朮一二貼
 托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰

外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服 久瘧不
得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮 一方加柴胡葛根川芎一
補一發不可直截 老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出
陽分則散入方宜

- 川芎 撫芎 紅花 常歸 炒栢
- 白朮 蒼朮 甘草 白芷

○右劉水煎露一宿次早服
治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若
在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬
充按瘧在陰分須微起陽分者即格致論中云臟傳出
至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發

之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川
芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者
所當知也

截藥常山飲

- 穿山甲 炮 草果 知母 檳榔 烏梅
- 甘草 炙 常山

右咬咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為
順 一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青
皮陳皮

又方

- 柴胡 草果 常山 知母 貝母

檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前一時服

又治瘴母此藥消導

青皮

桃仁

紅花

神麩

麥芽

鱉甲

醋炙三稜

莪朮

海粉

香附

並用醋炙

右為末丸如梧子大每服五七十丸白湯下

又治瘴寒熱頭痛如破渴飲水水外多汗出

人參

白朮

黃芪

黃芩

黃連

山梔

炒

川芎

蒼朮

半夏

天花粉

右以咀水二盞姜三片煎服

又治瘴疾發渴

生苜

麥門冬

天花粉

牛膝

知母

葛根

炒栝

生甘草

右以咀水煎

截瘴青蒿丸

青蒿

半斤

冬瓜葉

官桂

馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一

時服盡又云青蒿半斤冬瓜葉二兩馬鞭草二兩桂二

兩未知孰是姑兩存之以俟知者

截瘴

檳榔

陳皮

白朮

常山

茯苓

烏梅

厚朴

各一錢半

右咬咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前下日一服
臨發日早一服服後必睡片時

又瘧疾後

白朮

半夏

一兩 黃連

半兩

白芍

三錢

陳皮

半兩

右為末粥丸梧子大每服六十九丸姜湯下

附諸賢論

心法附錄曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因名
而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他
乎在其陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行
氣消堅為主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少
陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言是但三陰經說不明

凡作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧
也辰戌丑未日者太陰瘧也

附脉理

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷
心法附錄曰瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦
有病久而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之
中見弦但不搏手耳細察可見也

附諸方

黃連香薷飲

治伏暑發瘧煩渴者

見中看

桂枝羌活湯

按粹方

治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡

寒有汗者

桂枝

羌活

防風

甘草

各半兩

右為粗末每服半兩水煎如吐加半夏麴等分

麻黃羌活湯 拔粹方 治瘧疾頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃

去節 羌活

防風

甘草

各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎至如吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯 拔粹方 治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡

寒

麻黃

一兩

炙甘草

三錢

黃芩

五錢

桂

二錢

桃仁

二十箇

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用此

湯散血中風寒也

桂枝黃芩湯 拔粹方 治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少

陽二陽合病也

甘草

人參

黃芩

各四兩半

半夏

四錢

柴胡

二兩

石膏

知母

各五錢

桂枝

二錢

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯 拔粹方 治瘧疾先寒後熱熱多寒少

桂枝

五錢

石膏

知母

各一兩半

黃芩

一兩

右為末三分服每水一盞煎服間日者邪氣所合故也

○已上數方發散之劑

人參養胃湯 治瘧疾寒多熱少者必瀕先用此藥發散然

後用四獸飲之類截之因食倍加草果見胃寒類

萬安散 濟生方 治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以

取效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮 泔浸去皮炒 厚朴 姜製炒 陳皮 去白 檳榔 常山 酒浸

甘草 炙各一錢半

右咬咀水一盞半煎至一盞露一宿當發前作二服忌熱性物片時

定齋草果飲子 簡易方 快脾消瘿

草果 泔浸 厚朴 陳皮 半夏麩

甘草 炙 烏梅 去核各等分

右咬咀每服半兩水盞半姜五片棗二箇同煎茶分不拘

時服寒多者加乾姜附子熱多者只加柴胡瘧瘧加檳榔

柴胡桂枝湯 活人方 治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者

全治勞瘵

柴胡 四兩 桂枝 去皮一兩 黃芩 半兩 瓜蒌根 一兩 牡蠣 炮碎

甘草 炙 乾姜 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服

柴胡加桂湯 活人方 治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡 八兩 人參 去芦 甘草 炙 半夏 炮七次 黃芩

肉桂 去皮各二兩

右咬咀每服五錢水盞半姜七片棗二箇煎服若渴者去

半夏加入參瓜蒌根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑無汗可用

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胃滿者

見濕熱類

柴胡栝麥根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡 去苗一兩 七錢半 天花粉 一兩 黃芩 去黑心 人參

甘草 炙七錢半

右服一兩姜五片棗一枚水二盞煎一盞去渣通口服

白虎加桂枝湯 治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母 六兩 甘草 炙三兩 桂枝 三兩 粳米 三兩 石膏 一斤

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服

清脾飲 治瘧瘵脈來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽乾小便赤澀

青皮 去白 厚朴 姜製 白朮 湯洗七次 黃芩

草果仁 柴胡 去苗 各 茯苓 去皮 各 甘草 等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時候

參蘇飲 治發瘧熱多寒少兼咳嗽者見傷風類

驅瘧飲 治發瘧熱多寒少者

前胡 各四兩 柴胡 各四兩 桂心 桔梗 厚朴

半夏 各三兩 黃芩 乾姜 炮 甘草 炙各二兩

右剉水二盞生姜三片棗四箇煎

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑 有汗可用

大柴胡湯 治瘧熱多寒少目痛多汗脈大以此湯微利為

度餘邪未盡以白芷石膏二物湯以盡其邪方見濕熱

白芷石膏二物湯

白芷 一兩 知母 七錢 石膏 四兩
右為粗末每半兩水一盞溫服清

已上三方治瘡熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲

簡易方

治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚

涎飲與衛氣相搏發為瘡疾

人參

去芦

白朮

茯苓

去皮

橘紅

草果仁

半夏

湯炮

棗子

生姜

烏梅

去核各等分

甘草

炙減半

右吹咀以塩少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火

炮令香熟焙乾每服半兩水一盞煎六分未發前併進數服

七寶飲

簡易方

治一切瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒

熱如瘡

厚朴

姜製

陳皮

甘草

炙

草果仁

常山

雞骨者

檳榔

青皮

各等分

右吹咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空

心向東溫服睡少頃時須忌熱性物寒多加酒服

清肺湯

三因方

治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴

四兩姜炒

烏梅

去核

半夏

湯去滑

青皮

良姜

各二兩

草果

去皮

甘草

炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前

併三服忌生冷油膩之物

○已上三方治瘡寒多熱少止截之劑

常山飲

和劑方

治瘡疾發散不愈漸成勞瘵

六和湯

右收咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服

知母 川常山 草果 各三兩 良薑 二兩

甘草 烏梅 去核各一兩 六錢

右劉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上三方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹 治瘧二三白一發者

常山 一斤醋浸春五夏 檳榔 各四兩 半夏 各二兩 貝母 各二兩

右為末用鷄子清麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸隔

夜臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸 治癰三百一發或十日一發

姜黃 三錢 白朮 一兩 人參 檳榔 草果 莢木 醋炒 厚朴 各半兩 黃芩 半夏 青皮 各一兩 甘草 三錢

右為末飯丸如梧子大每六十九丸食遠白湯下日二服

紅丸子 濟生方專治食癰

青皮 兩 炒三 阿魏 醋化二分 蓬朮 醋煮 京三稜 醋煮各二兩 胡椒 一兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五

十九至百九淡姜湯下或因食生果成瘡用麝香湯吞下

老瘡飲 三四方治久瘡結成癥瘕痲痺在胃脇諸藥不愈者

蒼朮 消浸 草果 去皮 桔梗 青皮 陳皮

良姜 各半 白芷 茯苓 半夏 湯洗 甘草 炙

枳殼 麩炒 桂心 乾姜 炮各 紫蘇葉 川芎 各二

右以咀每服四錢水一盞塩少許煎七分空心服

山甲湯 久瘡瘡母不消者宜服四獸飲間服此湯

川山甲 木鱉子 等分

右爲末每服二錢空心溫酒調下

鼈甲飲子 濟生方治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘡母

草果仁 鼈甲 醋炙 黃耆 去芦 白朮 白芍藥

厚朴 姜製 檳榔 木紅 川芎 甘草 炙各

右以咀每服四錢水一鍾姜七片棗一枝烏梅少許煎溫服

十將軍丸 久瘡不瘥服痛有瘡母

三稜 一兩去 毛土 炮 莪朮 生 青皮 去白 陳皮 去白各 草果 去殼

川常山 兩 砂仁 檳榔 烏梅 半夏 湯泡七次 各一兩

右先將常山草果二味到用好酒醋各一碗入瓦器內先

浸一宿後入八味藥同浸至晚用瓦鉢內炭火煮乾取出

晒如無日色用火焙乾爲末半酒半醋打糊爲丸如梧桐子大每服三四十九白湯吞下日進三服忌生冷魚腥鹹酸油膩麪諸死毒物服四兩至八兩即除根丸有積聚及

行瘴濕地方宜服之

○已上諸方消導之劑

四將軍飲

良方

治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知

入此雖一時急救之方用之有驗

附子

一箇炮去皮

訶子

四箇去核

陳皮

四箇全洗淨

甘草

炙四錢

右以咀為四服每服水一鍾半生姜七片棗七枚煎取一

半令熱灌病者立可甦省

○廣按瘧疾發作而僵仆不省人事者蓋由頑痰老痰膠

固於中榮衛不行故也所以中風中暑而卒倒不省人

事者亦由痰之所致也附子性大熱走而不守本是治

寒濕之藥今瘧疾發作僵仆而用之以其性大熱能開

散頑痰使榮衛得行故取乃是劫劑非正治之藥也

露薑飲

滄察方

用生薑四兩和皮搗汁一碗夜露至曉空心冷服大治脾

胃聚痰發為寒熱

○廣按生姜自然汁凡中風中暑中氣中毒乾霍亂一應

卒暴之證與童便同用立可解散蓋生姜能開痰童便

能降火故也

分利順元散

滄察方治體虛之人患瘧疾寒多不可用截藥者

川芎

附子各一兩

南星

一兩

木香

五錢

另剉臨時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟

合和以咀每服四錢棗七枚生姜十片水一鍾煎七分當

發前一日及當日早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

一方 治久癰

用青蒿桂枝各為末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分互用各以生姜二兩連皮搗汁和熱酒調服以衣被蓋臥即愈

雄黃散 保命集 治久癰不能食胃中兀兀欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃 瓜蒂 赤小豆 各等分

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

辰砂丸 宜明方治一切脾胃虛癰熱毒者

信砒 甘草 硃砂 二錢 大豆 四十九粒

右為末滴水和丸勻分作四十九丸服發日日飲出煎桃仁湯下下丸忌熱性物

危效餅子 和劑方治一切癰疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄股振頭顛中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水或痰聚胸中煩滿欲吐或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或但熱不寒但寒不熱或一日或隔日或發後六七日再發皆治之

龍腦 麝香 定粉 研各 五錢 荷葉 藜豆 甘草 煨各 硃砂 一兩二錢 醋煮二 金箔 二十五 五兩 錢半 研 兩半 簡為衣

右為末煉蜜搜和勻每兩作二十九丸揮匾金箔為衣每服

一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日發者頭
夜服隔數日發者一日夜服連日發凌晨服

不二散

人言一兩飛麵四兩與人言水和軟白扁豆末二

細茶末二

右同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用茶盪
淨忌食酒麵魚等物

雄硃丹

用雄黑豆四十九粒五月五日以冷水浸從早至巳時去
皮取乾研為末入信末一錢再研勻細為丸雄黃為衣晒
乾收貯少壯人如梧桐子大衰老人如小黃豆大小兒如

菘豆大臨發時五更面東井水下一丸不止并服黑豆圓
者是

一方治久瘧

大南星二枚 好信三錢

右先將南星開孔用信三錢研為末裝入孔內兩星相對
用泥固濟炭火煨存性取出研為細末用菘豆粉打糊為
丸如豆大每服一一丸臨發日五更溫茶清下白湯亦可

人言二錢 雄黃 菘豆各五錢

右為細末麵糊為丸如筋頭大硃砂為衣每服一丸用桃柳
條各七寸煎湯露一宿臨發日空心服面東井水食熱物魚

腥油膩十日

癰疾良方 百一選方 令人治癰疾多用常山砒霜之類發吐

取延縱使得安脾胃不能不預不若此藥最為穩當

辰砂光明者 阿魏真者 各一兩

右研勻和稀糊為丸如阜角子大每服一丸空心人參湯下

○已上數方劫奪之劑

灸法 濟生方治癰疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先灸後灸二十壯立效
或灸第三骨節亦可

對金飲子 和劑方治寒熱癰疾愈後調理脾胃

厚朴去皮姜汁炒 蒼朮泔浸去粗皮 甘草炙 陳皮去白各等分

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片棗一箇煎服一丸加草

果倍用蒼朮名草果平胃散

正氣散 徐同知方 退寒癰止胃寒進食

藿香四兩 草果四兩 半夏 陳皮 厚朴

砂仁 甘草各一兩

右剉為散生姜棗子煎溫服如癰未至俟發日早服

草果飲 和劑方治寒熱疾初愈服此進食理脾

紫蘇 草果仁 良姜炒 川芎 青皮

甘草炙 陳皮去白 白芷各等分

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

○已上數方治癰初愈理脾進食之劑

○廣按瘧疾之源蓋由暑月中表氣虛而致中氣虛則水穀停聚而為痰飲於胃膈矣表氣虛則風暑入內而使血液稽留於經絡矣久則痰飲血液拂鬱稠粘膠固痞塞不通人之榮衛晝行陽分二十五度者與背也夜行陰分二十五度者與腹也榮衛行到病所不通乃作寒戰股振頭顛中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴飲飲水煩滿欲吐自汗此邪火發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開鬱豁痰為主用人參養胃湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虛為主用白虎加桂枝湯小柴胡湯之類以發

散之用發散之藥三五服後則用四獸飲六和湯之類以截之或瘧久在陰分亦須用血藥微起陽分然後截之可也

瘧疾治例 出明醫雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗白朮各一錢蒼朮一錢

陳皮七分甘草五分乾葛一錢

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏

各一錢熱甚頭痛再加川芎軟石膏各一錢口渴加石膏知

母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸

酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒洗紅花酒炒黃蘗

各四錢提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加入參黃

芪白茯苓各一錢以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃各一

以補血

已上三味瘧疾必用之

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白

朮黃芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃黃耆黃蘗以斂之無

汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要

無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加入

參一錢酒炒芍藥大麥芽各一錢

若傷食痞悶或有食積者加神曲麥芽枳實炒各二錢

黃連五分

若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢黃芩黃連各六分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢烏梅淨肉三箇

若日久虛癯寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只
用四君子合四物湯加柴胡黃芩黃耆陳皮以滋補氣
血

痢十九

丹溪心法

○痢赤屬血 白屬氣 有身熱 後重 腹痛 下血
身熱按外感小柴胡湯去人參 後重積與氣墜下之故兼
升兼消宜木香檳榔丸之類不愈者用秦艽皂角子煨大黃
當歸桃仁黃連枳殼若大腸風盛可作丸服 保和丸亦治
因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛故也 後重窘迫
者當和氣木香檳榔 腹痛者肺金之氣鬱在大腸之間如實

者以劉氏之法下之虛則以苦梗開支然後用治痢藥氣用
氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥
姜桂之屬 下血四物爲主 下血多王食積與熱或用朴
硝者 青六丸治血痢效 痢疾初得一二日間以利爲法
切不可便用止澁之劑若實者調胃承氣大小承氣三一承
氣下之有熱先退熱然後看其氣病血病加減用藥不可便
用參朮然氣虛者可用胃虛者亦用之 血痢久不愈者屬
陰虛四物湯爲王涼血和血當歸桃仁之屬 下痢久不止
發熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥併熱藥 下痢大孔
痛者因熱流於下也以檳榔木香黃連黃芩炒乾姜 噤口
痢者胃口熱甚故也大虛大熱用香連丸蓮肉各一半共爲

宋米湯調下又方人參二分姜炒黃連一分爲末濃煎終日
細細呷之如吐則再服但一呷下咽便開人不知此多用溫
熱藥其味此以火濟火以滯益滯封臍引熱下行用田螺肉
搗碎入麝香少許置臍內下痢不治之証下如魚腦者半
死半生下如塵腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下
如竹筒注者不治赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆
濕熱爲本赤白滯濁同法下痢有風邪下陷宜升提之
蓋風傷肝肝主木故也有濕傷血宜行濕清熱內經所謂
身熱則死寒則生此是大槩言必兼証詳之方可今豈無身
熱而生寒而死者脈沉少留連或微者易治洪大數者難
治也脈宜滑大不宜弦急仲景治痢疾溫者五法可下者

十法或解表或利小便或待其自已還分易治難治不治之
証至爲詳密但與馮同立論不分學者當辨之大孔痛曰
溫之一曰清之按久病身冷脈沉小者宜溫宜補暴病身熱
脈浮洪者宜清有可吐者亦有可汗可下者初得之時元
氣未虛必狂蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下此
實初病宜下虛弱衰老久病宜升之先水瀉後膿血此脾
傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪易愈下痢
如豆汁者溫也蓋脾胃爲水穀之海無物不受常兼四臟故
五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之
因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹又有疴
瘦作痢一方一家之內上下傳染相似却宜明運氣之勝復

以治之

戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治但分
新舊更量元氣用藥與赤白帶同

入方

黃連 滑石 甘草 白芍 蒼朮
白朮 當歸 青皮 條芩

右剉水煎裏急後重炒黃連滑石加桃仁檳榔甚者大黃
嘔者用姜汁半良

又方

乾姜一錢 當歸二錢 烏梅三箇 栝一錢半 黃連
右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼

又方 治熱與血

大黃 黃連 黃芩 黃栢 枳殼
當歸 芍藥 滑石 桃仁 甘草
白朮 等分

右爲末或湯調或作丸用麩糊或神麩糊丸服一本云
誤服熱藥毒犯胃者當明審以祛其毒

治白痢

蒼朮 白朮 神麩 茯苓 地榆
甘草

右剉水煎

治赤痢

地黄 芍藥 栝 地榆 白朮

右剉水煎 腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香檳榔有
熟加黃芩山梔

又治痢方

滑石 一兩 蒼朮 半兩 川芎 三錢 桃仁 芍藥 半兩
甘草 一錢

右為末姜一片搗細煎滾服

又方 孫即中飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮 白朮 厚朴 茯苓 滑石

右咬咀水煎下保和丸 又云加炒麩甘草

又方

蒼朮 酒板 白芍 各二兩半 酒栝 炒半兩

右為末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方 痢後腰痛兩脚無力

陳皮 半夏 白芍 各一錢 茯苓 蒼朮

當歸 酒芩 各半 白朮 甘草 各二錢

右咬咀作一服姜煎食前服

又方 治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮 白朮 黃芩 滑石 白芍

茯苓 甘草 陳皮 神麩 炒

右咬咀水煎下保和丸

一老年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血

淡膿水腹痛小便不利裏急後重麥朮爲君甘草滑石檳榔木香蒼朮爲佐下保和丸二十五丸第一日煎証俱減獨小便不利以益元散與之安

治痢十法

其或惡寒發熱身首俱痛此爲表証宜微汗和鮮用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑二片煎其或腹痛後重小水短下積此爲裏証宜和中疏氣用炒枳殼製厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此爲死血証法當用搗末桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱加黃芩或口不渴身不熱喜熱手慰溫是名挾寒加乾姜其或下墜在血活之後此氣滯証宜於前藥加檳榔

一枚其或在上下則纏住在上則嘔食此爲毒積未化胃氣未平証當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解積下食自進其或力倦自覺氣少惡食此爲挾虛証宜加白朮當歸身尾甚者加入參又十分重者止用此一條加陳皮補之虛回而利自止其或氣行血和積少但虛坐努責此爲無血証倍用當歸身尾却以生芍藥生芍生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安其或纏墜退減十之七八穢積已盡糟粕未實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未宜遽用蓋固腸丸有去濕實腸之功其或利後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中作痛切

不可驚恐當以陳皮白朮各半煎湯和之自安 其或久痢後體虛氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白凡半裏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐大澁亦能作痛又甚者灸天樞氣海 右前方用厚朴專瀉滯凝之氣然厚朴性大溫而散氣久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡則用炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白有補瀉之兼若為參朮之佐亦純作補藥用 凡痢疾腸痛必以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐無寒者加桂惡熱痛者加黃柏達者更能參以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈在乎執方而已哉

附脉理

脉訣舉要曰瀉則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰無積不痢脉宜滑大浮弦急死沉細無害

附諸方

- 五苓散 治伏熱下痢分利陰陽
- 黃連香薷飲 治感暑下痢鮮血
- 清暑益氣湯 治暑病內傷下痢不思飲食發熱
- 六合湯 治伏熱煩悶或成痢疾 俱見中暑
- 已上數方治因暑下痢之劑
- 敗毒散加石連肉 治下痢熱毒不進飲食
- 倉廩方 仁存方 治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發熱

者敗毒散加陳米姜棗同煎俱見傷風

防風芍藥湯按粹方治泄痢殞泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗多

防風

芍藥

黃芩各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

○已上數方治痢疾身熱者之劑

香連丸和劑方治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連

去芦二十兩用吳茱萸十兩同浸炒令赤色去茱萸不用

木香

四兩八錢不見火

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空心米飲下

導氣湯按粹方治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥一兩

當歸半兩

大黃

二錢半

黃連一錢

黃芩二錢半

木香

檳榔

各一錢

右咬咀每二兩水三鍾煎至七分溫服食前

木香枳殼丸聖惠方治痢疾裡急後重兼開胸膈進飲食破滯氣散內熱

木香

檳榔

陳皮

去白

黃連

去鬚

蓬朮

當歸

去芦

枳殼

去穢炒

青皮

各五錢

香附子

去毛

黃栢

各一兩半

黑牽牛

頭末二兩

右為末水丸如梧桐子大每服五十九丸或七十九丸姜湯下如腫毒加服至二百丸利五七行立消

戴大木香檳榔丸

治証同前

木香

檳榔

青皮

陳皮

廣木

枳殼

黃連

黃柏

大黃

丑末

香附 各二兩

右為末水丸梧子大每五六十九丸煎水下量虛實與之糾

珠多三稜黃芩當歸分兩不同 見鼓脹

保和丸 治脾虛因積作後重者不可下用此消導積聚

和中丸 同前 方見調補脾胃

已上數方治痢疾後重者之劑

黃連阿膠丸 和劑方 治冷熱不調下痢赤白重急後重臍腹

攻痛口燥煩渴小便不利

阿膠 炒二兩 黃連 去鬚三兩 茯苓 去皮三兩

右黃連茯苓為末水熬阿膠膏搜和丸如梧子大每三十丸米飲下

當歸丸 濟生方 治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當歸 芍藥 附子 白朮 乾姜

厚朴 阿膠 蛤粉炒 烏梅肉 一兩

右為末醋糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

蒼朮芍藥湯 按粹方 治痢疾痛甚者

蒼朮 二兩 芍藥 一兩 黃芩 官桂 各五錢

右咳嗽每一兩水二鐘煎至一鐘溫服

四味阿膠丸 仁存方 治挾熱下痢色黃煩燥多渴臍腹疼痛小便不利

黃連 淨四兩 扶苓 去皮 二兩 赤芍藥 三兩 阿膠 蛤粉炒 一兩

右為末 醋糊丸梧子大 每服五十丸 米飲下

當歸導氣湯 按粹方 治膿血痢無度 腹中痛

當歸 芍藥 各一錢 甘草 一錢半 青皮 七錢

槐花 七分 生地黄 酒洗陰 乾二錢

右咬咀 水二鍾 煎至一鍾 去滓 溫服 食前 如後重 加木香

檳榔末 各三分 澤瀉 半錢 如小便利 去澤瀉

已上數方 治痢疾 腹痛者之劑

烏梅丸 治熱留腸胃 臍腹疔痛 下痢純血 或服熱藥過多

毒蘊干肉 滲成血痢 濟生方

烏梅肉 二兩 黃連 三兩 當歸 枳殼 去穢 麩炒 各二兩

右為末 醋糊丸梧子大 每服七十丸 空心米飲下

茵根丸 濟生方 治一切毒痢及蠱注下血 如雞肝心煩 腹痛

茵根 洗 川升麻 犀角 鎊 地榆 洗

當歸 去芦洗 黃連 去鬚 枳殼 去穢 白芍藥 各等分

右為末 醋煮米糊丸 如梧桐子大 每服七十丸 空心米飲下

槐花散 按粹方 治血痢久不止 腹中不痛 不裏急後重

青皮 槐花 荆芥穗 各等分

右為末 水煎 空心熱服

地榆散 百一選方 治中暑昏迷 不省人事 欲死 先治血痢 暑

痢 一地榆 赤芍藥 黃連 青皮 去白

右等分爲末每服三錢漿水調如無只以新水亦得若血痢水煎

地榆散 治下血遠年不瘥及血痢

地榆

卷栢 等分

右改咀用水沙瓶煮數十沸通口服

藥皮湯

經驗方

治傷寒下痢亦治久血熱痢

藥皮

三兩黃芩二兩

黃連 一兩

右改咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛如山

施子小便不利加赤茯苓阿膠煎服

椿皮丸

經驗方

治下痢清血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少爲末米醋糊丸如梧桐子大空心

米飲下三四十丸

四物湯

保命集

治下痢純血

川芎

當歸

白芍

生芩

槐花

黃連

御米殼 等分

右剉水煎服

苦參丸

治血痢

用苦參不以多少炒焦爲末滴水丸如梧子大每服五十丸

米飲下

治痢血方

昔曹魯全痢血百餘日國醫無能療者陳應之取鹽水梅除核研一枚合鹽茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相莊肅

梁公亦痢血應之曰此按水穀當用三物散亦數服而愈
三物散用胡黃連烏梅肉竈心土等分爲末臘茶清調下
食前服

治下痢純血經驗方

黃柏 蜜炙 令香黃色 壹兩

右爲末每服三錢空心溫漿水調下

一方 治血痢

用地錦草不以多少晒乾碾爲細末每服二錢空心米飲
調下

一方 治腸風血痢

用鯽魚一箇破開去腸膽曬白礬二錢燒灰存性爲末米

飲調服

○已上數方治痢疾下血者之劑

地榆散 和劑方 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血

赤多白少或下鮮血裏急後重小便不利

地榆 炒 乾葛 各半 乾姜 炮二兩 當歸 去苗 三兩

茯苓 去皮 赤芍藥 各六兩 甘草 炙四兩 罌粟殼 蜜炒十 二兩

右爲末每服一錢用溫熟水調下不拘時服若下痢純白
及紫黑血并腸滑不禁者不可服之

地榆芍藥湯 按粹方 治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮 八兩 地榆 二兩 卷柏 芍藥 各二兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前溫服

阿膠湯 按粹方

黃連 炒二兩 梔子 五錢 阿膠 蛤粉炒 黃蘗 去皮炙 各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服食前

大黃湯 按粹方治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者用此微利

大黃 一兩

右用好酒二鍾浸半日前至一鍾去大黃將酒分二服如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之痢止再服芍藥黃芩湯以徹其毒也

芍藥湯 按粹方下血調氣洩而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩 當歸 二兩

黃連

黃芩 各半兩 肉桂 二錢

檳榔

大黃 各三錢

甘草 炙

木香 各二錢

右咬咀每服半兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服如痢不減漸加大黃如汗後臟毒加黃芩半兩

芍藥黃芩湯 按粹方治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪

疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣通口服食前

芍藥黃蘗皮丸 按粹方治便膿血

芍藥

黃蘗皮 等分

右爲末醋糊丸如梧桐子米飲送下

專治赤痢秘方

黃連 二兩 木香 甘草 各二錢

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前先下日服五苓散三貼次日早服此藥即止如神

又方

用連白青韭一大握多要取汁和煮酒一盞溫飲之極驗又治婦人心痛有效散氣行血故也解毒金花散經驗方治下痢膿血熱毒

黃芩 白朮 赤茯苓 赤芍藥 各半兩

黃連 黃蘗 各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前如腹

痛加梔子仁一枚同煎

一方 治熱痢不止

用車前葉搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服

黃連烏梅丸 聖惠方治濕熱痢不瘥

烏梅 炒 黃連 各四兩 淨

右為末煉蜜丸梧子大每服二十丸米飲下食前

芍藥雞皮丸子和方治一切濕熱惡痢頻併窘痛無間膿血

芍藥 黃蘗 各一兩 當歸 黃連 各半兩

右為末水丸小豆大溫水下三四十九等忌服油膩生冷一切熱物

○已上數方治濕熱傷血赤痢之劑

戊巳丸 和劑方治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹刺痛

黃連 去鬚 吳茱萸 去梗 白芍藥 各三兩

右為末 麩糊丸梧子大每三十九米飲空心下日三服

升陽除濕防風湯 按粹方如大便閉或裏急後重數至闔而

不能便或少有白膿或少有血慎勿利之升舉其陽則陰

氣自降矣

蒼朮 四兩米 防風 三錢 白朮 一錢 茯苓 一錢

白芍藥 一錢

右以咀每服一兩除蒼朮另作片子水一碗半煮至三盞

納諸藥同煎至三盞去滓稍熱空心食前服

升陽益胃湯 治脾虛濕勝陽氣下陷作痢見內傷類

胃風湯 治風入腸胃作痢或白或赤或豆汁見胃風類

錢氏白朮散 治氣血俱虛神弱之久或濕或痢或吐

人參 白茯苓 白朮 木香

甘草 藿香 各一兩 乾姜 半兩

右為粗末每服五錢水一鍾煎七分食前溫服

一方 治白痢

酸石榴皮 半箇 草果 一箇 陳皮 三片 烏梅 一箇

甘草 一寸 乾姜 一塊

右以咀都作一服水一鍾煎至一鍾去滓食前溫服

一方 山藥剉如豆大一半瓦器內炒熟一半生用為細末

米飲調下

○已上數方治濕熱傷氣白痢之劑

噤口痢

石蓮肉 日乾

右為末每服二錢陳倉米調下便覺思食仍以日照東方
壁玉炒真橘皮為末姜棗畧煎佐之

一方 治噤口痢

用黃連半斤咬咀生姜四兩切作片與黃連同炒待姜焦
黃色去姜只取黃連為細末同陳米飯一處搗爛丸如梧
桐子大每服七八十丸赤者陳米飲下白者陳皮湯下赤
白相參者陳米橘皮湯下

一方 用獨子肥皂一枚去核用鹽實其內久燒存性為細

末先煮白米粥用少許入在粥內食之立效

一方 梨一枚去心入好蜜一匙煨過食之

○已上數方治噤口痢之劑

麴窮丸 治食積作痢

川芎

神麴

白朮

附子 各等分

右為細末麴糊丸梧子大每服三五丸溫米飲下此藥
亦治殭泄○廣按此治冷感食作痢熱則開散之理

木香丸 治痢疾

木香 三錢

豆豉 一兩

巴豆 四十九粒

去殼針穿

右為末豆豉為丸菘豆大每服三丸紅痢甘草湯下白痢

乾姜湯下

木香不二丸 治痢疾或赤或白或赤白交雜

木香 不見火肉豆蔻 麵裹 煨過取 柯子 肉各二錢 巴豆 一兩去殼 油另研

淡豆豉末 一錢半 入 藥一 半 打糊

右為末淡豆豉末同麵打糊為丸如黃豆大小兒如菜豆大量大小虛實每服只許一丸切忌服二九食前或臨卧冷湯下赤痢地榆湯下白痢乾姜湯下赤白交雜甘草湯下服此藥後多行二三次即住

○廣按此二方用巴豆即通因通用之理然於傷冷飲食暴痢用之庶乎可也殊不知痢本因水穀停積濕而生熱濕熱為痢但有傷氣傷血為白為赤之分終無寒冷之義經曰苦寒除濕熱用大黃以推蕩乃是正治也

聖餅子 治積滯作痢

黃丹二錢 定粉三錢 密陀僧二錢 舶上硫黃二錢 輕粉少許

右為細末入白麵四錢滴水利為丸指尖大捻作餅子陰乾食前漿水磨化服之大使黑色為妙

蘇合丸 治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟大每五丸淡姜湯空心下

蘇合香丸 見中風 感應丸 見傷食

○已上數方治積滯作痢之劑

治赤白痢

吳茱萸 揀淨 黃連 去鬚各 等分

附錄心法附錄

三十一

右為一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾為末糊丸
如梧桐子大赤痢用黃連九二十粒甘草湯下白痢用某
黃九二十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒相合併甘草
乾姜湯下

駐車丸 和劑方治一切下痢無問冷熱

阿膠 搗碎蛤粉炒如珠子為末

黃連 去鬚二兩

當歸 去芦一兩 乾姜 炮一兩

右為末以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前米飲下

阿膠梅連丸 宜明方治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸証

金井阿膠 淨草灰炒透明白別研細 赤茯苓 烏梅肉 去核炒 赤芍藥

黃栢 剉炒 黃連 去鬚 乾姜 炮 當歸 焙各等分

聖餅子 治積滯作痢

黃丹 二錢 定粉 三錢 密陀僧 二錢 舶上硫黃 二錢 輕粉 少許

右為細末入白麵四錢滴水相為丸指尖大捻作餅子陰
乾食前漿水磨化服之大便黑色為妙

蘇感丸 治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟大每五丸淡姜湯
空心下

蘇合香丸 見中風 感應丸 見傷食

○已上數方治積滯作痢之劑

治赤白痢

吳茱萸 揀淨 黃連 去鬚各等分

右為一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾為末搗丸
如梧桐子大赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下白痢用菜
黃丸三十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒相合併甘草
乾姜湯下

駐車丸 和劑方治一切下痢無問冷熱

阿膠 搗碎蛤粉炒如珠子為末 黃連 去鬚
以醋四合熬成膏一兩半 二兩

當歸 去芦一兩 乾姜 炮一兩

右為末以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前米飲下

阿膠梅連丸 宜明方治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸証

金井阿膠 淨草灰炒透 赤茯苓 烏梅肉炒去核 赤芍藥

黃柏 剉炒 黃連 去鬚 乾姜 炮 當歸 焙各等分

右為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下十九食前
連夜五六服小兒丸如菘豆大忌油膩脂肥諸物

三味黃丸子 經驗方 止諸痢

黃連 八兩 枳殼 四兩 黃柏 四兩

右為細末麵糊為丸梧子大空心飯湯下三十九如裏
急後重加枳殼湯下

香連丸 治一切痢

黃連 五兩 粉草 二兩 木香 二兩 不見火

右先將草連用密水浸伴濕安在鉢中重湯薰之良久取
出晒乾其依法薰之得九薰九爆九炒再晒十分乾與木香
一處為末水糊丸梧子大每服五十丸食前酒下或米飲下

又方 治一切痢

黃連 一兩

枳殼

甘草 炙

烏梅

各兩

右咬咀每半兩水煎空心服忌魚猪肉油生冷菓子

遇仙立効散 治諸惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重

臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜無度或口噤不食不

問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

罌粟殼

去蒂蓋炒黃

當歸 洗各二兩

甘草

赤芍藥

酸石榴皮 地榆 各一兩

右咬咀每服水一鍾半煎空心溫服忌生冷油膩之物

神効參香散 和劑方治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而

成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑

血赤白相雜裏急後重日夜頻無間新久並能治之

白扁豆

炒

人參 去芦

木香 各一兩

茯苓

去皮

肉豆蔻

煨各四兩

陳皮 去白

罌粟殼

去帶各十二兩

右為末每服三大錢用溫米飲下不拘時服

水煮木香丸 和劑方治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼

去穢一兩八錢

青皮 去白二兩四錢

甘草 炙三兩

當歸 去芦

訶子

灼去核

木香

不見火各六兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一鍾煎化至六分

空心或食前服

真人養臟湯 和劑方治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如

膿血魚腦髓裏急後重臍腹疼痛如脫肛墜下酒毒便血

並治之

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙

人參

去芦

當歸

去芦酒洗

肉桂

去皮

訶子

去核

木香

二兩四錢

肉豆蔻

面裹煨

白朮

焙六錢

白芍藥

一兩

甘草

一兩八錢

右咬咀每服四錢水一鍾煎臍寒者加附子

一方治一切痢

罌粟殼

蜜製

黃蘗

炙

乾姜

當歸

枳殼

去白

甘草

炙各

右用韭菜十數根水二鍾煎不拘時服

固腸湯 三因方治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼

去蒂蓋三

白芍藥

各一兩

當歸

甘草

各一兩

陳皮

訶子

白姜

炮各

人參

木香

各三

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

豆蔻固腸丸

御藥方

治脾胃虛弱臍臑頻滑下痢赤白

木香

赤石脂

乾姜

縮沙

厚朴

肉豆蔻

麵裹煨

右為末麩糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

勝金丹

秘方

乾姜

黃蠟

等分

右取石置化蠟入姜末勻丸如芥子大每服七丸或七丸

白痢酒下赤井花水下

又方

烏梅

白梅

陳久者各七箇

右件去梅核搗梅肉爛同乳香末少許丸梧子大以茶末為衣每服二十丸茶湯下食前

石榴皮散

經驗方

治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下貳錢

一方 治白膿痢

用白石脂為末醋糊丸如小豆大每服十丸空心米飲送下日三服

秘方痢疾方

粟殼

去穢蜜炒伍錢

陳皮

去白五錢

甘草

炙五錢

乳香

沒藥各貳錢

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓入乳沒食前服如白痢熱

服紅痢冷服如痢不止加青皮肆錢煎

白木安胃散

拔粹方

治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛

日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍下虛冷并產後兒

枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止

茯苓

去皮

白木

車前子

各一兩

五味子

烏梅 各半兩

罌粟殼

蜜製二兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

朴連湯

經驗方

治下痢久不瘥

厚朴

姜製

黃連

等分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

神效丸

一名當歸丸

治休息痢膿血不止疼痛因弱

當歸 烏梅肉 黃連 等分

右為細末以生蒜汁和黍手丸如梧子大楮葉每服三十丸空心煎厚朴湯下加至五十丸一方加阿膠一方煉蜜丸其者鑿蠟丸

一方 止林息痢

縮砂為末空心米飲下一錢

木香散 本事方 治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香 黃連 各半兩二 甘草 炙一兩 罌粟殼

生姜 各半兩

右為末入麝香少許每服二錢米飲下

固腸丸 見婦人滯下類 即椿皮丸

白木黃芩湯 按粹方 服前藥痢疾雖除更宜調和

白木 一兩 黃芩 七錢 甘草 三錢

右以咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前

白木黃耆湯 按粹方 服前藥痢疾雖除更宜服此補養

白木 一兩 黃耆 七錢 甘草 三錢

右以咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前

機要白木芍藥湯 服藥痢疾雖除宜用此補脾胃又治老

人奉養太過飲食傷脾時或瀉痢

白木 各一兩其芍藥稍脾炒用治從重生用腹痛炒用酒浸炒尤妙

甘草 炙半兩

右判每一兩水煎服

○已上數方治赤白諸痢虛痢久痢之劑

牛黃神金花 宜明方治大人小兒嘔吐瀉痢無間久新赤白諸色或瀉否或不便澀否并小兒驚疳積熱瘰癧堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食

輕粉

粉霜

礞砂以上另研

雄黃研

硃砂

信砒

芭豆去皮各一錢

黃丹

蠟三錢

右先研粉霜次旋入礞砂研細下雄黃朱砂信砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛為油與前藥研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻捻作劑施丸小豆大新水下下丸小兒黍米麻子大或止此瀉痢疾調桂苓甘露散或益元散亦得俱見中暑類

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

但見傷寒

三一承氣湯

見濕熱

支青丸 宜明方治下痢勢惡頻併窘痛或久愈諸藥不能止瀉可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜以此逐之無宜利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹脹瘰癧小兒驚疳積熱乳癖諸症泄瀉勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各五錢

蜜牛

四兩取末二兩

青黛

一兩

輕粉

一錢

右為末水丸小豆大初服十丸每服加十丸空心日午臨

卧各一服以利為度後常服十五二十九數日後得食以病未全除者再加取利利後却常服以意消息病除為度隨証止之小兒尤如黍米大

○已上數方通用之劑

○廣按痢疾所因有二或因暑月煩渴縱食瓜果生冷內傷腸胃或因夜卧失被早起入水寒濕外襲肚腹二者皆令木鬱不化鬱而生熱則為濕熱濕熱傷氣則成白痢濕熱傷血則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢其証脘腹疼痛或下鮮血或下紫血或下紫黑血或下白膿或下赤白相雜或如豆汁或如魚腦或如屋溜水裏急後重頻欲登廁日夜無度不可遞用罌粟殼龍骨肉豆蔻訶子赤石服輩收澀

病邪則淹纏而不已也其法痢疾初得一二日間元氣未虛以推逐為兼失之於初五日以後脾胃已虛以消導升散為佳所用之藥不過辛苦寒涼之劑以開除濕熱鬱積行氣和血使氣血宣行而已病久披虛又當以滋補氣血收澀滑脫其溫辛熱之藥無之則萬舉萬全而無一失也矣又嘗論之濕熱傷氣成白痢者宜調氣理濕為主而兼清熱濕熱傷血成赤痢者宜涼血清熱為主而兼理濕至於氣血俱傷成赤白痢者則相兼而治觀丹溪節齋之凡藥可見矣

痢疾治例 出明醫雜著

王節齋曰痢是濕熱食積二者別赤白青黃黑五色以屬

五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下之下後未愈隨証調之痢積久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩炒二錢半

黃連炒一錢半

白芍藥炒二錢

○已上三味痢疾必用之藥

木香

枳殼炒各一錢半

檳榔

炙甘草三分

若腹痛加當歸一錢

縮砂一錢

再加木香芍藥各五分

若後重加滑石炒一錢半

再加枳殼檳榔各五分芍藥生用再加五分黃芩條實者亦加五分

若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一錢初欲下之再加

大黃五錢兼食積加山查子枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢半初欲下之再加大黃五錢

若紅白相雜加當歸川芎桃仁各一錢半以理血滑石陳皮蒼

朮各一錢半以理氣有食積亦加山查枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈各七加白朮

一錢黃耆茯苓陳皮各一錢縮砂去檳榔枳殼再加炙乾姜

若紅痢人胃弱血虛或下後未愈各五加當歸川

芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢半

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澀短少加水通澤瀉

茯苓各一錢山梔子炒五分以分利之

丹溪心法附餘痢疾卷之六


四十一終

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各一錢久不愈減
 芩連各七分去檳榔枳殼再加阿膠珠砂側柏葉各錢一分
 黑乾姜一錢白木半錢陳皮一錢
 若痢已久而後重去此大腸墜下去檳榔枳殼用條貫
 黃芩加升麻一錢以升提之
 若嘔吐食不得下加軟石膏一錢陳皮一錢山梔仁炒五分入
 生薑汁緩嘔之以瀉胃口之熱
 有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮陳皮黃連
 黃芩阿膠之類以補之而痢自止
 有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮砂厚
 朴肉桂之類

若得痢而誤服溫熱止瀉之藥則雖稍久亦宜用前法以
 下之下後方調之
 若得痢便用前正法以下之而未愈又用前調理法治而
 久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補寒溫二條擇用
 更加龍骨赤石脂罌粟殼烏梅肉等收瀉之藥

丹溪心法附餘痢疾卷之六 終

四十一終



4
5290

