


坤  
止








坤 止

著者及書名  
丹溪心法附錄  
方廣拱  
數 11 年  
番





u-5/3296-3305



丹溪心法附餘

卷二十

風熱門

癩疹

頭眩

頭痛

肩脛痛

頭風


眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒



丹溪心法附餘卷之十二

已集

風熱門

斑疹 五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作，自裏而發於外，通聖散中消息，當以微汗散之，切不可下。內傷斑者，胃氣極虛，一身火遊行於外所致，宜補以降於陰，証略例中求之。發斑似傷寒者，痰熱之病發於外，微汗以散之，若下之非理。疹屬熱與痰在肺，清肺六降痰，或解散出汗，亦有可下者。疹即瘡疹汗之，即愈，通聖散中消息之。癩疹多屬脾隱，然在皮膚之間，故言癩疹也。發則多痒，或不仁者，是蕪風蕪濕之殊色，紅者

兼火化也 黃瓜水調伏龍肝去紅點斑  
戴云斑有色點而無頭粒者隨出即收收則又出是也非  
若斑之無頭粒者當明辨之

附諸方

玄參升麻湯 三四方 治傷寒失下熱毒在胃發癰或汗下吐  
後餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參 升麻 甘草 各

炙各  
等分

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服濕毒發斑亦宜服  
之

陽毒升麻湯 活人方 治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻 三分 犀角 射干 黃芩 人參

甘草 炙各  
二分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯 活人方 治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母 各一兩

升麻 黃芩 石膏 各二兩 甘草 炙半兩

杏仁 去皮尖 柴胡 一兩  
二兩 五錢

右咬咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脹虛

人參 石膏 知母 甘草

守真加白朮一方加玄參

右咬咀時時煎服

丹溪心法附錄卷十二  
黃連橘皮湯 治濕毒發斑

黃連去毛 四兩 陳橘皮 杏仁去皮 尖 枳實  
麻黃去節 湯炮 各二兩 葛根各二兩 厚朴姜製 甘草灸各 一兩

右以咀水煎服

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼朮一錢 半 陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥炒  
甘草炙 桔梗 半夏 白芷 羌活  
枳殼各一錢 川芎五分 麻黃 桂枝各五分

右以咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛旁子六錢 荆芥 防風各三錢 甘草一錢

右以咀水煎服

通聖散 出丹溪經驗方

川芎 當歸 麻黃 薄荷 連翹  
白芍各半兩 黃芩 石膏 桔梗各一兩 滑石三兩  
荆芥 梔子 白朮各二錢 半 甘草二兩  
右剉水煎服 如身疼加蒼朮羌活 痰嗽加半夏  
每服細末三錢 生姜三片 搗細 盪起 煎沸服之

頭眩 六十

已集

丹溪心法

○頭眩○痰挾氣虛併火○治痰爲主挾補氣藥及降火藥  
無痰則不作眩痰因火動又有濕痰者○濕痰者多宜三一

陳湯火者加酒茶挾氣虛者相火也治痰爲先挾氣者降火  
藥如東垣半夏白朮天麻湯之類○眩暈不可當者以大黃  
酒炒爲末茶湯調下○火動其痰用一陳加黃芩蒼朮羌活  
散風行濕○左手脉數熱多脉瀼有死血○右手脉實有痰  
積脉大是久病久一作虛久病之人氣血俱虛而脉大痰濁不降  
也○昔有一老婦患赤白帶下年半頭眩坐立不得睡之則  
安專治赤白帶帶愈其眩亦安

附脉理

脉訣要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮  
寒緊濕細暑虛延弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先  
理痰氣次隨證治

附諸方

獨活散 楊氏家藏方治風化痰治頭目眩暈

細辛 去葉 石膏 研 甘草 炙各半兩 防風 去芦 藁本 去土

旋覆花 蔓荊子 川芎 獨活 去芦各一兩

右爲末每服二錢水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

川芎散 本事方治風眩頭暈

山藥 甘菊花 人參 茯神 小川芎 各五錢

山茱萸肉 一兩

右爲末每服二錢酒調不拘時日三服亦可誤用野菊花

芎朮湯 濟生方治冒雨中濕眩暈吐逆頭重不食

川芎 半夏 白朮 各一兩 甘草 炙半兩

右改咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時  
芎朮除眩湯直指方治感寒溫頭目眩暈

甘草炙 川芎 附子 白朮 官桂等分

右改咀每服三錢姜七片水煎溫服食前

荆黃湯張子和方治頭眩

大黃 荆芥穗 防風各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯濟生方治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈欲倒嘔

吐不定並皆治之

川芎一兩 細辛洗去土 白朮 甘草各半

右改咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨

卧溫服或食後服亦可

頭運方 利痰清氣降火

南星製五分 半夏一錢 桔梗七分 枳殼一錢 陳皮一錢

甘草三分 茯苓一錢 黃芩一分

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲 治氣虛眩暈

木香 白朮 半夏麴 橘皮 茯苓

砂仁各半 丁香 甘草炙二分

右剉散水二鍾姜五片煎服 加當歸川芎官桂治血虛

眩暈

白附子丸 治風痰上厥眩暈頭疼

全蝎炒半兩 白附子炮 南星炮 半夏

旋覆花 甘菊 天麻 川芎

橘紅 殭蚕炒 乾薑生各一兩

右為末，生姜半斤取汁打糊丸，梧子大煎荊芥湯下五十

丸

人參煎胡湯 治風痰頭暈目眩

半夏麩 木香 枳殼炒 紫蘇

赤茯苓 南星炮 甘草炙各五錢 人參三錢

前胡 橘紅各五錢

右剉散每服五錢姜五片水煎服

川芎茶調散 治風眩頭痛 見傷風

半夏白朮天麻湯 見頭痛

噤起散 大金良方治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事噤

起草即蒼耳草也

右取嫩心不以多少陰乾為末每服二錢酒調下

黑錫丹 治早起眩暈須臾自定以為常此因老痰鬱痰所

作必須此藥劫之見痰類

○廣按頭眩之症多至於痰無痰則不作眩有因寒痰濕痰者有因熱痰風痰者有因氣虛挾痰者有因血虛挾痰者其証不一也夫寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷生冷熱痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣虛眩暈或因脾虛不進飲食或因胃積嘔吐泄瀉血虛眩

冊溪心法附錄卷十三  
五  
暈男子每因吐血下血女人每因崩中產後而作也已  
上數方雖各有所主未能盡其變在智者擴充之也又  
嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩二者乃病之標必治其病之  
本而病方已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補  
其氣是治其病之本也

頭痛 六十一 附眉眶痛

丹溪心法

○頭痛多主於痰痛甚者火多有吐者可下者 清空膏  
治諸頭痛除血虛頭痛不可治 出東垣試效方 血虛頭痛  
自魚尾上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

玉節齋曰久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帽包裹  
者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥  
暫時得效誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故  
風寒易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開  
通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚  
矣唯當瀉火涼血爲主而佐以辛溫散表之劑以從治法  
治之則病可愈而根可除也

附脉理

脉訣舉要曰頭痛陽弦浮嵐緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛  
頭痛雖弦必瀋痰厥則滑腎厥堅實

頭痛治例

心法附錄曰頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮

少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是濕痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子白芷酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂頭痛宜藁本防風柴胡東垣云頂頭痛須用藁本去

川芎且如太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之

類為主少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實升麻葛根石膏白

芷為主

太陰頭痛必有痰躄重或腹痛脈沉緩以蒼朮半夏南星

為主

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為

主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩以吳茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎為王  
氣虛頭痛人參黃芪為王

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子三分細  
辛二分其效如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知  
熟而不知用者弊躰用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散 和劑方 治八風五痺肢躰不仁大治風寒入  
腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有濕痺脚  
氣緩弱並皆治之

山茱萸 去核 三兩 細辛 一兩 半 乾姜 泡三 兩 防風 去芦 四兩

茯苓 去皮 三兩 附子 三箇半炮 去皮脐

右為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛 見傷風

都梁丸 和劑方 治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前

產後傷風頭痛

香白芷 棟大者沸湯洗 五次剉曬乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯下

小芎辛湯 濟生方 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不巳

川芎 一兩 細辛 洗去 土 白朮 甘草 炙各 半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服

一方 治傷風感風一切頭痛

甘菊 一兩 細辛 半兩 甘草 七錢 白芷 羌活  
香附子 薄荷 各三枝 荆芥 二十枝 茵陳 半兩 蒼朮 洪浸

川芎 各一兩

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下  
定風餅子 秘方治偏正頭痛

草烏頭 半兩 微炮 香白芷 一兩 川芎 二兩 防風

天麻 甘草 炒各一兩 細辛 半兩

右為末姜汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯  
下

川芎丸 聖惠方消風壅化痰涎利咽膈清頭目旋暈心忪煩  
熱頭項緊急肩背拘攣肢躄煩疼皮膚瘙癢腦昏目眩鼻

寒聲重面上遊風

川芎 薄荷 各七兩 甘草 細辛

防風 各二兩 桔梗 十兩

右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸每服一九細嚼茶清食  
後臨卧時下

川芎餅子 濟生方

川芎 撫芎 乾姜 炮 甘草 藁本 去芦  
天南星 炮去皮 防風 去芦 白朮 各等分

一方有蒼耳無白朮

右為末姜汁蒸餅為劑如雞頭大捏作餅每服五錢餅細  
嚼茶清下

徹清膏

蔓荆子

細辛各一分

薄荷葉

川芎各三分

生甘草

炙甘草各五分

藁本一錢

右為末茶清調下二錢

神靈散

治偏正頭疼不正

止及破傷風等疾

煇硝一兩

黃丹

雄黃各三錢

沒藥

乳香各二錢

右為細末令患人用略溫水用竹筒吹藥入鼻中少許

一方治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每服一字左邊疼

吹右鼻內右邊疼吹左鼻內

已上諸方辛溫外散風寒之劑

天麻散

治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱

方見風熱

生朱丹

御藥院方

治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胸膈不利

利

朱砂一兩二錢半

龍腦一錢

白附子炮去皮

石膏半斤

燒通紅令

右為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服二十九

食後茶酒任下

大川芎丸

治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲偏

正頭疼

川芎一斤

天麻四兩  
州者

右為末煉蜜為丸每兩作十九每服一九細嚼茶酒下食

後

上清散

集成

治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

薄荷葉

芒硝各二錢半 乳香

沒藥各半錢 腦子一分半

右為末每服一字鼻內搐之

菊花散和劑方 治風熱上攻頭痛不止

石膏

甘菊花

防風

旋覆花

枳殼

蔓荊子

甘草

羌活各一錢半

右用水二盞生姜五葉煎至一盞去渣溫服

芎芷散直指方 治風壅頭痛

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

川芎散拔粹方 治偏頭痛神效

甘菊花

石膏

川芎各三錢

右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

石膏散拔粹方 治頭痛不可忍

麻黃

去根節

石膏各二兩

何首烏半兩

乾姜七錢半

右為細末每服三錢臘茶清調服

點頭散聖惠方 治偏正頭痛

川芎

生二兩

香附子

去毛四兩

右為末每服一錢好茶調下常服除根

一方 治頭痛去風痰

南星

一箇大者七片

皂角

十四箇七箇生七箇煨

白梅

一箇

姜三片

牙茶

一撮

葱頭

一分

右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去滓溫服不可輕犯鐵器搗

一方治頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開之

兩前茶 川芎 白芷 防風 藁本

細辛 當歸

右用水煎服

川芎散 聖惠方治頭風偏正頭痛

羌活 細辛 川芎 香附子 槐花

甘草 炙 石膏 荆芥穗 薄荷 菊花

茵陳 防風 各一兩

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

清空膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上壅及

腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 酒炒 防風 羌活 各一兩

炙甘草 一兩 五錢 細梃子黃芩 三兩去皮一半 酒製一半炒

右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內

少用白湯送下臨臥 如昔頭痛每服加細辛二分 痰

厥頭痛脈緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一

倍 如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加吳白

芷 自虎湯方 見溫熱類

靈砂丹

御藥院方

治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲

重鼻流清涕口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸

胃燥澀小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮

落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治之

天麻

獨活

羌活

細辛

石膏

防風

連翹

薄荷各一兩

川芎

梔子

芍藥

荆芥穗

當歸

黃芩

大黃生

全蝎

去毒微炒

菊花

人參

白木各半

硃砂二兩為衣

寒水石

生桔梗各一兩

宿砂仁二錢

生甘草二兩

滑石

四兩

右為末煉蜜丸每兩作十丸硃砂為衣每服一丸細嚼茶

清送下

真珠散

聖惠方

治偏正頭痛頭風

盆硝

七錢

白滑石

半兩

乳香

一錢

片腦

少許

右研細用一字口噲水噲鼻內

豆粉丸

聖惠方

治風熱頭疼

川芎

細辛

甘草

白芷

豆粉

各二錢半

薄荷

石膏

各半兩

朴硝

二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細

嚼茶清下

川芎散

聖惠方

治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眩

齒間緊急作偏頭痛

丹溪心法附錄卷十二

十四

川芎 柴胡各一兩 半長麴 甘草炙 甘菊花  
細辛 人參 前胡 防風各半兩

右以咀每服八錢水一盞半生姜三片薄荷少許煎至八分溫服

安神湯 聖惠方 治頭痛頭眩眼黑

羌活 黃蘗各一兩 防風二錢 柴胡 升麻

知母 酒浸 生地黄各半兩 黃芪二兩

生甘草二錢 加葛荊子半錢 川芎三分 炙甘草三錢

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後治頭痛

片苓酒浸透晒乾為末茶清調下 治諸般頭痛亦治

血虛頭痛

治頭痛如破

酒炒大黃半兩一茶煎

○已上諸方辛涼內消風熱之劑

定風餅子 治風寒客於陽經和傷膝理背脊強直言語蹇

澁躄熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵 五見傷風

如聖餅子 和劑方治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風 天麻各半兩 南星洗 乾姜 川芎

甘草 川烏各一兩 半夏生半兩

右為末水丸作餅子每五餅同荊芥細嚼茶酒下澹寮方加細辛

丹溪心法附錄卷十二

十五

丹溪心法附錄卷十三

三生丸 濟生方 治痰厥頭痛

半夏 白附子 天南星 各等分

右為末 生姜自然汁浸蒸餅為丸 如菽豆大 每服四十九 食前姜湯米飲任下

天香散 簡易方 治年久頭風頭痛不得愈者

天南星 半夏 湯洗去滑盡 川烏 去皮 白芷 各等分

右咬咀 每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

九龍丸 聖惠方 治男女八般頭風一切頭痛

川芎 石膏 白芷 川烏頭 半夏

南星 各半 加細辛 全蝎 各二錢半

右為末 薑汁為丸 如梧桐子大 每服五十九 茶清送下

不卧散 治頭痛不可忍者

玄胡索 七枚 青黛 二錢 猪牙皂角 肥實者刮去皮及子二兩

右為末 用水調丸成小餅子 如杏仁大 用時令病者仰臥 以水化開用竹管送入男左女右鼻中 覺藥味至喉火酸 令病者坐却令咬定銅錢一箇於當門齒上 當見涎出成 盆即愈

至真丸 濟生方 治腎厥頭痛不可忍其脈壅之則弦按之則 堅

生硫黃 二兩 研石膏 硬者 煨半夏 湯洗七次 硝石 別研各

右為末 研勻用生姜汁煮糊丸如梧桐子大 每服四十九 食

丹溪心法附錄卷十三

前姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一两  
芎烏散 治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭目昏眩

川芎

天台烏藥 各等分

右為細末每服二錢臘茶清調服

芎木湯 三因方治暑濕頭痛身重眩暈痛極

附子

生去皮 臍半兩

白朮

川芎

桂心

各二錢半

甘草

一錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥腎厥者濕之劑

順氣和中湯

治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪

一錢半

人參

一錢

甘草

炙七分

白朮

陳皮

當歸

芍藥

各五分

升麻

柴胡

各三分

細辛

蔓荊子

川芎

各二分

右作一服水煎食後服

亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯

治脾胃証已經服疎風丸下二三次元

證不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭眩目不敢開頭苦痛

如裂四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也

黃柏

二分

乾姜

三分

澤瀉

白茯苓

天麻

白朮

各一錢

黃芪

人參

蒼朮

各五分

炒神麴

白朮

各一錢

麥芽

半夏

湯洗

陳皮

各一錢半

右每服五錢水煎熱服

芎歸湯 治血虛頭痛

川芎

當歸 等分

右每服五錢水煎服

四神散 大全良方 治婦人血風眩暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗

右等分爲細末每服二錢葱白二寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛

內加川芎二分蔓荊子三分細辛二分 方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

丹溪心法

○肩胛痛屬風熱與痰 作風痰治類痛風

入方

黃芩 酒浸 白芷

右爲末茶清調二錢

又方

川烏 二味爲君童便浸炒去毒 細辛 羌活

黃芩 甘草 等分爲佐

右爲細末茶清調服 一本加南星

附諸方

選奇方 治肩骨痛不可忍大有効

羌活 防風 各二錢 甘草 二錢 夏月酒黃芩 一錢 冬月不用有熱者用

右每服三錢水煎食後溫服水一鍾煎七分

上清散 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者  
一方 治頭痛連眼痛 俱見頭痛

頭風 六十二

已集

丹溪心法

○屬痰者多 有熱有風有血虛 在左屬風薄荷荆芥屬  
血虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半夏屬熱酒苓為主又屬  
濕痰川芎南星蒼朮 偏頭風在左而屬風者用荆芥薄荷  
此二味即是治之主藥有君臣佐使之分凡主病者為君而  
多臣次之佐又次之須要察其兼見何症而佐使之如有痰  
即以二陳湯治痰而佐之他症皆倣此又須察識病情全在  
活法出入加減不可執方

入方

酒片苓 一两 蒼朮

羌活

防風 各五錢

細辛 二錢

蒼耳 三錢

右為末每服三錢生姜一大片同搗勻茶湯盪起服之  
又方

酒片苓 五錢

蒼朮 半一錢

蒼耳

川芎

生甘草

酒黃連 各一錢半

半夏 炒三錢半

右為末服法同前

瘦人搗藥

軟石膏

朴硝 各五錢

腦子

荆芥

檀香皮

薄荷 各一錢

白芷

細辛 各二錢

右為末搗鼻肉

頭痒風屑髮黃

用大黃酒浸炒為末茶調服

一粒金搗鼻方 治偏頭風

藁本 玄胡索 白芷 川芎

青黛 各一 草撥 不以多少研細用猪膽汁拌

右為末入製草撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水化開搗鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風

烏頭尖 七箇 荆芥 防風 甘草 蔓荊子

台芎 桔梗 麻黃

右為末茶調

一人頭風鼻塞

南星 蒼朮 酒苓 辛荑 川芎 各等分

右為末茶調

附諸方

川芎散 拔粹方 治偏頭痛頭風神效

甘菊花 石膏 川芎 各三錢

右為末每服一錢茶清調下下方有白姜蚕六錢生用

消風散 和劑方 治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並皆治之

川芎茶調散 和劑方 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭風

並見傷風

菊花茶調散 治諸風頭自昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草

白芷 各二兩 細辛 一兩 防風 去芦一兩半 蝉蛻

僵蚕 薄荷 各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

芫荽湯 治膈痰風厥頭自昏疼鼻塞聲重肩背拘急

川芎 五錢 細辛 三錢 甘草 炙一錢半

右用水煎食後服

一方 治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸

如梧子大捏作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右  
仰面以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更  
不再發亦治痰疾妙

一方

天麻 防風 川芎 等分

右為末每服三錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即

愈

一方 治偏頭風

用葶藶為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字右  
邊痛右鼻吸一字甚效

金花一聖散 治頭風

川芎 川烏 白芷 各等分

右為末每服二錢生葱三寸薄荷葉三四皮同煎食後服

灸法

宜灸額會百會前頂上星等穴瘡

眼目 六十三

已集

丹溪心法

眼黑睛有翳皆用知母黃柏 眼睛疼知母黃柏瀉腎火  
當歸養陰水 眼中風淚出食後吞龍會丸數粒且三次  
冬月眼暴赤痛亦當解散不宜用涼藥

入方

神効七寶膏 治暴發眼執蓮有翳膜者

麩仁去油 白礪砂 片腦 硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷 荆芥 細辛

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香烟  
上取烟盡之後以小青罐收烟藏之凡眼有風熱多淚者  
皆可點此是陽明經有風熱所致

生熟地黃丸 治血虛眼見後

龍會丸 見協痛

一人病眼至春夏便當作翳治

黃芩 酒浸 南星 姜製 香附 童便 蒼朮 童便浸 各二兩

道芳 酒浸一兩半

山施 炒一兩 龍膽草 酒浸

陳皮 連翹

蘿蔔子 蒸各半 柴胡 三錢

右為末 神麴糊丸

附諸賢論

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒卒涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用配姜末生姜汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如錮底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內

攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片為劫藥而誤誌為寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物冷藥搥洗嘗致昏瞎者有之

附諸方

明目流氣飲 和劑方 治肝經不足内生風熱上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚癢澀難開或生障翳婦人血風時行暴赤一切眼疾並皆治之

- 大黃 炮 牛蒡子 炒 川芎 菊花 去皮
- 白蒺藜 炒去刺 細辛 去苗 防風 去苗

玄參 去芦 山梔子 去皮 黃芩 去芦 甘草 炙

蔓荆子 去白 荆芥 去梗 木賊 去根節

草决明 一两半 蒼朮 米泔浸炒二兩

右為末每服二錢臨卧用冷酒調下

洗心散 和剂方 治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼澁睛痛

或腫或赤迎風多淚怕日羞明並皆治之 方見久類

洗肝散 和剂方 治風毒攻上暴作赤目腫痛臃澁多淚

薄荷 去梗 當歸 羌活 防風 各去 川芎

甘草 大黃 各一兩

右為末每服三錢食後熱水調下

蜜蒙花散 和剂方 治風氣攻注兩眼昏暗多淚羞明并暴赤

腫

蜜蒙花 揀淨 杜蒺藜 炒去尖 羌活 去芦 木賊 菊花

石决明 用鹽同東流水煮

右為末每服一錢臘茶清食後調下

撥雲散 和剂方 治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜睛怕

自羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草 炒各一斤

右為末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花

苗煎湯皆可服忌諸毒物

蠶花散 和剂方 治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明

一切風毒并宜服之

穀精草去土 菊花去梗 蟬蛻洗去土淨 羌活 甘草

白蒺藜炒去刺 草决明 防風去芦 山梔子去皮

川芎不見火 蜜蒙花去枝 荆芥穗去梗 黃芩去土

蔓荆子去皮 木賊洗淨各等分

右爲末每服二錢食後茶清調服或荆芥湯調亦可

菊花散和劑方 治肝生風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澀痛

菊花去梗六錢 羌活去芦 白蒺藜炒去尖 木賊去節各三兩

蟬蛻去頭尾翅三兩

右爲末每服二錢食後茶清調下

四生散 治肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明方見風熱

芩藟丸御藥院方 治遠視不明常見黑花久服明目

芩藟 菊花 荆芥 薄荷 甘草各一兩

蒼朮二兩米泔浸

右爲末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸食後茶清下

荆芥散三因方 治肝經蘊熱眼目赤腫

荆芥穗 當歸 赤芍藥各一兩半 黃連一兩

右以咀每服三錢水一鍾煎三沸瀝去滓溫服或洗

十全神麴丸三因方 明眼目百歲可讀細書常服有效

神麴四兩 光明硃砂一兩磁石醋重淬

右爲末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食後茶飲下

黃連丸本事方 治肝經風熱上攻眼目澀痛不可用藥補者

乾熟地黃一兩半 黃連 决明子各一兩 沒藥

羌活 光明硃砂 甘菊花 防風 桂心 各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熱水下

決明子散 消生方 治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澁胬肉或痒或痛蓋明多淚

黃芩 甘菊花 去枝木賊 決明子 石膏

川芎 赤芍藥 川羌活 去芦 甘草 蔓荊子

石決明 各一兩

右為末每服三錢水一鍾姜五片煎至六分食後服

草龍膽散 聖惠方 治風毒熱氣攻衝眼目暴赤澁澁蓋明及腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉癢痛

龍膽草 洗去芦 菊花 去梗 木賊 洗淨去節 草決明 微炒

甘草 炙各二兩 香附子 炒去毛 川芎 不見火各四兩

右為末每服三錢用麥門冬湯入冰糖少許調服食後或米泔調下亦得

又方和劑方治眼目暴赤腫痛風毒熱氣上衝睛疼連眶臉皆赤爛瘀肉侵睛時多熱淚及因忿怒逆損肝氣久勞瞻視風沙塵土入眼澁痛致成內外障翳等疾

龍膽草 蒺藜 炒去刺各六兩 茯苓 去皮四兩 菊花 去枝五錢

赤芍藥 八兩 防風 去皮核 甘草 炙 羌活 各三兩

右用為末溫酒調二錢食後服散熱飲子 按粹方 治眼暴赤暴腫

防風 羌活 黃芩 黃連

右等分水一鍾半煎八分去滓溫服食後如大便秘加大黃一兩痛甚加當歸地黃各一兩如煩燥不眠加梔子一兩

已上諸方散風熱之劑

石膏羌活散 宜明方 治久患雙目不觀光明遠年近日內外

氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活 治腦熱 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳障 香白芷 清利頭目

乾菜子 細辛 倒睫 起 蘇子 起拳 川芎 治頭

蒼朮 開鬱 行氣 甘菊花 明目 去風 荆芥穗 治目中

石膏 黃芩 退熱 味洗 藁本 治偏頭痛 甘草 和諸藥 各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用藥水一盞調下或

茶清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫

數十餘人矣 後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄

荷葉防風天麻桔梗 各等分為小丸服

蟬花無比散 和劑方 治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一切

眼目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸細小連

睛赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁癢痛並治

扶苓 甘草 防風 去芦各 川芎 羌活

當歸 洗焙各 赤芍藥 十三 蛇蛻 灸一

蒺藜 炒去皮 尖半斤 蟬蛻 去頭足 石決明 用鹽水煮 研細為粉

蒼朮 去皮炒 十二兩

石為末每服三錢食後米泔調服茶清亦可忌毒食

明眼地黄丸 和劑方 治男子婦人肝虛熱積上攻眼目翳膜  
遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘並治  
暴赤熱眼

牛膝 去芦酒浸三兩 石斛 去苗 生地黄 一兩 熟地黄 洗焙一兩

防風 去芦四兩 杏仁 去皮尖炒去油研細 枳殼 去白麩炒各四兩

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食前塩湯温酒任下

羊肝丸 濟生方 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝 一具生用 黃連 去鬚另研爲末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末杵和丸如梧子大每服五十丸熟水送下和濟方用白羊子肝

上清丸 秘方 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤澁

羚羊角 犀角 黃連 厚朴 各一兩

牛黃 黃芩 川芎 羌活 蟬退

白芷 菊花 大黃 防風 草决明

地膚子 滑石 各五錢 生地黄 熟地黄 各七錢 牽牛 八錢

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三五丸茶清下食後  
杞苓丸 曾氏家傳專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗

遠視不明漸成内障

白茯苓 去皮八兩 真枸杞 酒浸四兩 當歸 酒洗二兩 青塩 別研一兩

兔絲子 二兩酒浸蒸

右爲末煉蜜丸如梧子大每服七十丸食前熱湯下

導赤散 曾氏家傳 治心臟積熱上攻眼目兩眦浮腫血侵白

睛羞明酒淚一切治之

牛蒡子炒 榆子 槐子炒 生乾地黄 黃芩各等分

右為末每服二錢食後麥門冬湯調下

車前散 曾氏家傳 肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人

羞明多淚

蜜蒙花去枝 甘菊花去枝 白蒺藜炒去刺 羌活

粉草 草決明 車前子各炒 黃芩

龍膽草洗各等分

右為末每服二錢食後飯湯調下

五味子丸 曾氏家傳 治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗眼

目昏暗或生翳膜

阿膠蛤粉炒 熟地黄各一兩 白茯苓 麥門冬各半兩

芍藥 五味子 杜仲去皮姜汁炒

貝母炒 栝子仁 茯苓去木遠志 去心

人參 百部 防風去芦各一兩

右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯嚥下一丸

蔓荆湯 聖惠方 治勞役飲食不節內障眼疾此方立効

黃芪 人參各一兩 蔓荆子二錢 甘草炙八錢

白芍藥二錢 黃柏三錢酒浸晒四次

右吹咀每服五錢水二盞食後臨卧温服

助陽和血補氣湯 衛生寶鑑 治眼目發後熱白睛紅多眼淚

無疼痛而癱澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅故眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風 七分 黃芪 二錢 甘草 炙一錢 蔓荊子 一錢  
當歸身 半錢 白芷 五分 升麻 柴胡 各五分

右以咀作一服水一鍾半煎一鍾時通口服忌風寒及食冷物

地黃湯 按粹方 治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風 羌活 黃芩 黃連 地黃  
當歸 人參 茯苓

右等分爲粗末水一鍾半煎八分食後臨臥通口服

四物龍膽湯 按粹方 治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 地黃 各伍錢

羌活 三錢 草龍膽 二錢 防風 三錢 防已 二錢

右以咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

○已上諸方散風熱兼補虛之劑

菊睛丸 和劑方 治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子 三兩 菴蓉 酒浸炒 甘菊花 四兩 巴戟天 去心 一兩

楊氏家藏方加五味子 三兩

右爲末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸食後溫酒塩湯下

加減駐景丸 簡易方 治肝腎氣虛兩眼昏暗視物不見  
車前子 炒一兩 熟地黃 洗 當歸身 各五錢 五味子  
枸杞子 各一兩 兔絲子 酒製 半斤 楮實子 無翳膜 則勿用

川椒 炒出火毒 各一兩

右為末 蜜糊丸如梧子大 每三十丸 溫酒鹽湯下 食前

養肝丸 治肝氣不足 眼目昏花 或生翳淚

當歸 酒浸 去芦 車前子 酒蒸 焙 防風 去芦 白芍藥

麩仁 另研 熟地黄 酒蒸 焙 川芎 楮實 各等分

右為末 煉蜜丸如梧子大 每服七十丸 熟水下 不拘時

生熟地黄丸 治血虛陰虛 眼目昏花

生芩 熟芩 玄參 金匱石斛 各一兩

右為末 煉蜜丸如梧子大 每服五十丸 空心服

東垣熟乾地黄丸 治血少神勞 腎虛 眼目昏黑

熟地黄 一兩 生地黄 一兩 柴胡 八錢 天門冬 五錢

甘草 炙 枳殼 地骨皮 黃連

五味子 各三錢 人參 二錢 當歸身 酒浸 焙乾 黃芩 各五錢

右為末 煉蜜丸如菉豆大 每服百丸 茶清下

○已上諸方補虛之劑

白龍散 御藥院方 去翳膜明眼目

用芒硝五兩 取真白如雪者 置鎊金銀鍋子內 以新瓦蓋 又用熟炭火 用一小磚 火內放先燒磚 熱然後下藥 在鍋 磚上四面有火 慢慢熬溶 良久 罈內有聲 先去頂上火 并 瓦鍋中 覷未沸 顯清明汁 以鉄錫罈 出鍋 傾藥汁 在別器 中 凝潔 如五色者 方好 研如極細 入龍腦 各等分 用點 退 下翳 或吹入鼻中 立有神効

黃連膏 宜明方治一切眼目赤肉攀睛風痒淚落不止

黃連 半斤 白丁香 五錢水一瓶淘淨去 攪細用

朴硝 一斗以水半瓶 淘淨去土陰乾

右取水入硝香盆內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁熬乾硝用猪羊膽和加蜜點之效矣

揆雲散秘方點眼中有翳雲膜遮障近日赤痛眼不可點

硃砂 去挾石 研細末 鵬砂 黃丹 水飛青塩

盆硝 各五錢 礪甘石 半斤煨七次入童子小便

輕粉 一錢 糝仁 六十箇去皮用白

右為極細末研無聲為度忌鷄魚一切辛熱之物

碧霞丹 宜明方點一切惡眼風赤者

龍腦 射香 硃砂 各二錢 沒藥 血竭

乳香 銅青 各一錢 鵬砂 二錢

右為末滴水和丸如梧子大每服一丸新汲水化開點之立效

揆雲膏 秘方

礪甘石 黃丹 一兩 川烏 七錢半 犀角

乳香 沒藥 硃砂 輕粉 各一錢

青塩 血竭 片腦 半錢 射香

糝仁 各七分半 當歸 二錢半 黃連 一兩 蜜 一斤

銅綠 各一錢 鷹條 二分半

右件脩合各如法研細用白沙蜜十五兩慢火初沸下黃  
丹三沸下礬甘石三沸下諸藥不粘手為度用磁盞內熱  
水泡開熱點不拘時

捲簾散 楊氏家藏方治久新痛眼昏澀難開翳膜遮睛或成  
胬肉或暴發赤腫疼痛並皆治之

礬甘石 四兩 碎 黃連 六錢 搥碎用水一碗 煮數沸除去前滓 朴硝 五錢 細研

已上先將礬甘石末入沙鍋內開口煨令外有霞色為度  
次將入黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢水飛  
過再候乾次入

自礬 二錢 一錢 生 膩粉 另研 一字 黃連末 半兩

青塩 膽礬 各七 丁香 另研 乳香 另研

鉛白霜 各一字 銅錢 七錢 硃砂 另研 一字

右為末同前件藥和合令勻每用少許點眼

○已上諸方點藥睛瘀肉之劑

黃連散 楊氏家藏方治肝受風熱眼眩赤爛

乳香 一錢 半 另研 黃連 去脂 半兩 荆芥 六百種 燈心 一百莖

右以咀每服二錢水二鍾煎一鍾瀝去渣熱洗

光明湯 秘方治一切暴眼

白礬 一字 銅綠 一錢 杏仁 甘草 各一錢

乾姜 三分 俱 各搥末

右件用生絹袋盛貯頓放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋  
定待冷臨臥洗之

洗眼湯 治暴赤眼

當歸尾 黃連 各一錢 赤芍藥 防風 各半錢

杏仁四箇去皮尖

右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時  
消毒散 御藥院方 治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消

大黃 生五錢 黃芩 黃柏 各一兩

右為末每用生蜜水調藥如糊攤在緋絹花子上隨目赤  
左右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤

五黃膏 御藥院方 治目赤

黃柏 一兩 黃連 黃芩 黃丹 大黃 各半兩

右為細末每一錢蜜水調成膏攤緋絹上隨左右眼赤貼

於太陽穴

赤眼方 秘方

鷄爪黃連 銅綠 半餅 大艾葉

右將黃連銅綠研末用淨水調膏攤於磁器盞內却將艾  
揉軟為丸燒艾炮黑盞內蒸乾用沸湯炮澄清以銀簪蘸  
藥點之

礪甘石散 海上方 治一切目疾不問得病之因悉治之

礪甘石 真者半斤黃連 四兩剉如豆大於礪石器中  
用水二碗煮二次揀去黃連取出甘石細研

片腦 二錢半 別研

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可

又方 海上方

礪甘石 半兩飛三次去沙石

礪砂

鵬砂 各一兩

白礬

腦子 各半

射香 少許

右為極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散 治眼赤腫疼痛不可忍

礬金 一錢半 盆硝

黃連 各一錢 雄黃

乳香

沒藥

片腦 各半錢

右為末鼻內搐少許點亦可

復明膏 秘方 點遠年近日雜患眼目昏花

黃連 一斤洗淨去鬚剉

當歸 半斤洗淨擘開股兒

柯子 三兩洗淨搥碎

黃柏 三兩去粗皮

右四味用臘水一大桶磁器內浸十五日入銅鍋內熬至

數十沸瀝去滓礪甘石半斤桑柴火煨七次用煎藥四味

汁蘸七次如鷄子黃色為用研極細末水飛過鵝梨二十

五箇搗爛用生絹袋瀝去滓黃丹半斤水飛過去為用蜜

二斤半水二升半葱一把熬水盡去滓猪胰子十五箇擇

淨脂油用捍草栲一大把同搗爛泥生絹袋瀝去滓再過

一次同煎藥汁下入銅鍋內煎熬欲成稀膏下後六味

青鹽

盆硝 各一兩

銅綠 研極細末

礪砂

鵬砂

熊膽 各五錢

右為極細末入鍋五熬一時欲成稠膏子下後四味

射香 三錢水研細

龍腦

輕粉

粉霜 各二錢研細

再熬從繁至慢漸漸微火熬成膏出鍋入磁器內盛放土

中埋一箇月去火毒可用已後若乾時却用乳汁化開點  
每百可點三五十筋若腫時歇一二日再點以効爲度二  
月九月脩合爲妙

珊瑚膏秘方治遠年近日不親光明一切雜患病眼五輪不  
損者並皆治之新患眼尅日見効每用皂角子一大塊冷  
水半鍾鷄子殼少許於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦  
得臨卧點用奇効不可具陳除內障氣眼不治

紫金膏秘方同珊瑚膏治証每遇病眼用藥如菜豆許點眼  
大角內點五七遍看病大小用此膏與珊瑚膏方並見  
龍膽膏秘方治暴赤眼腫痛癢難開怕日羞明迎風淚  
出視物昏花每用豆許點眼大角內少時連點數節大有

功效今具藥品于后

玄精石 一斤 桂府滑石 一斤俱爲細末

黃連

秦皮 切細 龍膽草 苦棟根

五味子 各用十兩

當歸 赤芍藥 大梔子

麩仁 搗碎

杏仁 各五兩 槐枝 二斤切

柳枝 二斤切

玄精石至五味子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半去  
滓將細生絹濾過磁器盛放又當歸至柳枝七味亦要用  
水二桶煎至一半去滓再將細生絹濾過亦用磁器盛放  
白冰蜜五斤先用少油擦鍋內慢火煉蜜紫色爲度將煎  
二次煎成藥水同煎數沸再用生絹濾過再熬至一半入  
銅鍋內下鵬砂五兩猪膽大者五箇慢火煎用鉄罐不住

手攪熟成稀膏除一斤於磁器內盛放一宿將上等片腦  
六錢研細入藥內攪勻用油紙封固一宿名爲片腦膏○  
下礶甘石六兩黃丹六兩用水飛過礶砂九錢攪塩九錢  
盆硝九錢銅綠九錢輕粉三錢粉霜二錢俱研細用水下  
碗用細生絹濾過盡入煎熟成三斤藥內將鉄罐不任手  
攪慢火再熬成稀膏又除一斤半用磁器內盛放經一宿  
再用上等片腦一錢射香二錢研細入藥內攪勻將油紙  
封固一宿名爲紫金膏○又以珊瑚半兩爲粗末用水下  
大碗煎數沸去滓不用入煎熬成稀膏半斤於內又下礶  
甘石二兩黃丹二兩用水飛過將鉄罐不任手攪煎成稠  
膏再下上等片腦一錢研細入藥內攪勻於磁器內盛放

名爲珊瑚膏

脩煉礶甘石黃丹之法

礶甘石不拘多少砂器盛頓水炭火煉通赤用黃連水  
蘸七次水飛淘澄爲泥用之

黃丹不拘多少以砂銚炒候紫色用水飛過淘澄爲泥  
用之

光明撥雲錠子 治遠年近日一切眼疾

礶甘石 一斤煨過用黃連半斤水二碗煎  
五七沸淬七次止取淨末二兩

礶砂 一兩 片腦 一錢 海螵蛸 二錢 射香 二分

珍珠 錢 血竭 三錢 乳香 沒藥 各一錢

右研極細以後黃連膏子和劑攪成錠子淨水磨化點

劑藥黃連膏子

黃連 半斤

龍膽草

當歸

芍藥

大黃

黃柏

黃芩

川芎

生地黄

白芷

防風

木賊

薄荷葉

羌活

紅花

菊花 各等分

右用水七八碗浸藥三日煎成膏子和劑煎藥成錠子

開光錠子

礪甘石

煨黃連水淬  
淨末二兩

硼砂 五錢

珍珠

片腦 各三分

牛黃 雄黃 各一錢

右為細末熬黃連膏為錠子磨點

春雪膏

於春天雪冷凍之時取明淨朴硝三四斤為末或不拘  
多少用黃連防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三箇各  
剉片與硝拌和入雪與硝一般多同拌勻為水過一宿  
瀝去黃連等藥却將硝雪水用瓦盆或銅盆盛之於露  
天淨處受霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用烏盆  
一箇以紙筋墊盆底內用厚皮紙盛砂於盆內紙筋上  
使砂中水氣盡滲於紙內候砂乾爽以磁器收貯封固  
如用每硝砂一錢加鵬砂半錢片腦三分研細點眼

○已上諸方點洗之劑

○廣按眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎  
經真水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也苟實

焉則散其風熱苟虛焉則滋其真陰苟虛實相仍則散風熱滋真陰兼之夫何眼疾之不瘳哉此內治之法也至於久而失調熱壅血凝而為翳睛膜肉翳膜赤爛之類不假點洗外治之法則何由而全愈乎蓋病情有標本治法有內外故也又嘗論之氣有餘便是火而散火在於破氣血不足則陰虛而滋陰在於補血也常使血能配氣水能制火則眼疾胡為而作也歟

耳聾 六十四

已集

丹溪心法

○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱之藥通聖散滾痰丸之類 大病後耳聾者須用四物湯降火 陰

虛火動耳聾者 亦用四物湯因鬱而聾者通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次後人諸藥通用酒炒 耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈用四物湯妙 耳鳴必用龍會丸食後服 氣實入棋柳丸或神芩丸下之 聾病必用龍會丸四物湯養陰 濕痰者神芩丸棋柳丸 耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌活服腦多射少濕加枯礬吹耳內開闔然亦是陰虛 戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子 四十九 棗肉 十箇

右入人乳汁搗成膏石上曝晒乾便丸如指大綿裹塞於耳中

又方

鼠膽汁滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆棹上尿出用綿漬之挽入青葱管中滴入耳中

附諸賢論

王節齋曰耳鳴證或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不效殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上焦素有

痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感憊怒而得怒氣上少陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故也其鳴不甚其人必多慾當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子 濟生方 治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流

犀角 鎊

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆 炒

甘菊花

去枝梗 各一兩

甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞半生姜五片煎七分溫服

清神散

治風氣壅上頭目不清耳常重

僵蚕

炒去絲嘴

乾菊花

各一兩

荆芥穗

羌活

木通

川芎

香附

防風

石菖蒲

甘草各三錢

右為末每服三錢食後臨臥茶清調下

復聰湯

姚方伯傳

治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏

陳皮去白

白茯苓去皮甘草炙

篇蓄

木通

瞿麥

黃柏去粗皮炒褐

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心臨臥各一服

涼膈散

治風熱上攻耳聾

見濕熱

通聖散

治風熱上攻耳聾

見班疹

滾痰丸

治熱痰濕痰耳聾

見痰類

神芎散

治濕熱濕痰耳聾

見火類

換柳丸

治濕熱濕痰耳聾

見病類

龍會丸

治肝火上升耳聾

見腦痛

和劑流氣飲

治氣閉耳聾

見氣滯

內加菖蒲生姜葱白同煎服凡治聾須開鬱行氣

六味地黃丸

治陰虛火動耳聾

見補損

內加知母黃柏菖蒲遠志

地黃丸

治勞損耳聾

熟地黃

當歸

川芎

辣桂

鬼絲子

川椒炒

故紙炒

白蒺藜炒

胡芦巴炒

杜仲炒

白芷

石菖蒲各二錢半

磁石火燒醋淬七次研飛一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧子大每五十九丸葱白酒下

磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛開鬱行氣散風去濕

磁石 三兩火煨醋淬七次用葱子一合水通三兩用

川芎 同煎一晝夜去葱子木通不用取淨二兩

肉桂 六錢半 熟地黄 二兩 石菖蒲 一兩

鹿茸 酒浸一宿炒 兔絲子 炒 黃芪 各一兩

肉桂 六錢半 熟地黄 二兩 石菖蒲 一兩

遠志 去心 大川烏 炮 木香 當歸

防風 茯苓 北細辛 山藥

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛研細好酒糊丸如梧子大每五十九丸空心溫酒下塩湯亦可

○廣按丹溪云耳聾皆屬於熱而已上一方又用辛熱之

藥不無使人疑議殊不知耳聾多屬痰火鬱結非磁石

之鎮墜川烏之流通與夫川椒細辛肉桂菖蒲之辛散

則老痰鬱火何由而開耳聾何由而愈哉雖然耳聾由

此而愈亦為劫劑後當以通聖散和之可也

○已上諸方內治之劑

一方 治耳聾久不聞者

紫磁石 一塊如豆大 山川甲 燒存性為末一字

右用新綿子裹塞於患耳內口中含些生鉄覺耳內如風

聲即愈

一方 用耳遂末吹入左耳甘草末吹入右耳立効

一方 治耳痛及聾

附錄心法

用巴豆十四粒研爛以鵝脂半兩鑿化利巴豆末為入如小豆大以綿裹塞耳中

耳鳴方

草烏燒 石菖蒲

右等分為末用綿裹塞耳中下日二度

耳鳴暴聾方

川椒 石菖蒲 松脂各二錢半 山豆肉半錢

右為末浴蠟丸如棗核大塞入耳

聾耳方 治風熱搏之津液結靨成核塞耳

生豬脂 地龍 盆下墨等分

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿裹入耳令潤即挑

出

紅綿散 治貯耳有膿及黃水

海鱧鮓 枯礬各一錢 射香一字 乾胭脂五分

右為末用管吹入耳中

一方

用五倍子焙乾一兩全鷓三錢燒存性為細末吹入耳中

一方

用枯白礬一錢胭脂一字射香少許研細以綿杖子先輾去耳中膿水即用別纏杖子送藥入耳中一方加龍骨

亦佳

一方 治耳內膿出或黃汁

石膏新瓦上煨 明礬枯 黃丹炒 真麝粉

龍骨各等分 射香少許

右為末，綿纏竹筒，拭耳，換綿蘸藥入耳。

一方治耳作膿者。

用耳遂一塊如棗核大，以綿裹塞耳中，以甘草口中徐徐嚼下。

耳爛 用貝母研末乾摻。

治百虫入耳。

一方用香油灌入耳即出。

一方用雞冠血滴入耳即出。

一方鹽牛乳食灌入耳即出。

治一切虫物入耳。

用竹管入耳門，口氣盡力吸出，最妙。

一方治凍耳。

用橄欖核燒灰清油調敷，雀腦亦可。

○已上諸方外治之法。

○廣按丹溪云耳聾皆屬於熱，誠哉斯言。然有左耳聾者，有右耳聾者，有左右耳俱聾者，不可不分經而治也。夫左耳聾者，少陽火也；龍會九玉之右耳聾者，太陽之火也；六味地黃丸玉之左右耳俱聾者，陽明之火也；通聖散滾痰丸玉之何以言之，有所忿怒過度則動少陽膽火，從左起故使左耳聾也；有所色慾過度則動太陽膀

丹溪心法卷之十一  
鼻病 六十五  
肺相火從右起故使右耳聾也。有所醇酒厚味過食則動陽明胃火從中起故使左右耳俱聾也。蓋左耳聾者婦人多有之以其多忿怒故也。右耳聾者男子多有之以其多色慾故也。左右耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也。總三者而論之忿怒致耳聾者為多丹溪云厥陰少陽火多當用開痰散風熱其此之謂乎

鼻病 六十五

丹溪心法

○酒瘡鼻是血熱入肺 治法用四物湯加陳皮  
紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論中於上藥有茯苓生姜氣弱者加黃芪

又方

用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熱傳之 一云用桐油入天吊藤燒油熟調黃連末拌傳之

又

用山施末蜜蠟丸彈子大空心嚼下丸白湯下

治鼻中瘰癧 胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶礬 二錢 細辛 一錢 白芷 半錢

右為末內鼻中

治鼻淵

南星 半夏 蒼朮 白芷  
神麩 酒芥 辛夷 荆芥 各等分

右末水調食後服

附諸賢論

王節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或畧感風寒便塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用鮮表通利辛溫之藥不効殊不知此是肺經素有火邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥喻化或末蒸輕調緩服久服無不效矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風塞而致窒塞聲重或流清涕者自作風寒治

附諸方

菖蒲散 御藥院方 治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角 等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子 桔梗 桑白皮 紫苑

荆芥穗 甘草 生二兩

右以咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服

羌活散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞 見傷風

仙朮芍散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞 見風熱

川芎石膏湯 治腦有鬱熱遇寒鼻塞 見中風

○已上數方治鼻塞之劑

倉耳散 三日方治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛荑仁 半兩 蒼耳子 炒二錢半 香白芷 一兩 薄荷葉 半錢

右為末每服二錢葱茶清食後調下

辛荑散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或

氣息不通或不聞香臭

川芎 木通 去節 防風 去芦 甘草 辛荑仁

細辛 洗去土 藁本 升麻 香白芷 各等分

右為末每服三錢茶清調下

防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必衄血

防風 二兩 黃芩 人參 甘草 炙

川芎 麥門冬 去心 各一兩

右為末每服二錢沸湯調食後服

已上數方治鼻淵之劑

船紅散 治風熱上攻面鼻生紫赤刺癢珍俗呼肺風

船紅 硫黃 白礬 枯 各半兩

右為末黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液塗之  
臨卧再塗兼服升麻湯下瀉青丸以除病根也

奇方升麻湯

熟半夏 茯苓 白芷 當歸 各二錢

蒼朮 乾葛 桔梗 升麻 各一兩

熟枳殼 乾姜 各半 大黃 蒸半 芍藥 七錢

附錄心法對症藥方

四九

陳皮

甘草 各一兩半

右以咀每服五錢生姜燈心水煎食前服

瀉青丸 見中風

白龍丸 治酒瘡鼻并滿面紫赤酒刺

川芎 藜蘆 細辛 白芷 甘草 等分

右為末每四兩入煨石膏末一斤水丸逐日用此丸末洗面如凍豆法更審少時方用湯洗去

又方

用黃柏苦參栝榔等分為末傅以豬脂調尤妙

又方

用青黛槐花杏仁研傅之

又方

用杏仁研乳汁傅之

○已上數方治酒瘡鼻之劑

白黃散 簡易方 治鼻齕瘰癧肉鼻痔等症

雄黃 白礬 細辛 瓜子 各等分

右為末插入鼻中

辛荑膏 御藥院方 治鼻生瘰癧肉壅塞不通有時疼痛

辛荑葉 二兩 細辛 木香 木通

白芷 杏仁 湯炮去皮尖 研各五錢用

右將羊髓豬脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦射香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即

丹溪心法附錄卷之

四十一

愈

鬱金散 治鼻中生瘰癧

用鬱金猪牙皂角各一两一味水浸一宿火煮透鬱金為度去皂角不用以鬱金焙乾再用北細辛半兩射香硃砂各一錢同為末煉蜜丸如茶子大每服一丸食後細嚼茶湯嚥下

輕黃散 治鼻中瘰癧

雌黃半兩 射香少許 輕粉 杏仁湯炮去皮尖大仁各一錢  
右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒盒定每有患者不問深淺夜卧用筋頭點粳米大糲鼻中隔夜一二次半月效

又方

用狗骨燒灰加硃砂少許每用搗鼻中瘰癧自化

又方

以胡荽搗爛塞鼻中一夕自然落出

又方

用白礬燒為末面脂和綿裹塞鼻中數日瘰癧隨藥落

又方

用雄黃一塊如棗塞鼻中過十餘日瘰癧自落

○已上數方治瘰癧之劑

口舌

六十六

已集

丹溪心法

丹溪心法附錄卷之二

口舌

○口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛且不能食相火衝上無  
制用理中湯人參白朮甘草補土之虛乾姜散火之標甚則  
加附子或噲管桂亦妙 一方生白礬爲末貼之極效或噲  
良久以水漱之再噲 一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐  
飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傅之 又方黃連好酒煮呷  
下立愈 又方遠志醋研鵝毛掃患處出涎  
入方

細辛 黃柏 炒等分一云黃連

右爲末貼之或搽舌上吐涎水如再傅須旋含之若合下  
既久無效  
治滿口白爛

草撥爲末一兩 厚黃柏一兩

右用稻火灸爲末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白湯漱  
口則愈

附諸方

立効散 端効方 治唇緊瘡疼痛

訶子肉 五倍子

右爲末乾貼唇上立効

赴逆散 端効方 治赤白口瘡

黃柏 青黛 蜜陀僧

右爲末乾貼瘡

栝柳散 應驗方 治口瘡疼痛大有神効

五倍子三錢 寒水石煨兩 蒲黃 黃丹三錢半

右為末每服少許乾貼瘡上

龍石散和劑方治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽嗌腫塞  
疼痛妨悶每用少許搽貼患處嚙津小兒瘡疹毒氣攻口  
齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥搽貼立效

硃砂一錢半 研用 寒水石煨通赤三錢二分半 生腦子二錢半研

右為末每自三五次用夜卧搽貼妙

清金散端効方治大人小兒白口瘡急惡狀似木耳

五倍子去土四錢 青黛四錢

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡爛用竹管吹入喉中有  
津吐出

燕金散三四方治熱毒生瘡於五

細辛 黃連各等分

右為末先以布帛蘸水揩淨患處搽藥於上涎出即愈  
赴筵散潛察方治口瘡疼痛

五味子嫩者一兩 滑石半兩 研 黃柏半兩 蜜炒

右為末每服半錢乾搽瘡上良久便可飲食

治口瘡張子和方

白礬一兩 枯至半兩 黃丹一兩 煨火紅放少

右為末搽於瘡上即愈

一方 治蠶蜋

用黃柏一兩去粗皮以五倍子二錢蜜陀僧甘草各少許

三味為末水調敷在黃柏上灸三五次藥末盡為度後將黃柏切作片子臨臥時貼於患處天明則愈

一方 治爛疔瘡

用橄欖燒灰存性為末先用米泔水洗淨後摻上藥

一方 治舌腫

用百草霜為末以好醋調敷立效

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索一兩 黃柏 黃連各半兩 蜜陀僧三錢

青黛二錢

右為末傅貼口內有津即止

○已上諸方治標之劑

升麻散 消生方 治上膈癰毒口舌生瘡咽喉腫痛

甘草 生用 伍錢 升麻 赤芍藥 人參

桔梗 乾葛 各一兩

右吹咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

瀉黃散 消生方 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼 去白炒 黃芩

防風 半夏 湯洗 石斛 各一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑參 天門冬 麥門冬 去心 各炒一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裹化嚥津

增損如聖散 治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗二兩 甘草炙一兩半 防風半兩 枳殼製二錢半 黃芩一兩  
右為末每服三錢水煎食後服

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌証中治標之劑毛靜而治本之劑稍更置於火類風熱類之中選而用之

牙齒 六十七

丹溪心法

○牙痛梧桐淚為末少加射香擦之 牙大痛必用胡椒葉擦能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以辛涼荆芥薄荷細辛之類 又方用清涼藥便便痛小關必須從治草擦川芎

薄荷荆芥細辛樟腦青塩

治牙痛甚者

防風 羌活 青塩合同 細辛 草擦 川椒

右為末擦喻

又方

南星為末霜梅五箇取其引涎以荆芥薄荷散風熱青塩入腎入骨擦喻

又方

藜公英 燒灰 香附末 白芷 青塩

右為末擦喻

治陰虛牙出鮮血氣鬱

丹溪心法

五十三

用四物湯加牛膝香附生甘草側柏

蛀牙

蘆薈白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛

太黃香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦牙上

固齒

用羊脰骨燒存性二錢當歸白芷猪牙皂角青鹽各一錢

為末擦牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩升麻一兩黃連半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落世人皆作腎虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏粱其滑之物以致濕熱上攻則牙床不清而為腫為痛或出血或生虫由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜瀉陽明之濕熱則牙床清寧而齒自然安固矣

附諸方

血竭散 應驗 牢牙定痛治牙齒根在後連膻骨疼痛久而不愈者

愈者

血竭

石膽

乳香

五靈脂

蜜陀僧各等分

右研令勻每用一字以指蘸貼牙病處候少時荆芥湯漱

立効散 御藥 治牙疼不可忍

百草霜 細研 倉藍 一錢 射香 淨研 乳香 研細各半錢

右件一處再研勻每用少許口噙溫水隨牙疼一邊鼻內搽之無時尤妙

一方

用蒼耳草細辛芫花小麥川椒各等分剉碎水煎時時噙漱吐去藥不可嚥下 又細辛芫花二味擦漱尤妙

青龍散 御藥院方 治陽經風熱齒斷腫痛

香白芷 川芎 益硝 細辛 各半兩

青黛 三錢 薄荷葉 二錢

右為末以稍蘸藥擦牙腫處吐津誤嚥不妨

宣牙膏 御藥院方 治齒牙動搖不牢疼痛不止斷肉出血

射香 一字 龍骨 定粉 另研各二錢半

右二味為細末後入射香勻用黃蠟一兩磁盞內鎔開入藥於內攪勻於冷取出熨斗燒鋪紙內蒸攤之勻薄每用剪作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之此半月消牙齒腫忽生斷肉治疳蝕去風邪牢牙齒大有神効

梧桐淚散 御藥院方 治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚 川芎 細辛 白芷 各半錢

生地黄 一錢 青鹽 二分 寒水石 燒熟二錢

右件同為細末每用塗貼患處吐涎慎嚥不妨無時且五

七次

露蜂房散 御藥院方 治牙齒疼痛經驗神効

露蜂房 炒黃 細辛 各二錢半 大戟 七錢半 防風 一錢一分半

右咬咀每五錢水一鍾煎七分去滓熱漱冷吐無時

消毒散 御藥院方 治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚吞蛾 五倍子 蜜陀僧 各一錢

右爲細末每用少許乾薄瘡上有津吐出

開關散 應驗方 治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎 薄荷 盆硝 白芷

全蝎 各一錢 僵蚕 天麻 各半錢 細辛 一錢

右爲末每用少許以指蘸藥滿口擦牙齒斷喘半時用溫

水漱吐

太和散 御藥 治牙齒動搖斷肉浮腫虫腫發痛

梧桐淚 白茯苓 生地黄 各半錢 川芎 香白芷

升麻 各三錢 華陰細辛 三錢 青蘊 一分 射香 半分

牙皂 燒存性二分

右爲末青蘊射香另研拌勻每用藥少許指蘸藥擦牙病處常麻去疳生牙定疼止痛

消風定痛散 應驗 治牙齒疼痛風熱攻注斷肉腫悶

荆芥 四錢 白芷 防風 細辛 全蝎

升麻 川芎 各二錢 膽礬 二分 朴硝 青黛 各八分

右爲末每用一指蘸藥擦於牙上噙半時有津吐出

趕筵散 和劑方 治風牙虫牙攻痺疼痛不可忍者

良姜 去芦 草烏 去皮 細辛 去土 葉荊芥 去梗各等分

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久

用鹽湯灌漱其痛即止用腐炭末一半根常使擦牙

細辛散 和劑方 治風虫牙疼或牙齦宜爛眼額浮腫皆治

荊芥 去梗 縮砂 半兩 細辛 二兩 川椒 去目 白芷 二兩

鶴虱 牙皂 萹揆 各半 草烏 一兩

右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用煎湯

湯

丁香散 御藥 治牙齒疼痛

丁香 萹揆 蝎稍 大椒 各等分 擦法同前

定痛散 御藥院方 治牙風疼痛立効

細辛 生半兩 草烏 生一兩 全蝎 半兩 乳香 二錢

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須更以鹽湯灌漱

即止

雄黃定痛膏 楊氏家藏方 治牙齒疼痛

盆硝 三錢 雄黃 一錢 別研 細辛 二錢 大蒜 二枝 牙皂 四錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧子每用一丸將綿子

裹塞左邊牙痛放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛

止取出藥丸可治數人亦皆治之

一方 治一切牙痛

川升麻 當歸 川鬱金 細辛

萹揆 白芷 荆芥 各等分

右為末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許指在牙痛處以溫荆芥湯灌漱立効

一方 治牙疼

鶴虱 細辛 白芷 茸松 各等分

右為末拭牙上或煎湯噲漱立効

一方 治風牙疼

防風 麻黃 生地黄 各一兩 芫花

蜂窩 各五錢 花椒 三錢 浮麥 一把

右為粗末入葱白三根同水煎熱漱不可嚙下

一方 淨治虫牙疼不可忍者

用漢椒為末以巴豆一粒研成膏飯丸如蚌孔大綿裹安於蚌孔內立効

萹揆散 治風腫牙疼

萹揆 二錢 蝎稍 良姜 各一錢 草烏 五分 去皮尖

右為末以指蘸藥擦於患處

一方 取疼牙落不犯手

草烏 萹揆 各半兩 川椒 細辛 各一兩

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上諸方外散治標之劑

獨活散 御藥院方 清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻

注牙齒斷因虛浮宜露腿下動搖發痛又治偏頭痛漸漸

攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可具述

川芎 獨活 羌活 防風 各一錢 六分半

細辛 七分 薄荷 生地黄 荆芥 各一錢

右粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進三兩服愈

上清防風散 御藥院方 治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙

齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭目昏眩並皆治之

防風 細辛 去苗葉薄荷葉 各二錢 川芎 一錢 錢半

獨活 去頭天麻 荆芥穗 甘草 炙

白檀 白芷 各一錢 片腦 一分五釐 二分半

右同為細末入腦子再研以細每服二錢淡茶清調勻稍

熱漱冷吐不拘時如覺頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調三錢食後服

甘露飲子 御藥院方 治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶

宜露心中多煩飢不欲食嗜臥及咽喉中有瘡並皆治之

黃芩 天門冬 枇杷葉 甘草

枳殼 麥門冬 生乾地黄 山茵陳

石斛 熟地黄 各等分

右為粗末每服五錢水一大鍾煎至七分去滓溫服食後

若齒斷宜露腫悶煎藥熱漱之極驗

敗毒散 御藥院方 治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛 五分 薄荷葉 一錢 地骨皮 五錢 荆芥穗 三錢 半

右為粗末每服七錢水二鍾煎至一鍾去滓溫飲冷吐煎

服尤妙

地骨皮散 應驗 治牙齒虛熱氣毒攻衝斷肉腫痛口舌生瘡

此藥如神

柴胡 四錢 地骨皮 三錢 薄荷 二錢

右咬咀作一服水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎服

愈好

升麻散 御藥院方 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風寒

防風 去苗 當歸 升麻 各二錢 藁本 去首土

甘草 白芷 細辛 芫荽 各一錢

木香 半分

右件搗羅為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水一鍾

煎五錢煎至七沸去滓熱漱冷吐秋冬牙痛用此煎服解

散最妙

地黃散 御藥院方 治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宜露

生地黄 半一錢 防風 細辛 薄荷葉 地骨皮

藁本 各一錢 茵草葉 當歸 荆芥穗 各半錢

右同為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微熱漱口

冷吐之煎服尤妙

玉池散 御藥院方 治牙痛或動搖不牢

地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛

川芎 槐花 當歸 去蘆 藁本 去土 甘草 生各一錢

右爲粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓溫熱漱口冷  
則吐之煎服在妙 張龍圖去地骨皮加獨活治牙流膿  
血變骨痛風者及骨已出者俱效

已上諸方內消治本之劑宜於火類風熱類選用

血竭散 應驗 治牙疳并惡瘡不差如神

寒水石 燒熟四兩 細研 龍骨 一兩 蒲黃 二兩 血竭 五錢

枯白礬 一兩

右爲末每用少許貼在瘡口上紙封貼

續連散 應驗 治牙齒再齧口生瘡立效

寒水石 燒熟一兩 細研 蒲黃 五錢 黃丹 五錢

右爲末每用少許乾貼瘡上噙多時吐出

味調勻并研每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐  
出

土蒺藜散

御藥院方

治牙齒疼痛斷腫搖動常用擦漱固齒

土蒺藜

去角生用不以多少

右爲粗末每服五錢淡漿水半碗煎至七八沸去滓入鹽  
末一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋單方  
之藥取效急速兼神仙秘旨云若人服蒺藜一年已後冬  
不寒夏不熱服之二年老若復少髮白復黑齒落重生服  
之三年輕身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其驗亦  
同

沉香白牙散

御藥院方

揩齒瑩淨令白及治口臭

沉香 射香 各五分 細辛 升麻

藁本 藿香葉 甘松 白芷 各一錢 二分半

石膏 一兩 寒水石 一兩

右為末 每日早晚揩牙

齒藥方 二因 西嶽蓮花峯神傳

猪牙皂角及生姜 西國升麻熟地黄

木律旱連槐角子 細辛荷帶要相當

青鹽等分同燒毀 研細將來使最良

揩齒牢牙髭髮黑 誰知世上有仙方

右用新瓦罐盛藥合口以麻縛定鹽泥固濟日乾穿一地  
穴先放新磚後故藥以罐口向下用炭火燒令青烟出稍

一方 治走馬牙疳

黃栢 藜芦 石膏 銅青 膽礬

射香 少許 龍骨 病急多用 病輕少用

右以火焙存性為末每用五分擦於患處

一方 治牙疳

青黛 三錢 銅綠 晉礬 黃栢 藜芦

枯礬 人言 用紅棗十枚去核各分入內以火煨作灰用 芒硝 各二錢

射香 半錢 輕粉 四十 黃連 二錢

右為末後入輕粉射香研勻少許擦患處

五倍子 炒焦 一兩 銅青 明礬 各一兩 射香 少許

右研末先以鹽醋湯洗患處拭乾摻藥於上

已上諸方治疳之劑

固齒茯苓散 應驗 生牙固齒固密不生疳疾

龍骨 寒水石 燒熟 升麻 香白芷

茯苓 各一兩 細辛 青鹽 各三錢 石膏 四兩

射香 半錢 石燕子 大者半對火 燒醋淬七次

右為末每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

白牙散 御藥院方 治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香 白芷 青鹽 升麻 各二錢

石膏 細末 一兩 細辛 一錢 射香 半錢 另研 砂鍋 細末 一兩

右除砂鍋膏香三味外五味同為細末加上前三味共入

存性去火經宿取為末每用擦牙溫水漱法 一方早連作黃連

一方 固齒烏髭髮

母丁香 沉香 各半兩 石燕子 醋淬七次

龍骨 一錢 海馬 酥炒 茴香 一兩 生地黄 三兩

射香 二錢 青鹽 半兩

右為末每用一撮空心擦牙縫噙片時溫水漱去 應驗 漱牙藥去風止痛

薄荷 菴活 二錢 大黃 一錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐之噤亦無妨

○以上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之証其人腸胃素有濕熱上出於牙齦之間

丹溪心法附餘卷之十二  
適被風寒或冷飲所鬱則濕熱不得外達故作痛也其  
病情有標本之分所用藥有溫涼之異何則牙痛之証  
寒是標故外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱熱是本故  
內服餌之藥宜辛涼以散熱清中如此則內外交攻標  
本兩治其病豈有不愈者乎

丹溪心法附餘卷之十二終

