

丹溪心法附餘


卷 十 二

婦人門上

經病

崩漏

帶下



丹溪心法附餘卷之二十

婦人門上

經病九十二

丹溪心法

○婦人經水過期血少也四物加參朮帶痰加南星半夏陳皮之類 經水不及期而來者血熱也四物加黃連 過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過期淡色來者痰多也二陳加川芎當歸 過期而來是血虛宜補血用四物加黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是氣血俱熱宜涼氣血柴胡黃芩當歸白芍生苳香附之屬 經不調而血水淡白宜補氣血參芪芎歸香附白芍腹痛加膠珠艾葉玄

胡索 經候過而作痛者乃虛中有熱所以作疼 經水將
 來作疼者血實也 一云氣滯四物加桃仁黃連香附 臨行
 時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血宜四物加紅花桃仁莪朮玄
 胡索香附木香發熱加黃芩柴胡 紫色成塊者熱也四物
 加黃連柴胡之類 痰多占往血海地位因而下多者目必
 漸昏肥人如此用南星蒼朮川芎香附作九子服之 肥人
 不及日數而多者痰多血虛有熱亦用前九藥中更加黃連
 白朮丸服 血枯經閉者四物加桃仁紅花驅脂滿經閉者
 以導痰湯加黃連川芎不可服地黃泥膈故也如用以姜汁
 炒 肥胖飲食過度之人而經水不調者乃是濕痰宜蒼朮
 半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸臨經來時肚痛者四物

湯加陳皮玄胡索牡丹甘草痛甚者豆淋酒痛緩者薑黃煮
 蒺仁炒條芩末爲丸 經水去多不能往者以三補丸加蒺
 根龜板金毛狗脊 陰虛經脈久不通小便澀身軀疼痛四
 物加蒼朮牛膝陳皮生甘草又用蒼朮丸加蒼朮酒芍藥爲
 丸就煎前藥吞下

入方 治經水過多

- 黃芩 炒 白芍 炒 龜板 炙各 黃柏 炒三
- 椿根白皮 七錢半 香附子 二錢 一兩

右爲末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十九
 又方 治積痰傷經不行夜則妄語

- 瓜蒌子 兩 黃連 半兩 吳茱萸 十粒 桃仁 五十

紅麴二錢 砂仁三兩 麻相木

右為末，生姜汁化，炊餅為丸，梧子大，服一百丸，空心。

又方 治一切瘀血為痛

香附四兩 醋煮 尾蠟子煨二兩 醋煮一夜

桃仁二兩 牡丹皮 川芎 紅花各半 兩

右為末，蒸餅丸，如梧子大，空心溫酒下，三五丸。

導痰湯 見痰類

三補丸 見補損

蒼莎丸 見咳嗽

附諸方

月經不調

加減四物湯 治衝任虛損，月水不調，臍腹痛。

當歸 川芎 芍藥 熟苳 等分

右以水煎服，加減干後。

若經候微少，漸漸不通，手足煩疼，漸瘦，生潮熱，脈微數，本

方去地黃、川芎，加澤蘭葉二倍，甘草半份。經候過多，本

方去熟苳，加生苳，或只加黃芩、白朮。經行身熱，脈數，頭

昏，本方加柴胡、芍藥。經行數少，或脹或痛，四肢疼痛，加延

胡沒藥、白芷，與本方等，淡醋湯調下。末子。經候不調，心

腹疝痛，只用芍藥二味，名君臣散。氣沖經脈，故月事頻

併，臍下多痛，加芍藥。經欲行，臍腹絞痛，加玄胡、枳、郎苦

練炒木香、減半。經水澁少，加葵、花、紅、花。經水適來，適

斷或有往來寒熱先宜服小柴胡湯後以四物和之經
 後過而作痛血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之
 大溫經湯和劑方治衝任虛損月候不調或來多不止或過
 期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹急痛
 五心煩熱

阿膠 碎炒 芎藭 當歸 去芦 人參 去芦

肉桂 去皮 甘草 炒 芍藥 牡丹皮 各二兩

半夏 二兩半 吳茱萸 二兩各湯洗七次 麥門冬 去心五兩半

右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹 和劑方治婦人血海虛冷久無孕育及
 數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸証

秦艽 二兩 京墨 煨醋淬糯米炒一斗川芎 一兩半

熟地黃 酒蒸四兩 茯苓 去皮三兩 人參 去芦二兩 石斛 去根酒浸二兩

蒼朮 米泔浸去粗皮八兩 香附 炒去毛四兩 木香 炮一兩

藁本 去芦一兩 當歸 去芦酒浸一兩五錢 肉桂 去粗皮一兩半

乾姜 炮一兩 山藥 七錢 澤蘭葉 四兩 川椒 去目炒七錢半

細辛 去苗葉一兩半 桔梗 炒二兩 桃仁 去皮尖一兩炒 大豆黃卷 炒半斤

甘草 炙二兩 蚕布 燒灰二兩 牡丹皮 一兩

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒
 醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子亦可

交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生芩 一斤 老生姜 一斤 玄胡索 當歸

川芎

白芍藥 各二兩

沒藥

木香 各一兩

桃仁

去皮 尖 各一兩半

香附子 半斤

右將生地黄生薑各搗汁以生薑汁浸地黄粗地黄汁浸生薑粗皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處日乾同為末醋糊凡如梧桐子大空心服五十九丸姜湯下
內灸散 和劑方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或疑積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉

丁香皮

熟乾地黄 洗 肉桂 去皮 各一兩半

甘草炙

當歸 洗 去芦

白朮

山藥

白芷 各兩

茴香 一兩 半

藁木 去芦

乾姜 炮

川芎

黃芪 去苗 各一兩

木香 一兩

陳皮 去白 四兩

白芍藥 一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心熱服
溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生薑煎

活血散 御藥院方 治衝任經虛經事不調不以多少前後並皆治之

當歸

川芎

白芍藥

玄胡索 各四兩

肉桂 去皮 一兩

右咬咀每四錢水一盞煎至七分食後熱服
溫經湯 大全良方 治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

義木 各半兩

人參

甘草

牛膝 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸 澹寮方 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹

頭暈惡心筋漏帶下便血癥瘕並宜服之

大香附 砂盆擦去皮以米醋浸半日用瓦銚慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子日乾每服五十丸淡醋湯下

一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前法治証一

同名艾附丸

如聖丹 聖惠方 治婦人經不調赤白帶下

枯礬 四兩 蛇床子 二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中用

熱極再換

增損四物湯 宣明方 治月經不調心腹疼痛補血藏溫經注顏

川芎 芍藥 當歸 熟地黄 白朮

牡丹皮 各五錢 地骨皮 一兩

右以咀每服五錢水一盞煎至一盞去滓通白服食前

丹參散 大千方

治婦人經脉不調或前或後或多或少產前

胎不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰脊痛骨節

煩疼

丹參 去荒下以多少

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前冷熱勞無時

桃仁散 大千方 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來

狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行動月水

或前或後或月水不來至身沉重惟欲眠多思酸物

桃仁 甘草 半夏 各一兩 赤芍藥 生地黄 各二兩

澤蘭 牛膝 當歸 桂心 牡丹皮

人參 蒲黃 川芎 各一兩

右吹咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分空心服

四製醋附丸 喘竹堂方 治婦人女子經候不調

香附子 去毛一斤 作四分

一分好酒浸七日 一分小便浸七日

一分塩水浸七日 一分米醋浸七日 各焙乾

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心食前塩酒

送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓 各一兩

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子

開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黄丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟苧 各半兩

牡丹皮 玄胡 各二錢半 人參 黃芪 各一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米湯送下

○廣按月信趨前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜用

溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可

便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此證便須審

其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼
痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者
只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘
草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自
行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃
無病果有血塊凝結方宜行血通經

紅花當歸散 和劑方治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不
來或積癥塊腰腹刺痛肢躄瘦弱

- 劉寄奴草五兩 當歸去芦 牛膝酒浸各一兩 肉桂去芦
- 紅花各一兩半 白芷各一兩半 甘草炙二兩 赤芍藥一兩
- 紫葳即凌霄花 蘇木各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉滯煎紅花酒調

通經丸 濟生方治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

- 川椒炒去汗 蓬朮炒去烟 乾漆炒去烟 當歸去芦
- 青皮去白 乾姜炒 大黃炒 桃仁炒
- 紅花 桂心各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑臼中杵
之丸如梧桐子陰乾每服五十丸醋湯溫酒空心下

千金桃仁煎 簡易方治婦人血積癥瘕月水不行等疾
桃仁去皮尖 朴硝 大黃各二兩 蜜虫半兩炒
右和勻以酸醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以

桃仁大黃虫末入內不住手撓度可圓時却下朴硝更
不住撓良久出再丸如梧桐子五更初溫酒下五丸至日
午取下如赤豆汁鷄肝蝦蟆各樣以盡為度

六合湯 濟生方 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂 去皮 熟地黃 酒洗

川芎 蓬朮 炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散 澹寮方 治婦人月水不行發熱腹脹

當歸 酒浸 凌香花 劉寄奴 官桂 去皮

紅花 酒浸俱煎蒸 牡丹皮 酒洗 川白芷

赤芍藥 延胡索 各等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

玉燭散 張子和方

四物湯 承氣湯 朴硝 各等分 水煎 食前服 四物湯見補損 承氣湯見傷寒

三和湯 張子和方

四物湯 涼膈散 當歸 各中 停水煎服 涼膈散 見溫熱

一方 治室女月經不通

紫葳 一兩 乾漆 炒二錢半 芍藥 蓬朮 當歸 稍 各半

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝 六錢 大黃 細辛 桃仁 去皮尖雙 仁伍錢砂

川芎

當歸

水蛭三錢 糯米炒

右為末煉蜜丸梧子大每服二十丸空心酒下
通經散聖惠方治室女月水不通

椎魚屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神效

導經丸聖惠方治婦人經閉不通脘腹連腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

甘草炒

官桂

桃仁炒一兩

大黃二兩

血竭二錢 半

紅花少許

地膽二十箇 去翅足

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫酒下量虛實
加減服之

溫經湯大全良方若經道不行透膺寒喘痛徹其脉沉緊此

由寒氣客於血室血凝不行又為氣所衝新氣與故血相
搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬莪朮各半兩

人參

甘草

牛膝

右改咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣食前溫服

桂枝桃仁湯大全良方

官桂

芍藥

生地黄各二兩

甘草一兩

桃仁去皮尖 五十箇

右改咀每服一兩姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去
滓溫服

當歸散大全良方治血脉不通

當歸

川山甲灰焙

蒲黃

炒各五錢

辰砂一錢 麝香少許

右為末研停每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散 經驗方 治心膈迷悶腹臍撮痛氣急痞塞月信不通

等疾

烏藥二兩 當歸 蓬莪朮各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生冷

油膩等物產後諸疾用炒姜湯調下

萬病丸 拔萃方 治女人月經淋閉月候不來遠膈寒疝痛徹

及產後血氣不調腹中生瘕結而不散等疾

乾漆 并碎炒令烟盡頂 牛膝 去苗酒浸一宿

右為細末用生地黄汁一升入煎二味於銀石器內慢火

熬候可丸如梧桐子大每服二九空心米飲或溫酒下

通經散 楊氏方 治衝任不調經脈閉塞久而不通漸成堅瘦

服尋常通經藥不効者正宜服之

斑蝥 去翅足炒 蜚虫 水蛭 去炒黑各四十枚 杜牛膝 半兩

當歸 紅花 各三錢 滑石 半錢

右為細末每服一錢用桃仁七箇研細末溫酒調下食前服

廣按此方善能通經然月候不通有血滯者有血枯者

此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶求干

金於乞丐也

瑞金散 大全良方 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐

疼痛

片姜黃 四兩

當歸

牡丹皮

紅花

赤芍藥

蓬萊木

川芎

延胡索

官桂 各一兩半

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分今煎溫服

一方 治經候閉寒赤治乾血氣

斑猫 二十箇 糯米炒

桃仁 五十箇 炒

大黃 鋪文者 半兩

右為細末酒糊丸如梧子大空心溫酒服五丸甚者十丸如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏 治乾血氣

用錦文大黃酒浸乾四兩為末以好醋一升熬成膏丸如鷄彈大每服一丸熟酒化開待溫臨臥服大便利一二行紅脈自下此藥調經水之仙藥也又方加香附艾

千金散 治經候不通

篇蓄

瞿麥 各四錢

栝柳

麥蘖

小茴香 各三錢

大黃 鋪文者 六錢

右為細末每服三錢臨臥溫酒調下

○經病疼痛

大烏金丸 治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育不崩崩中帶下五心煩熱口苦咽乾飲食無味身疼羸瘦面

目痿黃手足酸軟經水不勻臍腹脹痛髮黃落喜欲倦
 起產後惡血上行心腹刺痛敗血不正及子宮一切惡疾
 大艾葉 當歸 醋炒 破故紙 炒 茴香 炒
 熟地黄 醋炒 南木香 不見火 吳茱萸 三稜
 莪朮 各二 川芎 醋炒 芍藥 醋炒 各
 延胡索 一兩 紫荊皮 醋炒 四兩
 右先將艾二兩香附六兩米醋一升浸一日一夜冬月三
 晝夜煮乾炒令赤黑色入夜十二味同為末米醋煮糯米
 糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心溫酒湯任下日
 二服如崩漏下血不止加棕灰一兩綿灰五錢蒲黃炒一
 兩百草霜七錢

玄胡索湯 濟生方治婦人室女七情所感血氣相併心腹疼
 痛或連腰脇甚作搐搦但是一切血氣經候不調皆治有
 效

當歸 去芦

蒲黃

玄胡索

赤芍藥

片子姜黃

官桂

不見火

乳香

木香

不見火

甘草 一錢

沒藥 三錢

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服吐
 逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散 濟生方治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆攻
 心眩暈不省並皆治之

劉寄奴 去梗

牡丹皮 去皮

熟地黄

酒浸

玄胡索

炒去

烏藥

赤芍藥

蓬莪朮

京三稜

當歸

去芦

官桂

不見火

一方有菊花蒲黃

炒各一兩

右煎五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆

爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心溫酒送下

三神丸 濟生方治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調

橘紅

二兩

玄胡索

去皮

當歸

去芦酒浸

右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心艾醋

湯下

當歸煎丸 大全良方治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦乏力

月候不調

當歸

三兩別研末

栝柳

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索

各一兩

右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子每服二十九溫酒下

姜黃散 大全良方治血脈久冷月水不調臍腹刺痛

片姜黃

四兩

蓬莪朮

紅花

官桂

川芎

各一兩

玄胡索

牡丹皮

當歸

各二兩

白芍藥

三兩

右以咀每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓通口服

食煎

蠲痛散 大全良方治婦人血氣刺痛

荔枝核

燒存性

香附子

炒一兩

右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可

牡丹散 救急方治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川黃連炒各一兩 赤茯苓 生地黄

桃仁 當歸 官桂 赤芍藥

白朮 石膏去皮 木香各半兩

右以咀，每服一兩水二盞，生姜三片煎至一盞，去滓，通口

食前服

牛膝散按萃方 治婦人月水不利，臍腹疼痛

牛膝一兩 官桂 赤芍藥 桃仁 玄胡索

當歸 牡丹皮 川芎 木香各七錢半

右為細末，每服三錢，溫酒調下，食前

替灸丸秘方 治婦人久冷赤白帶下，肚腹疼痛，經脈不通，面

色痿黃，脚手疼痛，四肢無力，久無子息，此藥常服，溫中暖

臍，調經有子，服藥未盡，即時有效

茯苓 艾葉各八片 香附子 當歸各四兩

吳茱萸炒三兩 川芎 白芍藥各二兩

右用酸醋五升，沙鍋煮藥乾，為末，醋糊丸，如梧桐子，每服

五十九丸，空心午前日二服用，淡醋湯送下

大延胡索散宜明方 治婦人經病疼痛，并產後腹痛，或腹滿

喘悶，或癥瘕癖塊，及一切心腹暴痛，平心胃急痛，尤宜服

之

玄胡索 當歸 赤芍藥 京三稜煨

川練子去核 蓬朮煨 官桂去皮 厚朴製

木香 川芎各二錢半 桔梗 黃芩

州
大黃各五

甘草一兩

栝柳二錢

右為末每服三錢水一盞煎六分去滓熱服食前日三服

如惡物多去大黃官桂加黃藥子染塊子龍骨各三錢

延胡索散大全良方治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索

當歸

川芎

官桂各七

木香

枳殼

赤芍藥

桃仁各五

熟地黄一兩

右咬咀每服八錢水一盞生姜三片煎至八分去滓通口食前服

當歸散大全良方治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力不能食

當歸

酒炒

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

玄胡索

右等分為末熱酒調下二錢不拘時候

失笑散和劑方治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

五靈脂

蒲黃各等分

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七分熱服

異方濟陰丹秘方治婦人內有血積經水不調腰腹疼痛

香附子

三稜

莪朮

陳皮去白

青皮

敗姜各一

右黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋打糊

官桂

當歸

赤芍藥

白芍藥

生地黄

熟地黄

澤瀉

片姜黃

牡丹皮

乾姜

川芎

劉寄奴

澤蘭

人參

蒲黃

細炒木香

白朮

玄胡索

右各一两焙乾與前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸炒姜酒下艾醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯下或酒下

○經病發熱

逍遙散

和劑方

治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草

炙半兩

當歸

去芦炒

茯苓

去皮

芍藥

白朮

柴胡

去苗各一兩

右吹咀每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎至七分

溫服

人參荆芥散

和劑方

治婦人血風發熱身躄疼痛頭昏目澁

煩渴盜汗或月水不調臍腹疼痛痲痺塊硬等症

赤芍藥

五兩

柴胡

去苗七兩半

牡丹皮

五兩

荆芥穗

鱉甲

醋浸去裙炙黃

羚羊角

酸棗仁

枳殼

去穰炒

生乾地黄

人參

白朮

肉桂

去皮各七錢半

防風

去芦當歸

芎藭

甘草

各五兩

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘時

油煎散和劑方治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澁

五加皮

牡丹皮

赤芍藥

當歸

去芦各一兩

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入煎項藥
同煎七分煎不得撻喫不得吹常服此藥能肥婦人
滋血湯和劑方治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為
浮腫肌躰發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 荆芥穗各四兩 牡丹皮 一兩 赤芍藥

枳殼去白 麸炒 肉桂 去皮 當歸去芦 炒 川芎各二兩

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一箇煎服以經調為度

牡丹散和劑方治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌躰
羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥 延胡索炒

沒藥別研 陳皮去白 各一兩 真蓬莪朮 鬼箭各二錢半

紅花 當歸去芦 各二兩 乾漆炒 半兩 蘇木二兩 半

甘草 烏藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時

加味四物湯 治衝任虛損月水不行肌膚發熱如瘵狀

當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩 柴胡半兩

黃芩二錢 半

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯潘際方治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩和勻生姜五片煎八分溫

服四物湯見前 參蘇湯見月寒

麥煎散聖惠方治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心曾

煩壅

鑿甲 醋炙

大黃 煨

常山

赤茯苓

柴胡

白芍藥

當歸

乾漆 炒烟

生地黄

石膏 各一兩

甘草 半兩

右以咀每服一兩水一鍾小麥五十粒煎至一鍾去滓溫服食前有虛汗加麻黃根一兩治骨蒸熱黃瘦口臭肌熱盜汗

黃芪散 大全良方 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不

欲飲食

人參

黃芩

當歸 各七錢半

柴胡 一兩半

黃芪

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥 各一兩 甘草 二錢

右以咀每服一兩水一鍾生姜五片煎至一鍾食前服

麥門冬散 大全良方 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬

前胡

赤茯苓 各一兩

羚羊角

赤芍藥

桑白皮

黃芪 各七錢半

生地黄

甘草 各五錢

右以咀每服一兩水一鍾生姜三片煎一鍾通口服

犀角散 按萃方 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草 各五錢

柴胡

黃芪 一兩半

麥門冬

人參

枳殼

赤茯苓 各七錢半

右以咀每服五錢水一鍾生姜三片煎至一鍾去滓通口

服不拘時候一方有生地黄七錢半

地骨皮散 大全良方 治婦人血風氣躄虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮 各一兩 桑白皮 枳殼

前胡 黃芩 各七錢半 雪白茯苓 五加皮

人參 甘草 官桂 白芍藥 各五錢

右咳嗽每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾通口服

柴胡散 大全良方 治婦人寒熱躄瘦肢節疼痛口乾心煩不

欲飲食

北柴胡 黃芩 赤茯苓 白朮 各一兩

人參 地骨皮 枳殼 制 生地黄

桔梗 桑白皮 赤芍藥 各七錢半 鱉甲 醋炙 二兩

麥門冬 三兩 甘草 五錢

右咳嗽每服一兩水二鍾生姜三片煎至七分溫服

小柴胡湯 大全良方 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有

時經水道斷此為熱入血室其血必結故如癰狀

柴胡 八錢 半夏 二錢 人參 甘草 黃芩

生地黄 各三錢 麥門冬 二錢

右咳嗽每服八錢水一鍾半姜五片棗二枚煎至八分去

滓溫服

柴胡飲子 宜明方 治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草 當歸

芍藥 大黃各

喘嗽者加半夏桔梗五味子各五分

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾去渣溫服食後

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱脈沉而芤

川芎 熟地黄 當歸 芍藥各一兩半

柴胡八錢 人參 黃芩 甘草

半夏各三錢

右每服一兩水一盞半生姜三片煎八分溫服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之中有兼發痛者有兼發熱者此分而為四也然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退後者則

趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也調其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱治之有道也歟抑嘗論之氣行血行氣止血止故治血病以行氣為先香附之類是也熱

則流通寒則凝結故治血病以熱藥為佐肉桂之類是也

崩漏 九十三

辛集

丹溪心法

○血崩東垣有治法但不言熱其主在寒學者宜尋思之急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者用棕櫚灰後用四物湯加炒乾姜調理因勞者用參芪帶升補藥因寒者用乾姜因熱者用黃芩崩過多者先用五靈脂末一服宜分寒熱蓋五靈脂能行能止紫色成塊者熱以四物湯加黃連之類婦人血崩用香附白芷丸服氣虛血虛者皆以四物湯加參芪漏下乃熱而虛四物湯加黃連崩

中白帶用椒目末又用白芷石灰炒去灰為末茜草少許粥丸服一方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服一方五靈脂半生半炒為末酒調服經血逆行或血腥或吐血或唾血用韭汁服效夫婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛故也二脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適經下依時若勞傷過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜當大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣

附諸方

膠艾湯 和劑方 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斲

及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠炒 芎藭 甘草炙各二兩 艾葉炒各二兩

熟乾地黄 白芍藥各四兩 當歸去芦炒二兩

右咬咀每服三錢水一盞酒半鍾煎至八分空心熱服

伏龍肝散和劑方治血氣勞傷衝任脈虛經血非時注下或

如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛經久不止

川芎三兩 肉桂去皮五錢 當歸去芦炒 乾姜炮各七錢半

赤石脂一兩 艾葉炒三兩 熟地黄 甘草炙半兩

麥門冬一兩 伏龍肝一兩即竈心土

右咬咀每服四錢水一鍾棗二枚煎七分食前溫服

神仙聚寶丹 和劑方治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散

積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶下並

宜服之

沒藥 琥珀各別研一兩 辰砂別研一錢 木香煨末一錢

乳香別研二錢半 當歸洗焙取末一兩 射香別研一兩

右研細合勻滴木為丸每一兩作十五丸每服一丸溫酒

磨下如一切難產及產後敗血衝心惡露未盡並入童子

小便

艾煎丸 治崩傷淋瀝不已小腹滿痛常服益榮調經

食茱萸湯洗各七錢半 熱地黄 白芍藥各一兩半

一石菖蒲炒 川芎 人參 熟艾四兩熟米飲調作餅焙

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九酒飲任下

鎮宮丸 濟生方 治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或狀

若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈目眩

代赭石 紫石英 煨醋 禹餘糧 煨醋 淬

川芎 陽起石 炒紅 鹿茸 火去毛 蒲黃 炒

香附子 醋煮各 當歸 去芦酒浸 各一兩

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十九
空心米飲下

哲子仁湯 濟生方 治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂

致筋中下血不止

鹿茸 火去毛 酒蒸焙 栝子仁 炒各 芎藭 一兩

香附子 炒去毛 二兩

當歸 一兩

茸草 火去半 兩

川續斷 一兩 半

茯神 去木 一兩

小草 一兩

阿膠 一兩 炒 成珠

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分空心溫服

一方 治婦人血崩屢驗

當歸 白芍藥 棕櫚 乾姜

右等分各燒存性為末醋湯調以有節朱筋左攪四十九

轉食前服

一方 治月水不止

用阿膠炒粘為末用好酒空心調服艾湯亦可

一方

艾葉如鷄子大 阿膠半兩 乾姜一錢

右為粗末用水五鍾先煮艾姜後入膠洋消分作二服空心

鹿茸丸 大全良方治衝任虛損以致經候過多又為風冷所

乘尺脉微細甚者可灸關元百壯

鹿茸火去毛 赤石脂 禹餘糧各一兩 艾葉 栢葉

附子炮去皮臍 熟地黄洗焙 當歸酒浸

續斷各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九丸空心温酒下

廣按此方用附子的係虛寒者方可然崩症多屬虛熱其虛寒者容或有之或當老年崩久與夫寒冷所乘不

可一藥作虛熱論也

○已上數方補虛温寒之劑

凉血地黄湯按萃方 治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守包絡相火故血走而崩也

生地黄 當歸各五分 黃連 黃蘗 知母

藁本 川芎 升麻各二分 柴胡 羌活

防風各三錢 黃芩 甘草炙 細辛 荆芥

蔓荊子各一分 紅花少許

咬咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

金華散簡易方 治婦人經血得熱崩漏不止

延胡索 當歸 瞿麥 牡丹皮 葳靈仙各七錢半

乾葛 五錢 蒲黃 五錢

石膏 二兩 桂心 三分

右為末，每服二錢水一鍾，姜三片煎七分，食前溫服。

黃芩湯 簡易方 治崩中下血，今人多用止血補血之藥，少能

見効，此是陽乘陰，則經水沸溢，宜清之為愈。

黃芩研為細末，燒秤麴酒調下三錢，食前服。

一方 治婦人血崩不止

槐花 一兩 棕毛灰 五錢

右為末，水二鍾，鹽少許煎至七分，去滓溫服。

如神散 聖惠方 治婦人血崩不止，赤白帶下。

香附子 赤芍藥

右等分為末，鹽一掬，水二鍾煎至一鍾，去滓，食前溫服。

當歸龍骨丸 宣明方 治月事失常，經水過多及帶下淋瀝，無

問久新赤白諸証，并產後惡物不止，或孕婦胎動不安，疼

痛漏下，及大人小兒下痢，並宜服之。

當歸 芍藥 黃連 染槐子 艾葉 炒

茯苓 各五錢 龍骨 黃柏 各一兩 木香 二錢半

右為末，滴水丸如小豆，大每服五十丸，食前米飲送下。

解毒四物湯 治婦人經脈不往，或如豆汁，五色相雜，面色

痿黃，臍腹刺痛，寒熱往來，崩漏不止，並宜服之。

黃連 黃柏 黃芩 山梔子 當歸

川芎 白芍藥 熟地黄 各一錢

用水二鍾煎至一鍾，去滓，食前溫服。

栢黃散 永類錄方 療經血不止

黃芩 一兩 一錢半

當歸

栢葉

蒲黃 各一兩

生姜 半兩

艾葉

二錢五分 生地黄 六兩 伏龍肝 二兩

右以咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

芩心丸 瑞竹 治婦人四十九歲已後天突當往每月却行或

過多不止

黃芩

新枝條者二兩重以米醋浸七月乾又浸又炙如此七次

右為末醋糊丸如梧子大每服七十丸空心溫酒下月三

服

黃蘘子散 宣明方 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體困

倦不美飲食

黃蘘子

當歸

芍藥

生地黄

人參

白朮

知母

石膏 各一錢

川芎

桔梗

甘草

紫苑

柴胡

槐花子

各二分半

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前

小蘇湯 治崩中不止

小蘇莖葉

研取汁

生芩汁一盞

白朮 半兩

右三件入水一鍾煎溫服

奇效四物湯 聖惠方 治血崩

四物湯

艾葉

阿膠 炒

黃芩

右等分水二盞生姜三片煎至一鍾去滓空心食前溫服

○廣按此方與膠艾湯少異但膠艾湯純於補虛而此方
補虛中又兼退熱也崩証虛而有熱者用此方與黃蔡
子散最當

○已上數方涼血清熱之劑

如聖散 經驗方治婦人血崩

棕櫚

烏梅 各一兩

乾姜 半兩

並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅湯酒空心調下久患三服愈

十灰丸 濟生方治崩中下血不止

黃絹灰

馬尾灰

鷄節灰

艾葉灰

蒲黃灰

蓮蓬灰

油髮灰

棕櫚灰

赤松皮灰

綿灰 各等分

右為末用醋煮糯米丸如梧桐子每服一百丸米飲下

荆芥散 大金良方治婦人崩中連日不止

用荆芥穗以燈盞多著燈心好麻油點燈就上燒荆芥

色為末每服三錢童子小便調下

獨聖散 大金良方治婦人血崩不止

用防風去芦義隨多少為末酒煮麵清調下二錢空心

日二服更以麩作糊酒投之極驗

當歸散 聖惠方治婦人血崩不止

當歸

龍骨 燒赤

香附子 各一兩

棕毛灰 五錢

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩猪魚鷄等物

一方 大金良方

用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方 大全良方

用棕櫚燒存性為末湯泡酒令淡調下三錢空心服

一方 大全良方

用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

必効散

保真集方治婦人月水經不調及崩漏不止

棕皮 燒

木賊 去節燒灰有

射香 一錢

右為末酒調二錢空心服

備金散 治婦人血崩不止

香附子 四兩

當歸 二錢

五靈脂 一兩

右為細末每服五錢空心淡醋湯調下立効

蓮蓬散

經血不止

用蓮蓬燒灰存性為細末每服二錢調下

一方 治血崩

當歸

乾姜

烏梅

青木綿

棕櫚 各等分

右並燒灰存性為末燒秤錘滓酒空心調服日三次

○已上數方止血住崩之劑

○廣按血屬陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋今之七情過極則動五志之火五志之火尤甚則經血暴下失期而來久而不止謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次愈初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其流而不澄其源

則滄天之勢不能退若止澄其源而不復其舊則孤子
之陽無以立故本末勿遺前後罔紊方可言治也

帶下 九十四

辛集

丹溪心法

帶下 赤屬血 白屬氣 主治燥濕為先 漏與帶俱
是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜升提甚者上亦
用吐以提其氣下用一陳湯加蒼朮白朮仍用丸子一本作
瓦龍子
又云赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分 肥人多濕
痰海石半長南星炒栝蒼朮川芎椿皮 一方無椿皮有青
黛 瘦人白帶少如有者多熱以炒黃栝滑石椿皮川芎海
石如無海石以蛤粉亦可 一方有青黛作丸子服 赤白

帶下炒黃荆子為末酒調下二錢或米湯亦可 又治心癢
羅先生法或十棗湯或神佑丸或玉燭散皆可服實者可行
虛者不可峻攻 血虛者加減四物湯 氣虛者參朮陳皮
間與之 濕勝者用固腸丸 相火動者於諸藥中少加黃
栝 滑者加龍骨赤石脂 滯者加葵花葵花白者治白
帶赤者治赤帶 性
燥者加黃連 痰氣帶下者蒼朮香附滑石蛤粉半長茯苓
丸服寒月少加乾姜臨穰應變必須斷厚味
入方

良姜

芍藥

黃栝

各二錢俱
炒成灰

椿白皮

一兩
半

右為末粥丸梧子大每服四五十九空心

一方 一婦人白帶兼風痛

半夏 茯苓 川芎 陳皮 甘草
蒼朮 黃柏酒炒 南星 牛膝酒洗

右為末水煎服愈

又方 治婦人上有頭風鼻涕下有白帶
南星 蒼朮 栝皮炒 滑石 半夏

川芎 辛荑 牡蠣粉炒 酒芥

右咳嗽水煎去粗食煎服

又方 治白帶

龜板炙 枳子各二兩 黃柏炒一兩 白芍藥七錢半
杏附半兩 乾姜炒二錢半 山茱萸 苦參
椿根皮各半兩 貝母

右為末酒糊丸梧桐子大空心米湯下五十丸

又方 治赤白帶下或時腹痛

龜板酒炙 黃柏炒一兩 乾姜炒一錢 枳子二錢半
右為末酒糊丸梧子大每服七十丸日服二次

又方 治婦人有孕白帶

蒼朮三錢 白芷二錢 黃連炒二錢 黃芩炒三錢
黃柏炒一錢半 白芍二錢半 椿根皮炒二錢半 山茱萸二錢半

右為末糊丸空心溫酒下五十丸

治結痰白帶 先以小胃丹半飢半飽津液下數丸候積
開却宜服補藥

白朮二兩 黃芩半兩 紅白葵花二錢半 白芍七錢半

右為末蒸餅丸空心煎四物湯三五十九

固腸丸 治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾

用此以燥其濕亦不可單用須看病作湯使

椿根白皮 性涼而燥 酒炒用

右為末酒糊丸服

又方 椿根皮 四兩 滑石 二兩

右為末煎丸梧子大空心湯下二百丸

又方 治白帶因七情所傷而脈數者

黃連 炒

匾栢 酒蒸

黃栢 炒各半兩

香附 醋炒

白芍

白朮 各一兩

椿根皮 炒二兩

白芷 燒存性 三錢

右為末煎丸梧桐子大每服七十丸食前煎米飲下

又方 治赤白帶濕勝而下者

蒼朮 炒 鹽

白芍

滑石 炒各一兩

甘草 各三錢

枳殼 炒

椿根皮 炒一兩

乾姜 炮二錢

地榆 兩

右為末粥丸空心米飲下一百丸

附諸方

補宮丸 楊氏方

治婦人諸虛不足久不妊娠骨地白羸崩中

帶下並宜服之

鹿角霜

白茯苓

香白芷

白朮

烏賊魚骨

白薇

白芍藥

牡蠣 煨

山藥 各等分

右為末麩糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲送下

內金鹿茸丸 楊氏方 治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁

晝夜無度，脬脹疼痛，腰膝無力。

黃芪 雞內金 牡蠣 鹿茸 遠志

肉蓯蓉 五味子 龍骨 附子 桑螵蛸各等分

右為末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服五十九丸，溫酒飲，任下。

當歸煎濟生方 治婦人赤白帶下，腹內疼痛，不欲飲食，日漸羸瘦。

當歸去芦酒浸 赤芍藥 牡蠣火煨 熟芋酒浸

阿膠 白芍藥 續斷酒浸各一兩 地榆半兩

右為末，醋糊丸，如梧桐子大，每服五十九丸，空心米飲下。

卷栢丸濟生方 治婦人室女腹臟冷熱相攻，心腹疼痛，赤白帶下，面色痿黃，四肢羸乏。

黃芪一兩 生地黃洗一兩 鹿茸 卷栢醋炙

白石脂煨醋淬 赤石脂各七次 川芎 鱉甲醋炙

艾葉 伐赭石醋煨七次 桑寄生 當歸去芦酒浸炒

地榆各一兩 木香不見火 龍骨各半兩 乾姜七錢

右為末，醋煮糯米糊丸，如梧桐子，每服七十九丸，空心米飲下。

威喜丸 和劑方 治婦人血海久冷，白帶白濁，白淫下部常濕，小便如米泔，或無子息。

白茯苓去皮四兩 黃蠟一錢 猪苓二錢半

右取茯苓為末，溶蠟丸，彈子大，空心細嚼，滿口生津，徐徐

用猪苓日乾不 磁器內煮二十余沸出

右取茯苓為末，溶蠟丸，彈子大，空心細嚼，滿口生津，徐徐

用猪苓日乾不 磁器內煮二十余沸出

右取茯苓為末，溶蠟丸，彈子大，空心細嚼，滿口生津，徐徐

用猪苓日乾不 磁器內煮二十余沸出

右取茯苓為末，溶蠟丸，彈子大，空心細嚼，滿口生津，徐徐

用猪苓日乾不 磁器內煮二十余沸出

右取茯苓為末，溶蠟丸，彈子大，空心細嚼，滿口生津，徐徐

燕服忌米醋及使性氣

白芷散 大全良方 治婦人赤白帶下

白芷 一兩 海螵蛸 二箇 胎髮 一箇

右為末空心酒調服二錢

麝香丸 御藥院方 治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷久

無子息

零陵香 各二錢 藿香 各二錢 蛇床子 五錢 吳茱萸

枯礬 各三錢 木香 各三錢 射香 二分 丁香

詔腦 半錢 不灰木 白芷 二錢 龍骨 五錢

右為末煉蜜為丸每兩作四十九丸每用一丸綿裹納陰中

大效拱辰丸 秘方 治婦人血海虛冷白帶時下臍腹刺痛久

服令人延年精神充實多子嗣

琥珀 二錢 當歸 酒浸 沉香 木香

官桂 各不 人參 黃芪 鹿茸 酥炙

乳香 各一兩 沒藥 各一兩 酸棗仁 半兩 鹿角霜

乾姜 延胡索 栝子仁 各半兩

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸溫酒化下空心

暖宮妙應丸 秘方 治婦人赤白帶下

艾葉 龍骨 當歸 川芎 牡蠣

白芍藥 牡丹皮 茯苓 赤石脂 熟地黃

右等分為末麵糊丸如梧桐子大每服五十丸空心艾醋

湯下

艾煎丸 經驗方治婦人諸疾腹痛赤白帶下

香附子淨 艾葉各一兩 蔓荊子 神曲

枳殼去穢 當歸各二兩 吳茱萸 蓬莪朮各一兩

右用醋一大椀慢火煮香附艾葉以醋盡為度揀去艾葉入糯米糊稔作餅子日乾同前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲下醋湯亦可

○已上數方辛溫去濕寒之劑

戴人王燭散

當歸 芍藥 川芎 熟苧 大黃

甘草

右咬咀生姜三斤煎服

十棗湯 見脇痛類

神佑丸 見中濕類

○已上三方苦寒除濕熱之劑

○廣按婦人赤白帶下之症多是怒氣傷肝夫肝屬木脾屬土肝邪乘脾木氣剋土則脾受傷而有濕濕而生熱熱則流通所以滑濁之物滲入膀胱從小便而出也古人作濕寒而用辛溫之藥治之者非而丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者是矣雖然古人曾用辛溫之藥治之而愈者殊不知用苦寒之藥是正治之法也用辛溫之藥是從治之法也蓋濕熱怫鬱於內肚腹疼痛赤白帶下非辛溫之藥從治而能開散之乎然濕熱未嘗怫

5
5301

丹溪心法附餘卷之二十終

丹溪心法附餘卷之二十終
鬱但止赤白帶下而無腹痛之症不若用苦寒之藥並
治之為當也

