

丹溪心法附餘

卷一十二

婦人門下


產前

產後

子嗣

諸病

補虛
斷子法



丹溪心法附錄卷之二十一

婦人門

產前 九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血。產婦因火動胎逆上作喘急者急用
 條芩香附之類為末調下條芩水中取沉者為佳。墮胎乃
 氣虛血虛血熱。黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行
 益母草即茺蔚子治產前產後諸病能行血養血難產可煎
 作膏地黃膏牛膝膏皆可用。懷妊愛物乃一臟之虛假如
 肝臟虛其肝氣止能生胎无餘用也又云不能榮其肝肝虛
 故愛酸物。產前安胎白朮黃芩為妙藥也條芩安胎聖藥

也俗人不知以為害而不敢用反為溫熱之藥所養胎殊不知產前宜清熱令血循經而不妄行故能養胎胎熱將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服抑熱以三補丸用地黄膏丸有孕八九箇月必用順氣瀉用枳殼紫蘇梗凡妊婦脈細勻易產大浮緩火氣散難產生產如抱船過堤一般

入方 固胎
 地黃半錢 歸身 人參 白芍各一錢 白朮一錢
 川芎五分 陳皮一錢 黃芩半錢 甘草三分 黃連少許
 黃柏少許 桑上牛兒藤七葉圓者 一本死苓
 右咬咀每二錢入糯米二十粒煎服 血虛不安者用阿

膠痛者用 砂仁 止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩長一兩春秋七錢半冬五錢 白朮二兩不見火 茯苓七錢不見火
 陳皮三兩

右為末粥丸服

達生散 又名東胎散

大腹皮三錢 人參 陳皮各半錢 白朮 芍藥各一錢
 紫蘇莖葉半錢 甘草炙二錢 歸身尾一錢

石作一服入青葱五葉黃楊腦七箇此即黃楊樹葉稍兒也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月服十數貼甚得力夏月加黃芩冬不必加春加川芎或有別証以

意消息于后

○氣虛加參朮 氣實倍香附陳皮 血虛倍當歸加地黃 形實倍紫蘇 性急加黃連 有熱加黃芩 濕痰加滑石半夏 食積加山楂 食後易飢倍楊黃膠 有痰加半夏 脹痛加木香桂

又方 第九箇月服

黃芩

一兩酒炒不宜涼 藥性弱者減半

白朮

一兩

枳殼

炒七錢半

滑石

七錢半 臨月十日前 小便多者減此下末

右為末 粥丸梧子大 每服五十丸 空心熱湯下 多則恐損元氣 氣實人宜服

又方 安胎

白朮

黃芩

炒麩

右為末 粥丸服 一本云用條芩一二兩為末 每一錢或半錢 濃煎白朮湯調下 每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治

多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕 惡心阻其飲食者是也 肥者有痰 瘦者有熱 須用二陳湯

入方

白朮

不以 參少

右為末 水丸 隨所好 或湯或水下

○子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山施子

炒用一合

右為末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮 五兩

茯苓 四兩

當歸

芍藥 各二兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去滓空心服

○胎漏 氣虛 血虛 血熱 可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲 治妊娠轉胞

四物湯加

人參

白朮

半棗制

陳皮

甘草

右吹咀入生姜煎空心服

治胎動不自己有所見

艾葉

阿膠

當歸

川芎

各二兩

甘草

一兩

右每服五錢水煎次下膠令洋湯

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月時服野天麻熬膏白湯調下油蜜小便和極勻治難產

○入方

砂仁

香附 醋煮

枳殼

甘草

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草末

催生

白芷灰

百草霜

滑石

右為末用芎歸煎湯調下或姜汁服

天麻丸 易產

天麻

則益母草六月間連根採陰乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時溫酒或白湯化一丸能除產後百病

附諸賢論

王節齋曰婦人半產多在二箇月五箇及七箇月除跌撲損傷不拘外若前次三箇月而墮則下次必如期後然蓋元於此時受傷故後至期必應棄其虛也遇有半產者產後

須多服養氣血因胎元之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇半月後即服且胎藥十數服以防三月之墮至四箇半月後再服八九服防過五月又至六箇半月後再服五七服以防七月及至九箇月內服丹溪達生散十數服可保無虞其有連墮數次胎元損甚者服藥須多久則可以留方用四物湯加入參白朮陳皮茯苓甘草阿膠艾葉條芩多氣加香附縮砂有痰加姜製半夏調理姙娠在於清熱養血條實黃芩為安胎聖藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃譬猶鍾懸於梁梁軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因氣腦致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多加縮砂少佐木香以行氣

附脉理

脉訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉實
在左浮大在右右女左男可以預剖離經六至沉細而滑
陣痛連腰胎即時脫血痕弦急而大者生虛小弱者即是
死形半產漏下革脉主之弱即血耗立見頽危

附諸方

驗胎方 經脉不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下一錢覺腹內微動
則有胎也否則非經滯

胎動不安

安胎散 濟生方 治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣

腹痛下血 以不拘多少於熨斗內炒令熟却去皮研為

細末每服二錢熱酒調服艾葉湯亦可

川芎散 簡易方 治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹臍

疼痛

南川芎為末每服二錢溫酒調下

佛手散 大全良方 治妊婦胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸 去芦 酒浸 各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

膠艾湯 損動胎下血腹痛

艾葉 阿膠

右二味水煎服

膠艾湯 濟生方 治妊娠或因類化胎動不安腰腹疼痛

熟地黄 洗 艾葉 炒 白芍藥 川芎

黃芪 去芦 阿膠 蛤粉炒 當歸 去芦 甘草 炙各

右以咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚同煎去滓空心

溫服

杜仲丸 濟生方 治妊娠三兩月胎動不安防其欲墮預宜服

之

杜仲 去皮剉姜汁炒去絲 川續斷 酒浸各

右為末棗肉煑爛杵和為丸如梧桐子大每服三十九水

飲下

安胎當歸湯 大全良方 療妊娠五月舉動驚悸胎動不安下

墜小腹痛引腰脇小便疼痛下血

當歸 阿膠 川芎 人參 各一兩 棗子 二枚 艾 一虎

右細切酒水各三升合煮至二升內膠令烱分二服腹中

當安小便當煖也 一方有甘草無參棗

旋覆花湯 大全良方 療妊娠六七月間胎不安常處亦名阻

病

旋覆花 一兩 厚朴 白木 枳殼 黃芩

茯苓 各三兩 半夏 炒一兩 芍藥 生姜 各二兩

右以咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去渣溫服食前忌

肉腸醋桃李雀肉

芍藥湯 大全良方 治妊娠八月中風寒有所犯觸身身盡疼

仁寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米泔或青黃寒懷腰背冷痛回日視茫茫

芍藥 一兩 參 當歸 甘草 各二兩 白朮 一兩

厚朴 二兩 薤白 升切一 生姜 兩切四

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等物

二香散 聖惠方 療妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐

酸水起坐重宜服

香附子 一兩 藿香葉 甘草 各二錢

右為細末每服二錢塩沸湯調下

當歸湯 大全良方 治妊娠胎動盪心煩躁悶絕口乾橫生倒

產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安飲

當歸 人參 各一兩半 阿膠 一兩 甘草 二兩

右以咀每服八錢水一鍾半連根葱白一握煎至八分去

滓溫服 一方無甘草有川芎厚朴產保方有川芎

阿膠散 大全良方 治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓 白朮 川芎 各七錢半 阿膠 炒七錢半 當歸 炒

陳皮 各一兩 甘草 二錢 生姜 三片 棗 二枚

右以咀每服八錢水一鍾半煎至八分食前溫服

龍骨散 大全良方 因蒸損胎下惡血不止

龍骨 當歸 地黃 各八分 艾葉 炒四分 地榆

阿膠 芍藥 乾姜 各六分 蒲黃 五分 牛角鯁 炙焦三分

右為未食前米飲調一錢服

當歸散 大全良方 療妊娠被驚惱胎血下不安小腹痛連腰

下血

當歸

川芎

各八分

阿膠

炒

人參

各六分

艾葉

四分

大棗

二枚

茯苓

十分

右以咀每服八錢生姜二片水一鍾半煎至八分去滓食

煎溫服

方 治胎動出血產門痛

用黃連為末酒調一錢日二服

立聖散 胎動不安下血不止

用雞肝二具好酒一斤煮熟共酒食之大効

金匱當歸散

妊娠宜常服之

當歸

川芎

白芍

黃芩

各一兩

白朮

半兩

右五味為末酒飲調服方寸七且二次 或用酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸茶湯任下空心食前服日三次此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有妊娠則碍脾運化遲而生濕濕而生熱古人用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕黃芩清熱故也况妊娠賴血以養此方又加當歸川芎白芍以補血尤為備也服此劑之後尤為易產所生男女無無胎毒則痘疹稀少無病易育而聰明智慧不假言矣

此端本澄源之事也累試累驗

安胎飲 永類錄方 治懷胎三四月至九月惡阻病者心中潰

悶頭重目昏眩四肢沉重懈惰不歡動作惡聞食氣欲吐
臍酸睡多少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腹腸疼
痛或時下血及姙娠一切病疾並皆治之

甘草 炙 茯苓 去芦 當歸 去芦 川芎 熟芩 酒蒸

白朮 去苗 白芍藥 湯泡 半夏 七次 阿膠 蛤粉炒

地榆 等分

右以咀每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分去滓溫服
不拘時候 一方無半夏地榆有人參桑寄生 一方無
白朮黃芪半夏地榆有艾是膠艾湯加白茯苓

安胎和氣飲 濟生方 治胎冷腹脹痛乳兩脇小便頻數大便

虛滑

訶子 去核麩 白朮 各一兩 陳皮 去白 高良姜 炒 木香 不見

陳米 炒 甘草 各半兩

右以咀每服四錢水一鍾姜五片煎服忌食生冷之物

大聖散 濟生方 治姙娠恡悸睡裏多驚腹脇膨脹坐臥不安

白茯苓 去皮 川芎 麥門冬 去心 當歸 去芦酒浸

黃芪 去芦 木香 不見 人參 甘草 炙各半兩

右以咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去滓溫服

芩翳補中湯 濟生方 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月

而隨

乾姜炮五錢 阿膠蛤粉炒 芎藭

五味子各一兩

黃芪去芦蜜炙 當歸去芦酒浸 白朮

赤芍藥各一兩半

木香不見火 人參

杜仲去皮炒 甘草各半兩

右以咀咀每服四錢水一鍾煎服不拘時

益母丸醫方大全 專治產難橫逆併安胎順氣

用益母草其葉類大麻葉莖方花紫色白者不是五月五日採其葉莖陰乾不見日忌鐵器以石磨為末練蜜丸如

彈子大每服一丸臨產時以童子小便溫酒送下若氣不

順木香人參湯或艾醋湯下

枳實核柳丸宜明方 安養胎氣和調經候破癥瘕癖塊有似

絳孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實生 核柳

黃連

黃芩

當歸

阿膠灰炒研

木香各半兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十九丸日進二服

黃芩湯宜明方 治婦人孕胎不安

白朮

黃芩各等分

右為末水和一二三錢水二種入當歸一根同煎至一鍾溫

服

黃芪散大食良方 療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四

肢

川芎

甘草各五錢

黃芪

白朮

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參各錢

右咬咀每服八錢生姜三片棗二枚水一鍾半煎至八分食前服

知母丸 聖惠方 治月日未足而似欲產腹痛者

用知母為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸溫酒嚙下日一服

一方如梧桐子大每服二十丸粥飲送下

槐子丸 大全良方 治姙娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃 等分

右為末用煉蜜丸如梧桐子大溫酒下二十丸以痛止為度

○胎漏

如聖湯 濟生方 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮 當歸 去芦酒浸 熟地黄 酒蒸 白芍藥 川芎

阿膠 蛤粉炒成珠 川續斷 酒浸 甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一鍾芋根少許姜五片同煎溫下

桑寄生散 濟生方 治胎漏經血妄行淋瀝不絕

當歸 去芦酒浸 桑寄生 川續斷 酒浸 川芎 白朮

香附子 炒去毛 阿膠 蛤粉炒成珠 人參 茯神 去木各一兩 甘草 炙五兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去渣不拘時溫服

二黃散 拔萃方 治婦人胎漏下血

生地黄 熟地黄 各等分

丹溪心法卷之五

右為細末煎白朮枳殼湯調下二錢食前服

枳殼湯 按萃方 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼 去穢 黃芩 各半 白朮 一兩

右為末水煎食前溫服

秘傳當歸寄生湯 治妊娠胎漏非時下血

當歸 川芎 艾葉 白朮 各一 人參

桑寄生 續斷 熟地黃 各二

用水二鍾煎至一鍾去滓空心溫服

厚朴散 無故卒下血

阿膠 二兩 蛤粉炒 生地黃 半斤 搗

右以清酒三升將一味攪勻溫熱分三服飲之

一方 無故尿血

龍骨 一兩 蒲黃 半兩

右為末酒調每服二錢日三服

一方胎動不安或腰疼胞轉撞心下血不止

用石菖蒲根搗汁二升飲之

一方

用檉柳一兩為末葱白湯調下一錢

榆白皮散 簡易方 治妊孕漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮 葵根 大麻仁 各一 木通 半兩

牛膝 七錢 半去 苗酒浸焙

右以咀每服四錢水一鍾煎八分溫服

地黄當歸湯 治胎痛

當歸 一兩 熟地黄 二兩

右為末每半兩水煎良方等分為末蜜丸名內補丸許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋此等藥甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散苦寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停不若小服為愈

○惡阻

半夏茯苓湯 和劑方 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐

旋覆花

陳皮去白 炒

白芍藥

人參去芦

甘草炙

川芎

半夏炮二兩 二錢半

赤茯苓

熟艾各七錢半

右以咀每服四錢水一鍾姜四片煎七分空心熱服

茯苓丸 和劑方 治妊娠惡阻停飲屢聞食氣當與茯苓湯兼

送

赤茯苓去皮

人參

肉桂去皮

乾姜炮

半夏洗七次 焙

陳皮各一兩

白朮

葛根

甘草炙

枳實去白 炒 黃各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

竹茹湯 和劑方 治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅去白

人參

甘草二錢

麥門冬去心

白朮

厚朴姜製各半兩

白茯苓半兩

右以四每服五錢水一鍾姜五片入竹茹一塊如彈子大
同煎至入分溫服不拘時

小地黃丸 和劑方 治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參 去芦 乾姜 炮各等分

右為末用生地黄汁丸如梧桐子每服五十丸白木湯下

食煎

參橘散 和劑方 治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓 橘皮 去白各三兩 麥門冬 去心 白木

厚朴 姜製 甘草 炙各五錢

右以咀每服四錢水一鍾姜七片竹茹少許煎七分去滓
溫服

白木散 簡易方 治妊娠胎氣不和不能進飲食

白木炒 紫蘇 各一兩 白芷 炒 人參 各一兩 訶子

青皮 去白 川芎 各七錢半 甘草 二錢半

右以咀每服四錢水一鍾姜二片煎七分不拘時服

旋覆半夏湯 濟生方 治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多
少起

旋覆花 川芎 細辛 洗去土 人參 甘草 炙各半兩

半夏 湯洗七次 赤茯苓 去皮 當歸 酒浸 乾生姜 陳皮 各一兩

右以咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去渣溫服

人參半夏丸 濟生方 治妊娠惡阻醋心胸腹冷痛吐逆不食

半夏 湯泡七次 人參 乾生姜 各半兩

右為末以生地黄汁浸蒸餅丸如梧桐子每服四十九米
飲下

白朮散 六全良方 治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮 一兩 人參 五錢 丁香 二錢 甘草 一錢

右咬咀每服一兩生姜五片水二鍾煎至一鍾去滓溫服

食煎

人參橘皮湯 聖惠方 治阻病嘔吐痰水

人參 去芦 橘皮 白朮 麥門冬 甘草 三錢

厚朴 製 白茯苓 各半

右咬咀每服一兩水二鍾姜二片竹茹一彈煎至一鍾去

滓食前溫服集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散 六全良方 治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食及

心腹刺痛

人參 五錢 丁香 藿香 各二錢半

右咬咀每服五錢水一鍾煎至八分去滓溫服無時

保生湯 六全良方 治婦人經候不調或不行身無病似病脉

滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣

或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病

治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生姜煎

人參 甘草 各二錢半 白朮 香附子 烏藥 橘紅 各五錢

右咬咀每服一兩水一鍾半生姜三片煎七分去滓溫服

不拘時服或為末調服亦可子能令母虛

○子煩

竹葉湯簡易方治妊娘心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓兩 防風 麥門冬去心 黃芩各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時

知母飲簡易方治妊娘心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

亦茯苓 黃芩 黃芪各三兩 知母 麥門冬 甘草各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾入桑白皮煎熟再入竹歷同服

竹茹湯大全良方療妊娘煩躁或胎不動

淡青竹茹一兩

右用米一大升煮四合徐徐服盡為度

麥門冬散濟生方治妊娘心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬去心 防風 白茯苓各一兩 人參半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片淡竹葉十片煎七分溫

服

歸涼接命散濟生方治妊娘面赤口苦心煩腹脹

川芎 芎根 白芍藥 麥門冬去心

當歸去芦 白朮各一兩 糯米半合 甘草炙五錢

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾去渣溫服

麥門冬散聖惠方療妊娘心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣頭

眩四肢沉重百節疼痛多卧少起

麥門冬 子芩 赤茯苓 柴胡 赤芍藥

陳皮 人參 桑寄生 桔梗 甘草

旋覆花

各半

生地黄

二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓食前溫服

柴胡散

聖惠方

治姪娘心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡

一兩

赤茯苓

麥門冬

各一兩

枇杷葉

去毛

人參

橘皮

甘草

各三錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓溫服無時

人參散

聖惠方

治姪娘熱氣乘於心脾津液枯少煩躁癩痰

口舌乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家葛根

黃芩

犀角屑

各七錢半

甘草

五錢

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服

○子痲

羚羊角散

永鎮鈴方

治姪娘中風頭項強直筋脈牽急言

蹇澀痰涎不利或時發搐不省人事各日子痲

羚羊角

一兩

川獨活

酸棗仁

炒

五加皮

各半錢

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

各四分

木香

甘草

各二分半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分不拘時服

防風湯 大全良方 治姪娘中風卒倒心神悶辟口禁不能言

四肢強息

防風 寄生 葛根各一兩 菊花 防已

細辛 秦艽 當歸 官桂 茯神

甘草 羚羊角各半兩

右吹咀每服八錢水一鐘半生姜三片煎至八分去滓加

竹瀝半合溫服不拘時候

葛根湯 聖惠方 療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人吐逆

眩倒少醒復發者日子癩

葛根 貝母 牡丹皮去心 防風 防已

當歸 川芎 白茯苓 官桂 澤瀉

甘草各二兩 石膏 獨活 人參各兩

右吹咀每服八錢水一鐘煎至八分去滓溫服無時

防風葛根湯 妊娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生地黄各二兩 杏仁製

麻黃去節各一兩半 桂心少許 獨活 甘草 防已各一兩

右每服八錢水一鐘半煎入分不拘時溫服

一方 妊娠中風角弓反張口噤語澀謂之風瘧亦名子癩

麻黃去節 防風 獨活各一兩 桂心少許 羚羊角

升麻 甘草 酸棗仁 秦艽各半兩 川芎

當歸 杏仁製各七錢

右每服八錢水一鐘半姜四片煎至八分加竹瀝一合溫

服

○子癩

全生白朮散 簡易方 治妊娠百目虛浮肢躄腫如木氣名曰

子腫

白朮 一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓皮 各半兩

右為末每服二錢米飲調下不拘時

五皮散 大全良方 治胎水尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 陳皮 生姜皮 等分

右取咀每服八錢水一鍾濃磨木香水一鍾同煎至八分去滓溫服不拘時一方空心服

防已湯 脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已 七錢半 木香 二錢 赤茯苓 桑白皮 紫蘇莖葉 各二兩

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分食前溫服

如大便不通加枳殼枳椇

○子氣

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫

臃脹以來行步艱辛以至喘悶飲食不羨狀似水氣至於

脚指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤 洗畧炒 香附子 炒 陳皮 甘草 烏藥 等分

右為末每服三錢水煎入姜三片紫蘇三葉木瓜三片同

煎空心食前服日三次腫消止藥

腎著湯 大全良方 治妊娠腰脚腫

茯苓 白朮 各四錢 杏仁 甘草 各三錢

右取咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去滓通口食前服

○子淋

安榮散 濟生方 治姙娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋

麥門冬 去心

通草

酒石 各二錢

當歸 去芦酒浸

灯心

苕草 各半兩

人參

細辛 各一兩

右為細末煎麥門冬湯調下不拘時

大腹皮散 濟生方

治姙娠大小便赤澀

枳殼 去白麩炒

大腹皮

苕草 各一錢

赤茯苓 去皮三錢

右為末每腹一錢濃煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散 濟生方

治姙娠小便不利身重惡寒起則眩暈欲

倒

冬葵子 三錢

赤茯苓 去皮二錢

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是轉胞加髮灰少許極效

○轉胞

八味丸 治姙娠小便不通名曰轉胞亦治子淋 方見補損

全生茯苓散 簡易方 治姙娠小便不通

赤茯苓 葵子 各等分

右以咀每服五錢水二鍾煎至一鍾空心溫服濟生方加髮灰少許同服極效

○子懸

紫蘇飲 濟生方 治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮 去白 紫蘇葉

宮婦 去芦酒浸人參 甘草 各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾生姜五片葱白七寸煎至七分空心溫服

香木散 大全良方 治妊娠五箇月已後常常胃腹間氣刺滿

痛或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒憂思過度飲食失節

所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂成此病醫官王

師復處此方三服而愈

莪木 煨一兩 丁香 五錢 甘草 一錢

右為細末每服一錢空心塩湯調吞如物推下之狀

廣按此方所言婦人忿怒憂思過度以致胃腹之間氣

刺滿痛此言良是蓋婦人上有舅姑丈夫事觸物忤不

能自決而憂思忿怒沉鬱于中丹溪云氣鬱便成火火

載胎上榮衛不通則心腹之間脹滿痛俱作也宜矣

○兒在腹中哭 經方

用多年空屋下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止

又方 經方

用川黃連濃煎令母哈之

○鬼胎

斬鬼丹 鬼胎如抱一尾

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 白僵蚕

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下取出惡

物愈

風寒熱病

表虛六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項

身熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯 四兩

地骨皮 各七錢 桂枝

表實六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊惡

寒太陽經病宜合

四物湯 四兩 麻黃 細辛各半

風濕六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉

浮而濡頭痛太陽標痛也宜服

四物湯 四兩 防風 蒼木製各七錢

升麻六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑

如錦文宜服

四物湯 四兩 升麻 連翹各七錢

柴胡六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽頭

昏項強宜服

四物湯 四兩 柴胡 黃芩各七錢

大黃六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉

沉數陽明太陽本病也急下之宜服

四物湯 四兩 大黃 五錢 桃仁 十箇去皮尖麩炒

人參六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯 四兩 人參 五味子各五錢

厚朴六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明

本虛宜服亦治咳嗽喘滿

四物湯四兩

厚朴

枳實

姜炒各五錢

梔子六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯四兩

梔子

黃芩各五錢

石膏六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脈長

而大者宜服

四物湯四兩

石膏

知母各五錢

茯苓六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒小便不利太陽本病也宜服

服

四物湯四兩

茯苓

澤瀉各五錢

琥珀六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀

者宜服

四物湯四兩

琥珀

茯苓各五錢

膠艾六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損

者宜服

四物湯四兩

阿膠

艾葉各半兩

一方加甘草同上 一方加乾姜甘草黃耆

附子六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中

痛脈沉而遲少陰病也宜服

四物湯四兩

附子

炮去皮桂各半兩

四物大黃湯

聖惠方

若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下宜服

服

四物湯四 生地黄 大黃酒浸各五錢

芎藭散濟生方 治妊娠外感風寒 渾身壯熱 眼暈頭旋 心胃

煩悶

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮

麥門冬去心 陳皮去白 乾葛各兩 甘草各半

右咬咀 每服四錢 水一盞 姜五片 葱白三寸 煎服

白朮散按萃方 治妊娠傷寒 煩熱 頭痛 胎氣未安 或時吐逆

不下食

白朮 橘紅 人參 前胡 川芎

麥門冬 赤茯苓各兩 甘草 半夏湯炮七次 姜汁炒各半兩

右咬咀 每服四錢 姜四片 竹茹二錢 半水煎 去渣 溫服 無

時

升麻散按萃方 治妊娠傷寒 頭痛 身體熱

升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃去節各兩

黃芩 大青各半兩 石膏二兩

右為粗末 每服四錢 生薑四片 竹葉一七片 水同煎

芍藥湯按萃方 治婦人妊娠傷寒 自利 腹中痛 食飲不下 脈

沉者 大陰也 宜服此藥

芍藥 白朮各一兩 甘草 茯苓各五錢 黃芩二兩

右剉細 每服一兩 水煎服

麻黃散聖惠方 治妊娠五六月傷寒 頭痛壯熱 四肢煩疼

麻黃 桂心 柴胡 赤芍藥各一兩 甘草半兩

右咬咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓通
口服

前胡湯 大全良方治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏^{十二分} 前胡^{六分} 甜竹葉^{三分} 黃芩^{一分} 大青^{各五分}

知母^{一分} 梔子^{各四分}

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓溫
服不拘時外臺無甜竹葉

黃龍湯 聖惠方治婦人妊娠寒熱頭痛嘔吐不欲食脇下痛
嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來
通斷病後勞復餘熱不解宜服

柴胡^{去芦} 黃芩^{一分} 人參^{一分} 甘草^{各三錢七分半}

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時

積實散 聖惠方治妊婦傷寒四日至今日以來加心腹脹上

氣滯不止飲食不多腰疼身重

枳實^{一分} 陳皮^{七錢} 麥門冬^{去心}

右咬咀每服一兩水一盞半生姜半錢葱白七寸煎至八
分溫服

麥門冬湯 聖惠方治妊娠傷寒壯熱嘔逆頭疼不食飲食胎
動不安

人參^{一分} 石膏^{各一分} 前胡^{一分} 黃芩^{各七錢半} 家葛根^{一分}

麥門冬^{各五錢}

右咬咀每服一兩水一盞生姜三片棗二枚竹茹一錢半

煎至一盞去滓溫服不拘時

秦光散 傷寒五六日不得汗口乾多飲水任語嘔逆

秦光 柴胡 石膏 前胡 赤茯苓

甘草節 葛根 犀角屑 升麻 各等分

右每服八錢水二盞姜三片竹茹三錢煎至八分溫服

○廣按此方云傷寒五六日不得汗口乾多飲水任語嘔逆此則溫熱病之證候也古方溫熱病皆謂之傷寒多不分也用者審之

黃芪解肌湯 聖惠方治妊娠傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎 甘草 各半

芍藥 六錢

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘時加蒼木生地黄亦可

柴胡散 聖惠方治妊娠熱病骨節煩痛頭痛壯熱若熱不治則損胎

柴胡 葛根 知母 梔子 甘草 各五

石膏 三兩 大青 枳殼 升麻 各七

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓溫服不拘時候一方有黃芩無枳殼

梔子仁散 大全良方治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急瀉胎散

梔子仁 升麻 石膏 地黃 各二 黃芩

大青 各一兩 四十九粒

救急方有杏仁入地黃石膏

右咬咀每服半兩水一盞葱白七寸煎至五分去滓溫服
无時一方加青黛无大青又方以陳艾如雞子大酒煮服
救雜婦危困

大黃飲子 聖惠方 治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘

澁煩熱

大黃 微炒 各一兩 石膏 各一兩 知母 前胡 赤茯苓 各三錢

梔子仁 甘草 黃芩 各五錢

右咬咀每服八錢水一盞生地黃二錢半煎至七分去滓
溫服食前

柴胡石膏湯 聖惠方 治雜婦傷暑頭痛惡寒身熱煩燥悶亂
四肢疼痛項背拘急口乾舌燥宜服

柴胡 四兩 甘草 二兩 石膏 八兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫
服无時若氣虛躄冷加入參四兩

○傷寒熱病護胎法

一方 用白葵子不拘多少為末以雞彈清調攤於紙上如
碗大貼臍下胎在處乾以溫水潤之

一方 以蜜心土水調塗臍下乾又塗之就調服一錢

一方 吐熱甚井底泥敷心下令胎不傷

○雜病

行氣... 治... 雜病

消風散 濟生方 治姪娠肝臟熱毒上攻太陽穴頭眩目暈

項熱核曾腫延癰

石膏 煨

甘菊花 去枝

防風 去芦

荆芥穗

川羌活 去

川芎

羚羊角 鑊

大豆黃卷 炒

當歸 去芦 浸酒

白芷 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去滓食

後溫服

天門冬 飲子

濟生方

治姪娠肝經風熱上攻眼目帶帛失明

天門冬 去心 知母

羌蔚子 各一兩

防風 去芦 半兩 五味子

茯苓 去皮

川羌活 去芦 人參 各一錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至八分去滓食後溫

服

百合散 濟生方

治姪娠風壅咳嗽痰喘滿悶

百合 蒸

紫菀草 洗

貝母 去心

白芍藥

前胡 去芦

赤茯苓 去皮

桔梗 各一兩

甘草 炙五錢

右咬咀每服四錢水一盞五片煎至八分去渣溫服不拘

時

百合散 聖惠方

治姪娠咳嗽心胃不利煩滿不食

川百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮 各一兩

甘草 半兩 竹茹 一團

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半匙再

煎一二沸去滓食後溫服

紫苑湯 未類鈴方治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草 杏仁 桑白皮 各二錢半 紫苑

天門冬 去心各一兩 桔梗 半兩

右咳嗽每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

馬兜鈴散 大全良方治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母 各五錢
陳皮 大腹皮 紫蘇 桑白皮 各二兩 五味子 七錢

右咳嗽每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓食後溫服

平安散 濟生方治妊娠上氣喘急嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴 生姜 各二錢 乾姜 炮 陳皮 去白各一錢 川芎 半錢

木香 二錢 乾地黄 洗一錢半 甘草 炙四錢

右咳嗽每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時
驅邪散 濟生方治妊娠停食感冷發為瘧疾

高良姜 炒 白朮 草果仁 橘紅 藿香葉
縮砂仁 白茯苓 去皮各一兩 甘草 炙半兩

右咳嗽每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時
柴胡散 治妊娠瘧疾

黃芩 一錢 甘草 一錢 柴胡 生大黃 各二錢
右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度如胎上逼心可服枳殼散忌油麪辛酸之物

一方 治癰疾發熱口乾渴飲無度

生地黄一兩 黃芩 麥門冬去心 人參 知母

乾薑各一兩 石膏二兩 甘草半兩

右每服一兩水一鍾半烏梅半箇煎至一鍾溫服

一方 治癰疾

常山 石膏各一兩 甘草炙 黃芩各半 烏梅七箇

右作二服每服酒水各一碗浸一宿平旦煎服

蒙姜黃連丸 濟生方 治妊娠下利赤白穀道腫痛冷熱皆可服之

服之

乾姜炮 黃連去須 縮砂仁炒 川芎 阿膠蛤粉炒

白木各一兩 乳香三錢 枳殼去白燻炒半兩

右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵丸如梧桐子每服四十丸白痢乾姜湯赤痢甘草湯下 赤白痢乾姜草湯下

草湯下

當歸芍藥湯 濟生方 治妊娠腹中疝痛下痢

白芍藥 白茯苓去皮 當歸去芦酒浸 澤瀉 川芎各一兩

白木一兩半

右為末每服三錢空心溫酒米飲任下

白木湯 治孕婦下痢膿血

白木 黃芩 當歸已上各四錢

用水二盞煎至一盞去渣溫服食前

大龍散 拔萃方 治妊娠氣痛

艾葉末鹽炒一兩半 茴香 川練子各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後服

白木湯千金方治 妊娠卒心痛欲死不可忍者

白木三兩去黑心 赤芍藥二兩 黃芩一兩去黑心

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

忌桃李雀肉

當歸散大全良方治 妊娠中惡心腹痛

當歸 丁香 川芎各三兩 青皮二兩 吳茱萸半兩去梗

湯泡三次

右為末無時溫酒調一錢服

芎歸湯按卒方治 妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎 人參 茯苓 官桂 吳茱萸

當歸各三兩 厚朴製 白芍藥各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

一方有桔梗無官桂

廣按丹溪云凡心腹諸痛不可用參朮補氣其痛愈甚

則此方與前白木湯中皆犯禁禁未知果乎否乎

倉公下氣湯大全良方治 妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲

食四肢無力

羌活 赤芍藥 甘草 枳櫛 青皮 大腹皮

陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮 官桂各五錢 紫蘇二兩

右咬咀每服八錢生姜五片棗一枚水一盞半煎至八分

去滓温服食前

勝金散

治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸

酒浸炒

陳皮

去白

生薑

乾姜

炮

川芎

厚朴

去皮

縮砂仁

炒

甘草

各等分

右為末每服二錢塩湯調服不拘時

通氣散

大全良方治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟

右為末嚼胡桃肉半箇空心温酒調下二錢

消熱飲子

聖惠方治妊婦時氣六七日熱甚大小使不利最宜服之

川芒硝

一兩細研

葵子

三兩搗

右為末每服五錢温水調下无時 一方水一大盞煎至

一盞三分去滓不計時温服

一方 治孕婦大便秘澁 大全良方

枳殼

麩炒

防風

去芦

甘草

炙一兩

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

桑螵蛸散

濟生方

治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十箇炙為細末每服二錢空心米飲調下

白薇散

濟生方

治妊娠遺尿不禁

白薇

各等分

白芍藥

右為末每服三錢食前温酒調服

○瘦胎

瘦胎枳殼散 簡易方 治妊孕七八月常宜服滑胎易產

粉甘草 一兩 半炙 商州枳殼 五兩 去白 麩炒赤

右為末每服一錢空心白湯煎服一方加香附子尤佳

○廣按前人云枳殼散性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛

之疾以地黄當歸湯蜜丸佐之可也 說見前

地黄當歸湯 補血養胎 并枳殼散間服蓋枳殼散破氣有

餘而地黄當歸湯補血不足也 方見前

救生散 濟生方 治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣

易產

人參 煨去核 白朮 神麴 陳皮 各等分

右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

○催生

催生如聖散

黃葵花 不以多少焙乾

右為末熱湯調下一錢神效 或有漏血胎臟乾澁難產

痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下 如死

花只以蜀葵子研爛小半合以酒調尤妙 亦治打撲傷

損 如胎死不下煎紅花溫酒調下 經驗方用子四十

九粒或三十粒歌曰黃金內子三十粒細研酒調能備急

命若懸係在須臾即令眷屬不悲泣

催生如聖散 濟生方

用黃蜀葵子為細末每服二錢熱酒調下熱湯亦可

催生神妙佛手散 大全良方 治婦人姙娠五七月因事築磕
着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探
之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下

當歸六錢 川芎四錢

用水一盞半煎令泣欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓溫
服口噤灌之如人行五里再服不過二三服便生

催生如意散 聖惠方 臨產腰疼方可服

人參 為末 一錢 乳香 一錢 辰砂 五分

右將一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用姜
汁調開冷服如橫生倒產即時順子母平安

催生神効七寶散 大全良方 臨產腰痛方可服

玄胡索 沒藥 白礬 香白芷 煨 姜黃 煨

當歸 桂心 等分

右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調下臨陣時服
一二服立產

催生如神散 聖惠方 治逆產橫生瘦胎兼產前產後虛損月

脉不調崩漏等証 一名催生黑散子 一名烏金散 一
名二神散

百草霜 白芷 不見火為末

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米醋
打為膏沸湯調下集驗方用童子便酒各半盞煎沸即調
停熱服甚者不過再服

催生丹

簡易方 治產婦生理不順 臨蓐艱難

十二月兔腦髓 去皮膜 研乳香 一分 母丁香末 錢一

射香 細研一字

右研勻用兔髓和丸如雞頭大 陰乾 油紙各封貼 每一丸 破水後溫水下 即時產下 隨男左女右手握緊 出是驗

催生鉛丹

濟生方 治橫逆難產

用黑鉛一錢 將小銚子火上鑪 投水銀一錢 急攪結成砂 子傾出以熟絹衣角紐作丸子如菘豆大 臨產時射香水 吞下二丸立下

催生散

懷孕不覺行動舒伸 忍痛曲身不臥 故子在腹中 不能轉動 致有橫逆難產 甚則子死腹中

蛇退 一條 蟬退 筒 人退 即男子頭髮一團如雞頭大

右俱燒為末 酒調下 分作三服

一方

用蛇退一條全者 燒灰入射香一字 酒調二錢 面東服如 橫生逆產 以餘渣塗所出手足 即順也

一方

用草鞋鼻繩路上者 洗淨燒灰末 童便和酒調服 一名 千里馬

滑胎散

聖惠方 催生神効

益元散 一兩方 見暑門 蛇退 一條 燒灰存性 墻筒上者好

男子亂髮 香油一兩 熬化 蟬退 全者五箇 燒灰 穿山甲 一片 燒灰存性

右爲細末用薑水一碗和藥煎二沸入油頭髮拌勻冷定服之立下

○產難

無憂散 濟生方 治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨蓐難產

當歸 川芎 白芍藥 枳殼 乳香

木香 甘草 血餘灰

右爲末每服二錢水一盞煎至八分溫服不拘時

金液丸 濟生方 治胎氣太肥橫逆難產

飛生毛 火燒如腋 血餘灰 硃砂

公母羊糞 燒灰各 竈心土

黑鉛 二錢用鐵子火上鎔投水銀半錢急攪結成砂子

右爲末用粽子角爲丸如棗豆大遇難產以剉流水吞五

丸

來甦散 濟生方 治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭眩

目暈口噤面青髮直不省人事

木香 神麩 陳皮 麥蘖 黃芪

生薑 阿膠 白芍 芩根 甘草

糯米 一合

右用水三盞煎至一盞半幹開口灌之連進爲妙

二退散 治產難

蛇退 一條 蚕退紙 方圓

右各燒存性爲細末酒調服

雲母散 橫生逆產

用雲母石按成粉每服一錢酒調下

救生散 橫生逆產

用桂心為末童便酒調一錢服之神效

一方 治產難

用臈月兔頭一枚燒灰為末葱白湯調一錢立生 又或

吞雞子黃二箇并少苦酒服之立生 又或用赤小豆二

升水九升煮取一升汁入灸了明黃膠一兩同煎少時一

服五合 又用槐子十四枚即下 又方當歸為末酒調

方寸七服之

一方 治難產二百不下

○用伏龍肝細研每服一錢酒調服之

一方 治胞衣不下

取皂屋黑塵研為細末酒調方寸七

黑龍丹

濟生方治姙娠臨產難生或胎衣不下產後血暈不

省人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺痛血滯浮腫血

入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或類瘧

疾胎前產後一切聲急狼狽垂死以此藥灌三四丸無不

救活者

五靈脂

當歸 酒浸

生地黃

川芎

良姜

各三兩

右剉入砂鍋內紙筋塩泥固濟炭火煨通紅候火減冷取

出研細入後藥

百草霜

乳香

生硫黃

琥珀

花藥石

右五味計一兩一錢細末同煎藥和勻米醋煮麩糊為丸如彈子大每要服用炭火煨熟通紅投入生姜自然汁浸碎之以無灰酒併合童便頓服神効不可盡述

內灸散 和濟方治婦人產前產後一切血疾血崩虛腫腹脇

疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色

腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色

青黃勞傷劣弱月經不調下血隨胎血迷血暈血痕時發

疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾熱虛多汗

手足逆冷並宜服之方見前經病類下

○死胎

香桂散 大全良方下死胎

射香 半錢 另研 官桂 三錢 未

右共和勻用溫酒一盞調服須臾如手推下

一方 治胎死腹中或半產不下 產寶方

桂 五錢 去皮 牡丹皮 川芎 葵子 各一錢 二分半

右為細末每服三錢煎葱白湯下

一字神散 大全良方 治子死腹中胎不下胞破不生此方累

有効驗

鬼白 不拘多少黃色者去毛

右研為末以手指撚之如粉極細為度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

一方 死胎不出產婦面青指甲青舌青口臭

用朴硝為末每服二錢順流水調下甚者溫童子小便調服胎下母活亦治胎衣不下

霹靂奪命丹 消生方治臨產驀然氣痿目翻口噤面黑唇青

沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活修合時勿令婦

妾雞犬見之

蛇退 一條入瓦罐內煨

金銀箔 各七片

丁香 半錢別研

髮灰 一錢

馬鳴 即蚕退燒一錢

黑鉛 半錢

水銀 七分半依前法作用

千金馬 路上左脚踏草鞋取鞋鼻洗淨燒灰一錢

右為末以豬猪心血丸如梧桐子倒流水灌下二丸如灌

不下研開亦得

如聖膏 大全良方治難產兼治胞衣不下兼治死胎

用葶麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸出縮入如聖之妙一方用四十九粒

廣按產前諸証皆因胎氣所致夫胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛為異爾故胎動宜行氣胎漏宜清熱也惡阻者惡心而阻隔飲食也子煩者煩躁而悶亂心神也子癩者痰涎潮搐目吊口噤也子腫者面目虛浮肢躄腫滿也子氣者兩足浮腫也子淋者小便澀少也轉胞者小便不通也子懸者心胃脹痛也蓋脾主運化水穀婦人有胎則脾運化水穀不利而生濕濕則

生痰痰生熱熱生風也子腫子氣者溫也惡阻者痰也
子煩子淋者熱也子癰者風也子懸者氣也轉胞者虛
也溫則滲之痰則消之熱則清之風則平之氣則散之
虛則補之何爲而不愈哉外有風寒熱病雜病之條者
用藥要去邪保胎之並行有催生難產死胎之目者治
法有緩急輕重之少異葉醫者其可忽乎

產後 九十六

壬集

○產後無得令虛當大補氣血爲先雖有雜証以采治之一切
病多是血虛皆不可發表 產後不可用芍藥以其酸寒伐
生發之氣故也 產後血暈因虛火戴血上行漸漸暈來方
用鹿角燒灰出火毒研極細末好酒同童便嚥下一呷即醒

行血極快 又方以韭菜細切盛於有背瓶中以熟醋沃之
急封其口以背塞產婦鼻中可愈眩暈之 產後中風切不可
可作風治必大補氣血爲主然後治痰當以左右手之脈分
其血氣多少而治 產後中風口眼喎斜切不可服小續命
湯 產後水腫必用大補氣血爲主少佐蒼朮茯苓便水自
利 產後大發熱必用乾姜輕者用茯苓淡滲其熱下應寒
苦并發表之藥皆不可用 產後發熱惡寒皆屬血虛 左
手脈不足補血藥多於補氣藥 惡寒發熱腹痛者當去惡
血腹滿者不是 產後發熱乳汁不通及膨者無子當消用
麥蘖二兩炒研細末清湯調下作四服 有子者用木通通
草猪蹄煎服 凡產後有病先固血氣 前條云產後大熱

必用乾姜或曰用姜者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生
內熱耳故以補陰藥大劑服之且乾姜能入肺和肺氣入肝
分引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然
之妙非天下之至神孰能與於此乎 產後脈洪數產前脈
細小澁弱多死懷孕者脈至洪數已產而洪數不改者多主
死之

入方 產後補虛

人參 白朮 一錢 茯苓 歸身尾 陳皮

川芎各半 甘草炙三分 有熱加黃芩一錢

生姜二片水煎服

產後消血塊方

滑石 三錢 沒藥 二錢 血竭 二錢如無以牡丹皮代之

右為末醋糊丸 如惡露不下以五靈脂為末神麩丸白

木陳皮湯下 瓦礫子能消血塊

又方

血竭 五靈脂

右為末消產後血塊極好

又方 治產後泄瀉

黃芩 白朮 川芎 茯苓 乾姜

滑石 陳皮 炒芍藥 甘草炙

右咬咀水煎服

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂 一方加蛤粉

右為末醋糊丸甚者人參仁不去尖用

獨行丸 治婦人產後血衝心動及治男子血氣心腹痛有

孕者忌服

五靈脂 去上半 炒半生

右為末水丸彈子大每一丸或酒或姜化下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝証

人參 二錢 白朮 二錢 桃仁 陳皮 各一錢 黃芪 一錢

茯苓 一錢 甘草 炙半

右吹咀水煎猪羊胞後入藥作一服

附諸賢論

王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾姜之苦溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問服何飲食有無傷積胃膈飽悶噯氣惡食泄瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法

附諸方

花藥石散 治產後胎衣不下極有神効 方見前跌撲損傷類

奪命丹 濟生方 治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或去

血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急取鞋

底灸熱小腹上下慰之次進此藥

附子

炮去皮 脐半两

牡丹皮

去心

乾膝

炒令烟尽 各一两

右為末用酸醋一升大黃末一两同熬成膏和藥丸如梧桐子每服五十丸溫酒送下

一方 產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

用錦紋大黃一两為末以好醋半升熬成膏丸如梧桐子大以醋大半鍾化五丸服之須臾即下

一方 治產後生腸不收

用枳殼二兩去穢煎湯溫浸良久即入

一方 治婦人子宮不收

荆芥穗

藿香葉

臭椿皮

右等分以咀煎湯薰洗子宮即入

一方 治婦人子宮太痛不可忍

五倍子

白礬

右為末溫湯泡洗乾糝亦可

一方 治下胎或產後血上心已死

用礬金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立活

芎歸湯 和劑方 治產後去血過多暈煩不省一切去血並宜服之

芎藭

當歸

去芦酒洗 焙各等分

右以咀每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘時腹中刺痛加白芍藥 口乾煩渴加烏梅麥門冬 發寒熱加乾姜白芍藥 水停心下微有嘔逆加茯苓生姜 虛

煩不得眠加人參竹葉 大便秘澁加生地黃橘紅杏仁
小便不利加車前子 腹脇膨脹加厚朴血崩不止加
香附子 咳嗽痰多加紫苑半夏生薑 腰疼膝痛加牛
膝 心下疼痛加玄胡索 惡血不下腰腹重痛加牡丹
皮

返魂丹 治生鹿一十六証 一名益母花

野天麻

一名益母草方根四五月節間開紫花時採花葉子陰乾半斤

木香 五錢

赤芍藥

六錢 當歸七錢

右同為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸隨飲子下

○子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷瓜甲青黑童便
酒和勻煎沸化下

○產後惡血不盡臍腹刺痛童便和酒化下

○產時面垢顏赤胎衣不下敗血自下如帶或橫生不順
心悶欲死童便酒薄荷自然汁和勻化下鹽酒亦可

○產後三四日起卧不得眼暗生花口乾煩燥心亂見鬼
狂言不省人事童便酒薄荷汁下

○產後煩渴呵欠不思飲食手足麻疼溫米飲下

○產後浮腫氣喘小便澁咳嗽惡心口吐酸水脇痛無力
酒下

○產後寒熱如瘧臍腸作痛米湯下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便和酒下
○產後大便秘心煩口渴童便酒化下薄荷自然汁亦可

○產後痢疾月未滿食冷物與血相擊或有積聚湯化下
 ○產後身躄百節疼痛溫米飲下
 ○產後崩中漏下蓋是傷酸物狀如雞肝脊背悶倦糯米
 秦朮湯下桂枝湯下亦可
 ○產後食熱麪壅結成塊四肢無力睡後汗出不止月水
 不調久成骨蒸勞童便和酒下
 ○產後嘔逆虛脹酒下
 ○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下
 ○產後赤白帶下秦朮同糯米煎湯下
 ○廣按返魂丹功效不可具述其於產前清熱養血產後
 推陳致新無不可也 有事之家理宜預備

黑神散 和劑方 治婦人產後惡露不盡胞衣不下血氣攻心
 眩暈等証

黑豆 炒半斤 熟地黃 當歸 去芦 肉桂 去皮 乾姜 炮
 甘草 炙 芍藥 蒲黃 各四兩
 濟生方除蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便尤佳
 廣按敗血見熱則行見寒則凝理也此方姜桂俱用已
 是熱矣而濟生又加以附子不無熱之太過乎世俗好
 溫惡寒之弊於此見之也

黑龍丹 治維娘臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省人
 事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服之

方見前產

四味湯 聖惠方 療產後一切諸疾 總方分 宛宜服

當歸 玄胡索 血竭 沒藥 各五分

右共二錢為細末用童子小便一盞煎六分通口服 如

心膈煩加當歸五分 如氣悶喘急加玄胡索五分如惡

露不快加血竭五分 如心腹撮痛加沒藥五分

神仙索金散 醫方大成 治婦人產後血暈血虛積血不散寒

熱往來胃膈不快氣喘不進餘食骨節疼痛生血風瘡此

藥逐惡血生新血止肚痛

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黄 金藤

川牛膝 麻黃 玄胡索 炒 官桂 神麴

荆芥 粉甘草 雄黑豆 各一兩

右為末每服二錢溫酒調下或當歸湯童子小便任下不

拘時候

一方 治產後血暈心悶氣絕

用紅花一兩坏子者為末作二服酒二盞煎取一盞併服

如口噤幹開口灌之

血竭破棺散 秘方 治婦人產後血閉血迷血暈血勞嗽血男

子傷力勞嗽吐血

乳香 血竭 箭頭砂 各一錢

右為末巴豆仁研泥為膏磁器盛之如用丸如雞頭子大

婦人狗膽冷酒下男子冷酒下

清魂散 治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或漆

器燒烟鼻中薰之頻置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉 人參 去芦 荆芥穗 甘草 各八川芎 一兩

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

奪命散 大全良方 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失

志及產後百病

沒藥 血竭

右等分為末才產下便用童便與細酒各半盞煎一二沸

調下一二錢良久再服其惡血自此下行更不衝上免生百

病專治婦人方只用白湯調下

七珍散 大全良方 論曰產後不語者何答曰人心有七孔三

毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又
心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服
此藥

川芎 人參 石菖蒲 生乾地黃 各一兩

細辛 一錢 防風 辰砂 另研各半兩

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

胡氏孤鳳散 大全良方 治產後閉口不語

用白礬研細熟水調下一錢

○廣接產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心竅者前方七珍散治熱血此方孤鳳散治熱痰也肥人多是

熱痰瘦人多是熱血

卷荷散 拔粹方 治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡露不快並皆治之

初出卷荷 一兩 紅花 一兩 當歸 一兩 蒲黃 一兩 紙炒 牡丹皮 各一兩

右為細末每服三錢空心塩酒送下二臘内用童子小便調下

大嚴密湯 濟生方 治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進

胡索湯 方見經病類

熟地黄 酒蒸焙 當歸 去芦酒浸 川獨活 去芦 白芍藥

細辛 洗 吳茱萸 炒 桂心 不見火 小草 乾姜 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎服不拘時

當歸血竭丸 聖惠方 治婦人產後惡物不下結聚成塊心胃痞悶及臍下堅痛

當歸 炒 血竭

蓬朮 芍藥 各一兩 五靈脂 四兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十丸温酒送下或

粥清下空心食前

荷葉散 聖惠方 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉 二兩 桃仁 半兩去皮尖燻炒 劉寄奴 蒲黃 各一兩

右咬咀每服四錢半童子小便一大盞生姜三片生地黃

一分煎至六分去渣熱服不拘時

失笑散 治產後心腹絞痛欲死者 方見經病類

紫金丸 大 全良方 治產後惡露不快 腰痛小使如刺時作寒
熱頭痛 不思飲食 亦治久有瘀血 月水不調 黃瘦 不思飲
食 亦療 心痛 與失笑散同

五靈脂

水淘去石砂 乾耗為末

真蒲黃

右以好米醋調五靈脂 未慢火熬成膏子 次以蒲黃末搜
和 凡如櫻桃大 每服一丸 水與童子小使各半 蓋煎七分
令藥化 溫服少頃 再下服 惡露即下 久有瘀血 成塊 月信
不利者 並用酒磨下

一方 治產後血塊腹痛

荆芥

炒

川當歸

炒

乾地黄

洗

芍藥

各半兩

蒲黃

二錢半 銚內 爛紙炒赤

右同為細末 每服三錢 空心溫酒調服

地黃散

拔萃方

治產後惡物不盡 腹中疝痛

生乾地黄

當歸

並炒各二兩

生姜

半兩 細切如蠅頭大 新瓦上炒令焦黑

右為細末 姜酒調下 二錢服

四神散

和劑方

治產後瘀血不消 積聚不散 作塊 心腹切痛

當歸

乾姜

炮

川芎

赤芍藥

各等分

右為細末 每服二錢 溫酒調下

當歸養血丸 和劑方 治產後惡血不盡 發熱身痛 經閉者 並

皆治之

肉桂

一兩

當歸

去芦

牡丹皮

女胡索

各一兩

赤芍藥

二兩

右為末 煉蜜丸 如梧桐子 每服五十丸 空心用溫酒米飲

下

天仙藤散 聖惠方 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤 炒焦五兩

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小使和酒調下常患氣血用溫酒調下

玉燭散 治產後惡露不盡膝腹疼痛時發寒熱

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 大黃

甘草 朴硝 各一錢半

右作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○廣按諸方治敗血作痛皆是溫劑熱則流通之理惟此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結者設也

非大便燥結者慎不可用

一方 治產後敗血不止

生乾地黄 一兩

用石器內搗為末每服二錢食前熱酒調服連進三服

瑞蓮散 聖惠方 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 一百枚燒灰存性 棕櫚 燒灰存性 當歸 各一兩 官桂 半兩

栝柳 二枚 鯉魚鱗 炒 川芎 各七錢半

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服或時血崩此藥可治但進三服即止

紅花散 產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花 蒲黃 炒各等分

右爲細末每服一錢酒調溫服
右胞衣不下以榆白皮煎湯調服半兩立效

琥珀散 聖惠方治產後經脉不調四肢煩疼飲食減少日漸羸瘦

琥珀 牛膝 生地黄 當歸 各一兩 桃仁 赤芍藥 各五錢

右咬咀每服八錢水二盞生姜三片煎至八分去滓無時溫服一方加桂心半兩

調經散 濟生方治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可作水氣治之但調其經而腫自消又有去血過多心虛易驚加生龍腦一握煎服

沒藥 研 肉桂 不見火各一錢 赤芍藥 細辛 洗半錢

琥珀 別研一錢 射香 別研半錢 當歸 去芦酒浸各一兩 同芍藥

甘草 炙二錢

右爲末每服二錢生姜汁溫酒任意調下

趁痛散 濟生方治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼痛

當歸 去芦酒浸 官桂 不見火 白朮 川牛膝 去芦酒浸各半兩

甘草 炙三錢 黃芪 去芦獨活去芦 生姜 各半兩 薤白 三錢

右咬咀每服四錢水二盞煎服加桑寄生半兩尤佳

愈風散 聖惠方療產後中風不省人事口噤牙緊手足瘳癱

如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心眼倒吐瀉欲死

荆芥穗 焙 當歸身尾 各等分

右爲末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神口噤者幹開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麩糊丸如梧子大每服五十九空心米湯下

血風湯 產後諸風攣急或痿弱無力

川芎 芍藥 當歸 熟地黄 秦艽

羌活 防風 白芷 白朮 茯苓

右爲細末一半煉蜜爲丸如梧桐子大一半末溫酒調下

九子五十七丸

交加散 濟生方治產後中風脇不得轉動

生地黄 五兩 研 取汁 生姜 五兩 研 取汁

右交互以汁浸渣一夕次日漬取盡汁各炒黃煨爲末酒

調服

○已上諸方行血去邪之劑

四順理中丸 和劑方治新產血氣俱傷脾胃不調百日內宜常服

甘草 炙二兩 人參 去芦 乾姜 炮 白朮 各一兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

千金散 治產後虛勞不能食

白朮 扶苓 黃芪 各二兩 人參 川芎

芍藥 熟地黄 當歸 各一兩 肉桂 半兩 甘草 炒半兩

右以咀每服一兩水二盞生姜五片棗三枚同煎至一盞空心溫服

人參當歸散 和劑方 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生
內熱其証心曾煩滿吸吸短氣頭痛悶亂曠時轉甚與大
病後虛煩相類急宜服之

乾地黄 人參 去芦當歸 去芦肉桂 去皮

白芍藥 二兩 麥門冬 去心各 一兩

右咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎

至一盞去米葉入藥分裏三枚煎溫服血甚者加生地黃

當歸黃耆湯 和劑方 治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

當歸 去芦 三兩 黃芪 各二兩 白芍藥 各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

增損四物湯 濟生方 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露

未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸 去芦 酒浸 白芍藥 川芎 乾姜 人參 各一兩 甘草 炙 兩

右咬咀每服四錢水一盞姜二片煎服不拘時

當歸羊肉湯 濟生方 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰蓐勞

當歸 去芦 酒浸 人參 各七錢 黃芪 去芦 一兩 生姜 半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入煎藥煎四盞

去滓作六服早晚頻進

豬腰子粥 濟生方 治產後蓐勞發熱

用豬腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳
米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熟粥益
之如作盒生粥狀空心服之

熟地黄湯 澹寮方 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無

味

熟地黄 一兩淨洗 酒浸蒸焙

人參 去芦 麥門冬 去心 各一兩

甘草 炙半兩

桔樓根 四兩

右咬咀每服四錢水一盞半糯米一撮姜三片棗一枚煎

八分不拘時服

人參湯 永類鈔方 治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身 人參 去芦

石等分爲末猪腰子一隻去膜切作片子以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入棗二錢煎至八分不拘時服

大調經散 聖惠方 治產後血虛惡露未消氣未散濁凝滯

衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣未平之所爲也

所爲也

大豆 一兩半 炒入皮 扶神 一兩 去皮 琥珀 一錢

右爲末每服三錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

白茯苓散 聖惠方 治產後羸勞蓋因生產日淺久坐多語運

動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘡狀

白茯苓 一兩 當歸 川芎 桂心 白芍藥

黃耆 人參 熟地黄 各半兩

右咬咀先用水二盞入猪腎一雙去脂膜細研生姜三片棗子二箇同煎至一盞去腎姜棗入末藥五錢煮取七分

去滓食前分二服温服

佛手散 大全良方 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸

川芎

黃耆 各一兩

前胡 各二錢半

右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚生姜一片煎至六分去滓温服如有痰去烏梅

黃龍湯 大全良方 治婦人寒熱頭痛嘔噦不欲食脇下痛嘔

逆痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解

柴胡 四錢 八分

黃芩

人參

甘草 各一錢八分

右作一服用水二盞煎至一盞去滓温服不拘時服

增損柴胡湯 聖惠方 治產後經水適斷感干異證手足指瘡

咬牙昏冒係屬上焦

柴胡 八錢 黃芩 四錢 人參 三錢 甘草 四錢 石膏 四錢

知母 二錢 黃芪 五錢 半夏 三錢

右咬咀每服八錢生姜二片棗一枚水一盞半煎至八分去滓温服無時

增損柴胡湯 濟生方 治產後血羸發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮 川芎 白芍藥

右等分咬咀每服八錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至八分去滓不拘時通口服

三之一湯 濟生方 治產後虛勞雖日久而脈浮盛疾

柴胡八錢 黃芩 人參 半夏 洗 甘草 炙

川芎 芍藥 熟地黄 當歸 各三錢

若右咬咀，每服八錢水二盞生薑二片棗一枚煎至八分去

滓溫服

三聖散 濟生方治產後日久虛勞針灸服藥俱不效者

川芎 當歸 熟地黄 白芍藥 白朮

白茯苓 黃芪 各一兩 柴胡 人參 各一兩六錢

黃芩 半夏 甘草 各六錢

右咬咀，每服八錢水一盞半生薑二片棗一枚煎至八分

去滓，通口食前服，下丸無姜棗

○廣按已上五方小柴胡湯加減法也，卒者對證而用則

中昔效矣

○已上諸方補虛退熱之劑

豈菟理中丸 產後元氣虛弱，脘腹疼痛，泄瀉不止，又治男

子脾胃虛弱，久泄不止

人參 一兩 白朮 二兩 乾姜 甘草 炙 各五錢

肉豆蔻 七錢 麩暴煨

右為細末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服四五十九，空心米湯

下酒煮麩糊為丸亦可

調中湯 濟生方治產後腸胃虛怯，冷氣乘之，腹脇刺痛，洞泄

不止

良姜 炒 當歸 去芦 酒浸 肉桂 不見火 白芍藥 附子 炮去皮

川芎各兩 甘草灸 人參各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服

白朮散 聖惠方治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘皮 麥門冬 人參 乾姜炮各一兩

甘草灸半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓服

無時

枳實芍藥湯 聖惠方治產後腹痛煩滿不得食

枳實燒存性 芍藥

右咬咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無

時 一方為末服方寸匕日三

抵聖湯 濟生方治產後血氣傷于脾胃腹痛悶嘔逆惡心

赤芍藥 半夏湯泡 澤蘭葉 陳皮去白 人參各二兩

甘草灸一兩

右咬咀每服四錢生姜七片煎服不拘時

現睨丸 濟生方治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心下

痞痛

高良姜炮 姜黃洗 葶澄茄 陳皮去白 蓬朮炮

人參 京三稜炮各一兩

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麩糊花如

梧桐子每服五十九丸就用蘿蔔湯送下

○廣按已上六方皆為產後脾胃虛弱飲食過傷遂成諸

疾而作也

旋覆湯 和濟方 產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞舌重重

麻黃 去節 柴胡

杏仁

去皮尖 麩炒

五味子

去根

旋覆花

甘草

茯苓

赤芍藥

荆芥

去梗

半夏

各等分

右以咀 每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分溫服

芎烏散 治產後頭痛

天台烏藥

川芎 窮

右為末等分每服三錢燒秤鍾酒服

二母散 聖惠方 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽如傷風痰嗽用尋常傷風藥不效宜服

知母

貝母

白茯苓

人參各五錢

桃仁去皮尖

杏仁去皮尖 各一兩

右以咀 每服八錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

參蘇飲 聖惠方 治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參一兩 為末

蘇木二兩 槌碎

右用水二碗煮取一碗去滓調人參末隨時加減服

丁香散 聖惠方 治產後心煩咳嗽不止脾胃虛寒衛氣厥逆

白豆蔻

丁香各五錢

伏龍肝一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散 聖惠方 治氣吃噎又治吐逆心怔目暈不思飲食

石蓮肉

一兩半

白茯苓

一兩

丁香

半兩

右為細末每服三錢米飲調下不拘時

漢防已散 大全良方 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已 猪苓 枳殼 桑白皮 各一兩

商陸 甘草 各七錢半

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服無時一方空心服

調導散 聖惠方 治婦人產前產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳殼 各四錢 甘草 各一錢

右咬咀每服一兩用姜三片棗子一枚水二盞煎去一盞去滓溫服不拘時忌動風物

麻仁丸 濟生方 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大便

閉澁

麻子仁 另研 枳殼 去白麩炒 人參

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸溫酒米飲任下

橘杏丸 治產後體弱大便虛秘 方見燥結類

一方 產後小便數及遺尿

龍骨 一兩 桑螵蛸 半兩炙

右為細末米飲調下二錢空心服

漏芦散 濟生方 治乳婦氣脈壅塞乳汁不行

漏芦 二兩 蛇蛻 炙十條 瓜蒌 十箇急火燒存性

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍吃熱羹助之
猪蹄湯 濟察方 治妳婦氣少力衰脈澁不行絕乳汁

猪蹄一隻 通草 五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四五升取汁飲之

玉露散 大全良方 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏

痛大便澀滯悉能治之凉膈壓熱下乳

人參 白茯苓 甘草 各半 桔梗 炒 川芎

白芷 各一 當歸 二錢 芍藥 七錢半

右吹咀每服四錢水一鍾半煎至于七分去滓温服食後如頭熱甚大便秘加大黃二錢半

湧泉散 因氣乳汁必

瞿麥穗 麥門冬 去心 王不留行 緊龍骨

川山甲 炮黃各等分

右爲細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以木梳左右乳上梳二十餘下日三服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

歌曰

婦人吹乳意何如 皂角燒灰蛤粉和

熱酒一盃調八字 須臾揉散笑呵呵

一方 治產後陰腫痛

用桃仁去皮尖細研四五次抹之

一方 治產後用力太過陰門突出

用四物湯煎熟入龍骨末少許空心連進二服用麻油和

湯薰洗

一方 治婦人陰冷

用其茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎帛裹納陰中良久如火熱

○已上諸方調理雜證之劑

○廣按產後諸證其源有二曰血虛火動曰敗血妄行曰飲食過傷何以明之氣屬陽也血屬陰也經曰陽虛生外寒陰虛生內熱蓋產後去血過多血虛火動而為煩燥發熱之類一也血猶水也水之就下性也孟子云今夫水搏而躍之可使過顛激而行之可使在山非水之性也勢使之然也蓋產後虛火上載敗血妄行而為頭

暈腹痛之類一也經云少火生氣壯火食氣東垣云火為元氣之賊火并元氣不兩立一勝則一負蓋產後火傷元氣脾胃虛弱若飲食過傷則為痞滿吐瀉之類三也治之之法血氣火動則補之敗血妄行則散之飲食過傷則消之何患乎不愈哉雖然人之元氣有虛實疾病有淺深治療有難易又不可一槩論也

子嗣

九十七

附諸虛

斷子法

丹溪心法

○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星夏蒼朮白芩防風羌活滑石或導痰湯之類若是怯瘦性急之人經

水不調不能成胎，謂之子宮乾澀無血，不能攝受精氣，宜涼血降火，或四物加香附、黃芩、柴胡養血養陰等藥，可宜。東垣有六味地黃丸以補婦人之陰血不足，無子服之者，能使胎孕出，試效方。

附脉理

脉訣李要曰：陰搏於下，陽別於上，血氣和調，有子之象。手之少陰其脉動甚，尺按不絕，此為有孕。少陰屬心，心主血脉，腎為胞門，脉應於尺，或寸脉微，關滑尺數，往來流利，如雀之啄，或診三部浮沉一止，或平而虛，當問月水，婦人有病而無邪脉，此孕非病，所以不月。

附諸方

六味地黃丸

見補損

女金丹

韓飛霞方

白芍藥

當歸

川芎不見赤石脂可

白亦

養本

人參

白薇

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

白茯苓

玄胡

沒藥

甘草

十五味除石脂沒藥，另研外其餘皆以醇酒浸，三日烘乾，為細末，足殼一十五兩。

香附子

十五兩以水醋浸，二日，焙炒為細末，足十五兩。

右十六味和合，重羅數遍，煉蜜丸，如彈子大，磁銀器托，每取七丸，空心雞未鳴時服一丸，先以薄荷湯或茶灌漱，咽喉後細心以溫酒，或白湯送下，醃物乾果壓之，服至四

十丸爲一劑以癸水調平受胎爲度胎中三日一丸產後
一日一丸百日止及人事而不育焉天夫人爲函恭諫曰
天命子每于世之乏嗣者惜焉

說說丸 和劑方治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉 一兩半 肉桂 去皮 五本 當歸 洗焙 熟地黃 一兩 洗焙各

白朮 一兩 川芎 石斛 酒浸炒 乾姜 炮半 白芍藥

牡丹皮 延胡索 各一兩

右爲末醋糊丸如梧桐子大每五十丸空心溫酒下

烏雞丸 治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨蒸
等疾不能成胎

用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許開死去毛腸淨用

艾四兩青蒿四兩剉碎納一半在雞腸用酒燻一隻納
雞井餘艾蒿在內用童便和水灌令沒雞二寸許煮絕
乾取出去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研爲細末
南香附去毛淨一斤分作四分采泔水浸一分童便浸
一分醋浸一分酒浸一分春秋二夏一冬四日取出晒
乾

熟地黃 四兩 生地黃 三兩 懷慶 當歸 酒浸洗三兩

川芎 三兩 白芍藥 三兩 遼人參 三兩 白朮 二兩 黃耆

川牛膝 去蘆二兩 柴胡 去蘆黃連 炒一兩 牡丹皮 去心 二兩

白茯苓 去白二兩半 秦艽 一兩 鱉甲 三兩 醋浸 炙黃色

知母 二兩 貝母 二兩 地骨皮 一兩 乾姜 一兩 玄胡索 一兩

右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧桐子大每服五六十丸漸加至七八十九丸溫酒下或米飲下亦得忌煎炒辛辣之物及苜蓿菜

○補血 新增

附諸方

當歸建中湯 和劑方 治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸去芦四兩 肉桂去皮二兩 甘草炙二兩 白芍藥六兩

右以咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心熱服
人參養血丸 和劑方 治女人稟受素弱血氣虛損常服補衝

任調月候暖下元生血氣令人有子

烏梅肉三兩 熟乾地黄五兩 當歸去芦二兩 人參去芦

赤芍藥 川芎 蒲黃炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九丸溫酒米飲任下

六神湯 御藥院方 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 地黄 芍藥 川芎各一兩 地骨皮

黃芪各一兩

右以咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

補中丸 聖惠方 治婦人虛損諸疾宜常服

川芎 白芍藥 黃芪 當歸 人參
陳皮各五錢 白朮 地黄各一兩

右為禾煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九溫水下
八珍散 瑞竹堂方 調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲食

四物湯 四君子湯

右等分姜三片棗一枚水二盞煎至一盞去滓溫服食前
滋血湯 御藥院方 治婦人皮聚色落心肺俱損血脈虛弱月

水過期益氣養血調進飲食

人參 白茯苓去 川芎 當歸 白芍藥

山藥 黃耆 熟地黃 各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前
滋血湯 大全良方 滋養榮血補婦人諸虛治血氣久冷

當歸 川芎 芍藥 人參 麥門冬

牡丹皮 阿膠各二兩 琥珀七錢 酸棗仁炒

官桂 甘草各一兩 半夏一兩半

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去滓通口
服食前日三服

烏雞煎丸 秘方 治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

當歸 黃芪各六兩 生熟地黃 香附子各四兩

茯苓三兩 人參 官桂 地骨皮 各二兩

右用烏骨白雞一尾男用雌女用雄籠住將黃耆末和炒
麩丸雞頭子大喂雞服生膠吊死腸肚洗淨搗毛搥碎骨
入前菜雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯研共為
細末用汁打糊丸如梧桐子大每服五十丸鹽湯下

○斷子法用白麩麩一升無灰酒五升作糊煮至二升半瀝去滓可分作三服候經至前下日晚次早五更及天明各喫一服經即不一無行則終身無子矣

○廣按婦人無子之因或經不勻或血不足或有疾病或交不時或已調其經而補其血去其病而氣其然夫如是則經調血足無病而交有時豈有不妊娠者乎雖然人之後嗣係乎天命亦或人事未之盡者可不究其心歟

諸病 九十八 新增

壬集

加減四物湯 治婦人諸病

熟地黄 川芎 芍藥 當歸 各等分

右咬咀每服不錢用米一鍾半煎入分不拘時服

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩

○妊娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芪

○血臟虛冷崩中夫血過多加艾葉阿膠

○血崩加生地黄蒲黃黃芩一方加阿膠艾葉黃芩

○血虛腹疼微汗惡風加藜木官桂

○風虛眩暈加秦艽羌活

○氣虛無力加厚朴陳皮

○發熱心煩不得臥加黃連梔子

○虛寒脈微自汗氣短自利加乾姜附子

○中濕身重無力身涼微注加白朮茯苓

○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風藁本細辛

○膈中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡索川棟子

○經水過多加黃芩白朮

○經水澁少加葵花紅花

○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴姜製枳實蘇炒

○經水暴下加黃芩

○血積塊痛加莪朮三稜官桂乾漆炒

○赤白帶下加香附官桂

○血痢加阿膠艾葉黃連

○產後血痢腹疼加槐花黃連罌粟殼

○血熱相搏舌乾口渴加枯蕒根麥門冬

○大瀉引飲加知母石膏

○臟腑秘澀加大黃桃仁

○嘔吐加白朮人參藿香生姜

○虛寒滑泄加官桂附子炮

○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁

○目暴赤作翳加防風羌活防己酒浸龍膽草

加減四物湯大全良方治妊娠產前腹痛及治月事或多或少或
必或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡
露心下宜服

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各一兩

右咬咀每服一兩水一盞煎至一盞去滓食前溫服

○妊娠下血即入艾葉六七片阿膠末一錢同煎病勢甚
入散茶不及以四味各半兩用冰四盞煎至一盞半去
滓分四服食前熱服一日中令盡以止為度

○產乳服至三臈止

○如虛弱血藏不調至一月止

○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加天花粉一
兩麥門冬七錢半

○腹中刺痛惡露不下加當歸芍藥各二錢半

○血崩加生地黄蒲黃各一兩

○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢半

○身熱脈躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩

○大便秘結加大黃半兩桃仁二錢半炒

○如大便滑泄加桂心熟附子各二錢半

○發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥各二錢半

○嘔者加白朮人參各半兩

○腹脹加厚朴枳實各貳錢半

○虛煩不得眠加竹葉人參各二錢半

○煩躁大渴加知母石膏各五錢

○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各二錢半

○虛寒狀類傷寒加入參果胡防風各七錢半

經驗加減四物湯 醫方大成治婦人諸虛不足

當歸 酒浸一宿用身 熟地黄 白芍藥 川芎各一兩

右咬咀爲剉散着病證加減後藥煎服

○血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩

○胎動下血加熟艾一塊阿膠末一錢

○補下元加乾姜半兩甘草七錢

○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩

○便血及帶下加荆芥地椒

○血氣滯腹內刺痛加桂

○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩

○血風勞加荆芥柴胡

○潮熱加前胡乾葛人參黃芩

○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩

○嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢

○產後虛憊血熱煩悶加生地黃

○產後脹脹加枳殼肉桂各三錢

○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

○產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩

○經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥

○血滯不通加紅花桃仁各二錢半

○產後悶亂加茯苓遠志各半兩

○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

○妊娠心腹煩加竹茹一塊

○如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以

生者易之

○大便閉加大黃桃仁各二錢半

八物湯 聖惠方 若經事欲行腹臍絞痛者血澁也宜服

四物湯四錢玄胡索苦練 碎炒黑檳榔木香各一兩

○若經水過多別無証宜服黃芩六合湯

四物湯四兩黃芩白朮各一兩

○若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

○若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合湯

四物湯四兩厚朴製一兩枳實炒五錢

○若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏月不

去黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以

去其寒熱後以四物湯和之

○若婦人血積者四物湯內加京三稜桂廣茂乾漆各二

兩

八物湯 聖惠方 若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜服

四物湯四兩黃耆甘草茯苓白朮各一兩

○若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各五錢

○若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯

○若四肢腫痛不能牽動四物蒼朮各半湯主之

○若治燥結四物湯并調胃承氣湯各半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物理中湯各半

○若大渴者加知母石膏

○若保胎氣令人有子四物湯加縮砂四君子湯各半名

○八珍湯

○若熱毒血相搏口舌乾渴飲水加括葉麥門冬

○若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

○若血崩者加生地黃蒲黃黃芩

○若臟秘結澁者加大黃桃仁

○若頭昏項強者加柴胡黃芩

○若滑瀉者加官桂附子

○若因熱生風者加川芎柴胡防風

○若嘔者加白朮人參生姜

○若發寒熱者加乾生姜牡丹皮芍藥柴胡

○若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

○若虛寒似傷寒者加入參柴胡防風

○若產婦諸証各隨六經以四物每仲景藥各半服之其效如神

○若婦人或因傷酒或因生產去血或虛勞五心煩熱者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黄黃連胡黃連真者溫飲清服

○若虛煩不得睡加竹葉人參

○若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯

○若諸痛有濕者四物去白朮相半加天麻茯苓川山甲酒煎服

○廣按婦人外感內傷一切疾病每丈夫同治惟月候孕產崩漏滯下數證每丈夫異治也夫婦人以血為海婦人伏於人者凡事不得專行每多憂思忿怒也醫書云氣行則血行氣止則血止蓋婦人憂思過度則氣結氣結而血亦結矣又云氣順則血順氣逆則血逆蓋婦人忿怒過度則氣逆氣逆則血亦逆矣氣血結逆於臟腑

經絡之間所以婦人多腹痛諸痛內外煩熱也然或痛煩熱二者不可不分疼痛者血滯也煩熱者氣滯也血滯以辛溫之劑治之氣滯以辛涼之劑治之氣血俱滯而疼痛煩熱者作者又當以辛平之劑治之夫抵婦人血用事氣行則無病而古人治婦人之病多用香附縮砂木香損榔青皮枳殼者行氣故也抑嘗論之凡治婦人之病先問月候緊要以月候如期為安先期而來者血熱也過期而來者血虛也或疼痛或發熱者氣血鬱結也凡婦人之病多是血氣鬱結故治婦人之病以開鬱行氣為主鬱開氣行而諸病自瘥煩熱是二意煩者內煩也熱者外熱也

3302

丹溪心法附錄卷之二十一終

丹溪心法附錄卷之二十一

二十一

