

丹溪心法附餘

卷二十二

諸病門
小兒諸病



丹溪心法附餘卷之二十二

小兒諸病 九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一小盞熬去三分之一去滓用新綿蘸滴兒口中令藥盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年長知瘡無病

小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此類

証並用湯法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末須鯁
蒸汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰
乾焙末調服以平其氣驚有二證一者熱痰主急驚當
吐瀉之一者脾虛乃為慢驚所以多死當養脾急驚只
用降火下痰養血慢驚者先實脾吐後散風邪只用硃砂
安神丸更於血藥中求之

○小兒驀然無故大叫作發者必死是火大發則虛其氣故也

入方

黑龍丸

治小兒急慢驚風

牛膽南星

一兩

青礞石

硝磺等分
煨一兩

天竺黃

兩

青代黑

半兩

蘆薈

二錢

辰砂

三錢

僵蚕

半錢

蜈蚣

一錢半
燒存性

右為末甘草煎膏丸如鷄頭大每服一二丸急驚煎姜蜜
薄荷湯下慢驚煎桔梗白朮湯下

治驚而有熱者

人參

茯苓

白芍

酒炒

白朮

右咬咀姜煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散

見斑疹類

朱砂安神丸

見驚悸類

瓜蒂散

見疽類

痺病或肚大筋青

胡黃連丸

治痺病腹大

胡黃連 半錢去 阿魏 一錢半醋 神麩 二錢去

射香 四粒 炒黃連 二錢去

右為末猪膽汁丸和黍米大每服一二三十丸白木湯送下
又云胡黃連丸十二粒白木湯下

五積丸 治小兒諸般疳積

丑頭末 一兩 黃連 半兩 陳皮 一兩 青皮 半兩 山查 半兩

右炒焦黑色為末每用巴豆霜半錢煎藥末半錢宿蒸餅
丸麻子大小兒二歲十丸五更姜湯下至天明大便泄為
度溫粥補之末利再服三五丸

烏犀丸

丑頭末 三兩 青皮 三兩 史君子肉 七錢半 白蕪荑 二錢半

鶴虱 五錢 蘆薈 一錢燒紅 苦練根皮 五錢

右炒令集黑色為末麩丸麻子大每三五十九丸米飲送下
食前量小兒大小加減

黃龍丸

三稜 三兩 黑角莪木 三兩 青皮 一兩 山查肉 七錢半
乾姜 七錢半

右用麩丸麻子大日晒乾食後姜湯下量兒大小加減
○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積

蘆薈 另研 胡黃連 三錢 炒麩 四錢 黃連
白朮 炒半 山查 炒半 蕪荑 炒一錢

右為末蘆薈和勻猪膽汁丸要米大每六十九食前米飲下

白朮

黃連

苦參

山查

右為末麩糊丸麻子大食後白湯下十五丸

傷胃熱熏蒸

白朮 一兩半

黃連 半兩

平胃散

右用粥丸食後白湯下二十九

心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則異傷乳鋪飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆因乳食不調其肥死節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿下利

腹脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面稿色天骨露齒張腹硬不食者皆危篤矣凡此等類蘆扁腹生疳施其巧

○子熱

炒芍藥

香附

滑石 一兩

甘草 三錢

黃連 二錢

右作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星一兩切用白礬末半兩水泡一搗厚浸曬乾研細入白附子二兩

右為末飛白麩糊丸如芡實大每服一二十丸姜蜜薄荷

湯化下

白附丸

牛膽南星

一兩頂用黃粘牛胆臘月粉南星親手修合風乾隔一年用牛胆頂入二三次者佳

大陳半夏

半兩

粉白南星

一兩切作片臘月雪水浸七日去水晒乾

枯白礬

二錢半

右為末宿蒸餅丸如桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加薄荷葉

紫金丸

治小兒哮喘不止端午日修合

黑椒

四十九粒浸透去皮研如泥次入

人言一錢 鵝管石一錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小

空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熱物服藥病止後更服

白附丸三五貼

白朮

陳皮

青皮

山楂

神效

砂仁

麥藥

甘草

受寒痛者加藿香具萊菔有熱加黃芩

○小兒腹脹

蘿蔔子

蒸紫蘇

乾葛

陳皮

等分甘草

食減者加白朮煎服

小兒好喫粽成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹

茯苓皮

陳皮

赤小豆

蘿蔔子

各半木通

木香

二分甘草

右咬咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三稜

莪朮

青皮

陳皮

神麴炒

茯苓

麥蘖

黃連

甘草

白朮

右為末調服

傷乳食吐瀉加山查

時氣吐瀉加滑石

發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用

吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名方

安膏用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾

黃連

黃芩

陳皮

甘草

右以水煎服 赤痢加紅花桃仁 白痢加滑石末

又方 治小兒食積痢

炒神麴

蒼朮

滑石

白芍

黃芩

白朮

甘草炙

陳皮

右咬咀水煎下保和丸 一方加茯苓

○小兒赤痢壯熱用藍青搗汁每服半錢與之妙

○小兒黑斑紅斑瘡痒癩疹並用防風通聖散為末調服

小兒口瘡

戴云謂滿口生瘡者便是

江茶

粉草

右為末敷之 一方用黃丹

又方

苦參 黃丹
右等分為末敷之

五倍子 青黛

又方

青黛 芒硝
右為末敷口中

又方

黃柏 細辛 青鹽

右等分為末噙之吐出涎不過三日愈亦治大人治胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

○龜胸

蒼朮

酒柏

酒芍藥

陳皮

防風

威靈仙

山查

當歸

痢後加生芋

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連

姜汁炒一錢半

甘草

右用竹葉二十片煎服

又方加人參二錢半作二服入

姜一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

○脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說 或云潰爛陰
丸脫出

入方

木通

甘草

黃連炒

當歸

黃芩

右以水煎服

又方

治脫肛

用東北方陳壁土泡湯洗後洗

又方

治脫囊

紫蘇葉蒸為末乾傳如爛用香油調鵝翎刷 又用青
荷葉包上

小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二者
皆是熱病

入方

百草霜

芒硝

滑石

右為末酒調傳之

重舌用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即嘔內有血非吐血與咳血

入方

黑豆

甘草

陳皮

右煎服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙也

○小兒喫泥胃氣熱故也

入方

軟石膏 黃芩 陳皮 茯苓 白朮

甘草

右用水煎服

又方

臍粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一九瀉出立立瘥

○小兒解顛乃是母氣虛熱多耳

戴云即初生小兒頭二骨未合而開者

入方

四君子與四物子母皆可服 有熱加酒炒黃芩連生

甘草煎服外用帛束緊用白欬末傅之

小兒吐蛇虫

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛 所致錢氏白朮散加香

粒

錢氏白朮散

藿香 白朮 木香 白茯苓 甘草

人參各一錢 乾葛二錢

右為末每一錢至二錢水煎服

小兒口瘡

治法用搗鼻

鬱金 藜蘆 瓜蒂

右為末水調搗之

○小兒禿頭

用白炭燒紅碎長流水令熟洗之內又服酒製通聖散
除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌乾每服一錢水
煎頻服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾即梁上灰塵
黃連白礬為末油調傳

又方

松樹厚皮 燒灰 二兩 黃丹 水秘 二兩 寒水石 一兩 細研

白礬 粘 黃連 大黃 各半 兩 白膠香 熬飛頗石 上二兩

輕粉 四盞或 云四分

右為末熬熱油調傳瘡上頂先洗了瘡痂傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証

松皮 燒灰 白膠香 枯礬 大黃 黃柏

右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡

臘猪油 半生半熟 雄黃 水銀 等分

右研和勻洗淨傳瘡上

又方

川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮 半兩

形波... 卷三

酒白木 酒當歸 一兩半 酒天麻 蒼朮

蒼耳 七錢 黃柏 酒粉草 四錢 防風 三錢

右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單滷頭瘡

松樹皮 厚者燒 白膠香 熬沸傾石 黃丹 一兩 水飛

白礬 火飛 半兩 黃芩 黃連 大黃 各二錢

蛇床子 寒水石 錢 白芷 無名異 炒少許

木香 少許痛 輕粉

右為極細末熬熟油調敷瘡上頂洗淨瘡去痂傳之佳

又小兒瘡

猪牙皂角 去皮 胡椒 小 枯礬 輕粉

右為末樟腦燭油搽七日如櫻桃膿窠去椒

○小兒臍腫汁出

用粘白礬末付或黃柏為末付之 又小兒臍不乾伏

龍肝塗 或用粘礬煨過白龍骨等分付之

○小兒天火丹臍脹起者赤溜不効

蚯蚓泥炒調付

○小兒赤溜 主熱傷血

用生辛木通荆芥苦蕒帶表之類外以芭蕉油塗患處芒
硝濃煎汁洗之 又方雞子清調伏龍肝傅之

○小兒耳後月蝕瘡

黃連 粘白礬

丹溪心法附錄卷之三

右為末傳之

○小兒鼻赤十六

雄黃 黃丹

右同為末，死根水調傳之。又蒼耳葉酒蒸焙乾為末，調服最鮮食毒。又鼻下一道赤者，名曰壘，以黃連末付之。

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉一兩洗 細辛 木通 白芷各半兩

杏仁一兩去皮 木香半兩

右為細末，次用杏仁泥、羊骨髓、豬脂各一兩，同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏，赤黃色為度，於地上放冷，入腦麝香。

一錢，拌勻塗額門上，每用少許塗鼻中。

○小兒變蒸是胎毒散也

○乳兒癰疾痞塊

川芎二錢 生芩 白芍一錢半 陳皮

半夏 炒芩一錢 甘草二分

右作一服，姜三片就煎，下甲末半錢。

○胎熱胎寒 新增

附諸方

醱乳方 楊氏方 解胎中受熱，生下面赤，眼閉不開，大小便不通，不能進乳食。

澤瀉二兩 猪苓 赤茯苓 天花粉

茵陳

甘草各一兩

生地黃二兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母埋去宿乳却服

生地黃湯

楊氏方

治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與此兒服

生乾地黃

當歸

赤芍藥

川芎

天花粉

各等分

右咬咀每服五錢水一盞煎服

當歸散

楊氏方

治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白

四散厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊病並皆治之

當歸

剉微炒

黃耆

蜜炙細辛

黃芩

龍骨

細研

桂心

赤芍藥

各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

釣藤膏 楊氏方 治內吊腹疼

沒藥

乳香

各三錢

木香

姜黃

各四錢

木鱉

十一箇

右先將後三味為細末同煎一味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏香散

魏香散 錢氏方

蓬莪朮

半兩

真阿魏

一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服一

字煎紫蘇米飲空心調下

加寒傷氣痛 楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水
一盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

苗香散 宜明方治小兒盤腸氣痛

苗香 炒 木香 黑附子 金鈴子 去核用皮

蘿藦子 炒 檳榔 破故紙 炒 白豆蔻 煨各等分

右咬咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散 經濟方 治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼

尿如米泔

川練子 二箇去皮核用巴豆一十五粒去皮同炒令豆黃去豆不用

又方 鮮食野菌中毒

用甘草不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服其毒即解

治毒蛇惡犬蜈蚣蝎子咬傷

細辛 白芷 各二錢 雄黃 一錢 麝香 少許

右為末以好酒調一錢

治一切蛇虫作傷百一選方

用貝母為末酒調令病者盡量飲之少頃酒自傷處為水

流出候水盡却以蒸滓傳滄上即愈

治蛇虺蜈蚣咬傷百一選方

用艾於傷處灸三五壯去毒即愈

治蜈蚣諸毒虫所傷經驗方

用清油澄心點燈以傷處於煙上熏之其痛即愈
又方用雞糞塗之

一方 治蛇傷

雄黃

五靈脂

貝母

香白芷

各等分

右為末每服二錢熱酒調服

又方用白礬以滾水泡洗其傷處

治惡蛇所傷 秘方

用青木香不拘多少煎服其痛即止

治蜈蚣咬 秘方

用香附子嚼搽患處立效

一方 治蜈蚣馬蝗腹痛即水蛭

用薄荷湯調服之

定命散

陳氏方

治因剪臍傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣

半條酒炙

川烏頭

三箇生

麝香

少許另研

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口 湯氏方

用白姜蚕為末蜜調塗口唇內即瘥

白姜蚕要自死者

治撮口 聖惠方

用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

一方

取活蝎虎一箇江南名壁虎裝內硃砂細末瓶內封口食砂月餘取出其身赤色陰乾為細末每服一二分酒下大效

一方

用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝟稍七箇共為極細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣包裹須臾小兒冷汗出愈

一方

小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處入射香末少許灸三壯後無臍風

又方 同前

珍珠

四十九粒 研極細

白礬

飛過

蛤粉

黃丹

血竭

各五

棗猫兒

飛取青灰色棗子大頭上有兩角棗上有之陰乾三枚無此味亦可

一方

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚五六寸處先用軟線繩住却於線外將臍咬斷片時去線待血流盡用鵝翎管送蒸一二分入臍大孔內近肚處臍有三孔一孔大以手指輕輕揉散艾灸臍頭三炷結作紅絡軟帛腰裹切勿不可當時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失一 又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行至肚却生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋初發速煎青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方

小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其死而無救良可憫哉一秘法極有神驗世罕知之凡兒患此者齒齙之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥

○鵝口口瘡新增

附諸方

保命散 治小兒鵝口

白礬煨一錢 馬牙硝五錢 朱砂水飛一錢

右為細末每用一字取白鵝糞以水撿取汁調塗舌上願頰內末用藥時先以手指纏亂頭髮指舌上拭舌上垢然

其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難靨也

凡初竟痘瘡可用胡荽酒透房噴之以辟穢濁之氣則痘瘡

易收又急乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則痘瘡不入眼內

若痘疹已出未出之時或瀉瀉或腹脹或氣促謂之裏虛速

與十二味木香散治之以和五臟之氣

若痘疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之

表虛也速與十一味異攻散治之以表六腑之氣

若瘡疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或腹

脹或瀉瀉或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散送

下七味豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣

若總竟傷風身熱未明是與不是瘡疹便宜發散可服四味

升麻葛根湯

若瘡疹始出，下日至五七日之間，雖身熱或腹脹足冷者，或身熱泄瀉者，或身熱驚悸腹脹者，或身熱汗出者，皆不宜服升麻葛根湯。已上四證宜服十一味木香散治之。若瘡疹始出，下日至十日，渾身壯熱大便黃稠，是表裏俱實也。其瘡必光澤起發，肥滿易壓而不致損傷也。

若痘瘡已出發熱口乾煩渴不止者，切不可飲冷水，亦不可食蜜及红柿西瓜等冷物，又不可妄投清涼解毒散等藥。恐冷氣內攻，濕損脾胃，則脹腹喘悶寒戰咬牙，則難治。咬牙者，齒搖也，乃血氣不榮，不可妄作熱治之。若痘瘡雖出不快，皆言毒氣壅盛矣，謂其熱以藥宜利鮮散。

心立止

真黃散 治小兒走馬疳

雞胓膜黃皮不以多少，油燈上燒存性，研細末入黃栢枯，麝射香一字，用米泔水攪口內貼。

立効散 同前

青黛 黃栢末 白礬 煨 五倍子末 各一錢

右為細末，用米泔水攪口內貼。

牙疳散

珍珠 七箇 銅青 一分 白礬 煨 三錢 千里沉石灰 半錢

右為細末，米泔水攪口貼。

一方 治小兒牙疳

用白礬裝於五倍子內合燒過為末貼之

○重舌木舌 新增

附諸方

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛 一錢 龍腦 一字 朴硝 一錢

右為細末用蜜調鵝翎少許付上

一方 治小兒口下生舌名曰重舌 楊氏方

用針刺去惡血即愈

治小兒重舌 千金方

用竹瀝青黃蘗無時點舌上亦有真蒲黃塗亦可

一方 治小兒舌腫塞口欲滿者

用礬末雪 分竹瀝半合細研和勻頻置口中以蠶為度

○胎驚夜啼 新增

附諸方

一方 治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚 湯氏方

用礬砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入射

香當門子泥炒

治胎癰驚風 湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄荷葉裹之以綿扎定火上炙燥
研為末入射香砂少許麥門冬湯下

真珠散 楊氏方 治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡即驚跳
時或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

丹溪心法卷之十一

真珠末 海螵蛸 滑石各一錢 茯苓

人參 白附子各二錢 甘草 全蝎各半錢

朱砂一錢 腦子 射香各半錢 金銀箔五片

石為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許調下

金箔鎮心丹 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥止

啼

全蝎七箇用薄荷包縛慢火上炙乾 天麻煨 防風去芦

羌活去芦 牛黃 赤茯苓去皮 犀角

甘草各錢 射香 辰砂水飛一錢 金箔二十片

右為細末煉蜜丸如皂角子大薄荷煎湯不拘時候服

治小兒夜啼

用蟬蛸二十七枚去足為末入硃砂一字蜜調為丸使

既之

燈花散三四方 治邪熱在心內燥夜啼

用燈花三兩顆研為末燈心煎湯調末口中以乳汁送下

日二服

龍齒散潛察方 治小兒夜啼不往

蟬蛸去趨足洗泥土 鈎藤有鈎子者 龍齒 茯苓去皮

人參各等分

石為末每服一錢水半鐘煎服

乳頭散湯氏方 治夜啼不止腹中疼痛

黃芪 當歸 甘草炙 赤芍藥 木香各等分

右為末每挑少許著乳頭上使吮乳就服之

○變蒸發熱

附諸方

惺惺散 陶氏方 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重

相似傷寒者此藥宜服

人參 去芦半兩 白朮 白茯苓 甘草 白芍藥

天花粉 去芦各半兩 桔梗 去芦各半兩 細辛 二錢半去葉只用根

右為末每服二錢水半盞姜三片薄荷一葉煎服

神仙黑散子 陳氏方 治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其証

若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃 大黃 杏仁 和皮心一錢

右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖處連進之有微汗身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩熱

犀角 剉末一錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡

乾葛 各一兩 甘草 炙二兩

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服

○丹毒蘊熱 新增

附諸方

四順清涼飲子 和劑方 治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉方見火門

牛黃散 和劑方 治五種丹毒

鬱金 桔梗 去芦 天花粉 甘草
葛粉 各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白玉散 錢氏方 治赤遊丹腫

白芷 一兩 寒水石 二兩

右為末米醋調附患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯 湯氏方 治血熱生瘡遍身腫痒

生乾地黃 赤芍藥 川芎 當歸 去芦此本方防風續加各等分
黃芩 減半

右咬咀每服三錢水一盞煎服

防已散 湯氏方 治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎切

防其殺入

漢防已 兩半 朴硝 犀角 黃芩
黃耆 川升麻 各二錢半

右咬咀每服三錢水一鍾加竹葉同煎半鍾溫服

漏蘆散 湯氏方 治五腫丹毒并諸瘡癩

漏蘆 麻黃 去根 連翹 川升麻
川芒硝 黃芩 各二錢 白歛 七錢半 甘草 二錢半

川大黃 一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服

一方 治丹毒發作恐其入腹一時無藥

急以針於紅點處刺出惡血使毒於此而散

一方 治走馬火丹

用景天一名慎火草一名仙指甲不拘多少搗爛取汁塗之即效

土黃散 治赤流丹毒

先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

土硝一兩 大黃末一兩

右二件相合新汲水調拌勻用雞翎蘸時時塗掃

伏龍肝散 應驗方 治赤腫赤毒火毒走注

伏龍肝不拘多少用雞子清調敷赤腫處大效

升麻飲 經驗方 治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴

升麻 黃芩 大黃 各一錢 麥門冬 去心

葛根 朴硝

右為末和勻熟水調下半錢或吹咀作一服白水煎服

五福化毒丹 和劑方 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥頰赤咽乾

口舌出瘡夜卧不寧識語煩渴頭面身躄多生瘡癩

玄參 水洗 桔梗 各二錢 白茯苓 二錢半

人參 去芦 牙硝 各一錢 甘草 炙七分半

麝香 二厘半

右為末煉蜜丸如雞頭大金銀箔為衣薄荷湯化下丸

消毒犀角飲 和劑方 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎

壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍身風疹瘡毒赤癩

及瘡癬已出未出不能快透並皆治察小兒疹痘欲出已出熱尚未解急進此藥三四服快透消毒應手神効

鼠粘子四錢微炒 荆芥 甘草各一錢 防風去苦半錢

一方加黃芩一錢 犀角鑄五分如無以升麻代之

右用水一鍾煎至半鍾服

牛黃丸 聖惠方 治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足常

熱口乾燥

○上焦熱壅

牛黃一錢 天竺黃二錢 鬱金三錢 大梔子四錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜為丸一週兒黃米大服三十九丸乳下三歲小兒菘豆大服三

十九薄荷湯下

導小赤散 錢氏方 治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥悶

亂傳流下部小便赤澁淋閉臍下滿痛

生地黄 木通 甘草各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾竹葉十片煎至半鍾溫服

大連翹飲 活幼方 治小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水

竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則澁盛則淋平涼

心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎怠有之

矣一十五味加湯使用纔覺蘊熱客熱寒邪風邪冒入

肺經心將受之心不受觸傳于小腸或閉或澁或赤或

白淋瀝不通，榮衛不順，壅之作疾，其發多端，以至膈熱、眼目腫赤、唇口生瘡、津液不生、喘喘稠盛，須在表裏俱得其宜，驚風悉能散之，痰熱亦自消除，連翹之功可謂天矣。

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子 牛旁子

赤芥藥 各八分 山梔子 木通 川當歸

防風 各四分 黃芩 一錢二分 柴胡 甘草 各一錢六分

荆芥穗 一錢二分 蝉退 半錢

右用米一鍾半，竹葉十片，燈心十莖煎至一鍾，腫無時

天一丸 韓飛霞方治小兒百病

燈心

用十斤以米粉漿洗晒乾研末入水澄之浮者為燈心取出入藥二兩五錢沉者乃米粉不用

赤白茯苓

去皮兼用茯神去木

滑石

水飛過五兩

猪苓

去皮

澤瀉

去鬚

人參

一斤去芦切片煮濃湯去渣漚淨煉

成膏如錫精可以入藥

一方人參六兩白朮六兩甘草四兩同熬膏亦妙

右燈心等五味各足分兩為細末以人參膏和成丸如圓

眼大硃砂為衣貼金箔任病換引大良小兒生理本天

生水之妙凡治病以水道通利為捷徑也

○廣按小兒陰不能配陽血不能配氣故凡疾作皆屬火

韓先生定此方清心而利小便正所以散火也凡小兒

蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之症用此最當而嘔吐

瀉痢諸症無不治也

人參生犀散 解時氣寒壅咳嗽喘心忪驚悸臍肝或秘
或瀉及一切風熱

前胡 七錢 杏仁 去皮尖 麩炒 桔梗 各二錢 人參 三錢

甘草 炙二錢

右每服三錢水一鍾煎半鍾食後溫服

天竺黃散 涼隔退潮熱

天竺黃 七分 大黃 蟬蛻 各三分 白僵蠶 二分去縷

川羌活 全蝎 去毒 甘草 各五分

右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下

辰砂湯 退虛熱和胃進飲食去心驚和熱
白芍藥 人參 甘草 炙各一錢 茯苓 一錢

硃砂 五分 石蓮肉 五

右為末次入硃砂研勻每服五分薄荷湯調服

甘露飲 解五毒治煩熱

寒水石 石膏 各一兩 甘草 半兩

右為末如解諸毒氣用生姜自然汁調服

甘露飲 解五毒治煩熱

寒水石 石膏 各一兩 甘草 半兩

右為末如解諸毒氣用生姜自然汁調服傷寒時氣作熱

發狂新汲水滴薑汁調服

瀉青丸 錢氏方 治小兒肝經風熱目赤腫痛
當歸 龍膽草 川芎 山梔子

大黃

濕經 嬰煨 卷活

防風 各二錢半

右為末煉蜜丸如雞頭大竹葉沙糖湯化下一丸

三黃丸 全嬰方治小兒諸熱熱治身黃黃疸衄血便血

黃連 去鬚

黃芩

大黃 各一錢半

右為末滴水為丸茶清下三五丸

地膚子湯千金方治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲

便則澀痛不出出少瘀血須更復出

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實

升麻

葵子

猪苓

海藻

橘皮

通草

各三一分 大黃一分

右用水一盞煎至半盞去渣溫服

石菖散

活幼方

治小兒熱淋沙淋石淋

石菖

海金砂

木通

滑石 各一錢

右用水一盞煎至半盞去滓不拘時溫服

八正散

治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋澀方見火類

梔子仁散

湯氏方

治小便不通心神煩熱

梔子仁 五枚 茅根

冬葵花

各半兩 甘草 炙一錢半

右為末每服二錢煎服

勻氣散

御藥院方治小便不通心神煩熱

梔子仁

五枚 茅根

冬葵花

各半兩 甘草 炙一錢半

右為末每服二錢煎服

勻氣散

御藥院方治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮臍痞悶小

御藥院方

治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮臍痞悶小

便不利

桑白皮

二兩

陳皮

去白一兩半

桔梗

炒一兩

甘草

炙兩

藿香葉

半兩

木通

四兩

赤茯苓

去皮一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜一片煎半盞溫服

○中惡天吊 新增

附諸方

蘇合香丸 和濟方

治小兒卒中惡毒心腹刺痛方見氣滯

辟邪膏 楊氏方

治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脈緊細而微者生緊大而浮則死急服蘇合

香丸再以皂角末搗鼻次服沉香降氣湯加入參茯苓不

愈進以辟邪膏無不効者客忤亦可服

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨

鬼臼

龍膽草

人參

茯苓

各半兩

右為末入雄黃半兩麝香一錢煉蜜為丸乳香湯化下及

令兒帶燒卧內尤妙

沉香降氣湯 方見氣滯

九龍控涎散 楊氏方

治小兒蘊熱痰寒經絡頭目仰視名為

天吊

滴乳香

一錢 別研

天竺黃

二錢半

雄黃

二錢 別研

臙茶

二錢

白礬

一錢 煨

甘草

二錢 炙

荆芥穗

一錢 炒

菘豆

一百粒 半生 半炒

赤脚蜈蚣

一條 酒浸

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯下

行痰心法付論卷之三十二

二

釣藤散 湯氏方 治小兒天吊潮熱

釣藤 人參 去蘆 犀角屑 各半兩 全蝎 二錢半

甘草 灸一錢 一分半 天麻 二錢半

右為末 每服二錢 煎至半盞 溫服

牛黃膏 治小兒風癇迷悶 抽掣涎潮

牛膽南星 依前製 全蝎 去毒 蟬蛻 去足 各二錢半

殭蠶 去絲 白附子 防風

天麻 煨各一錢半

右為細末 蒸棗去皮核 取肉 研為丸 如小豆大 用荆芥生

薑同煎湯 研化食後遠服

斷癇丹 楊氏方 治癇即愈 而後作者

黃耆 蜜塗 灸

釣藤 鈎子

細辛 去苗 葉

甘草 灸各半兩

蛇退 三寸 酒灸

蟬殼 四箇 去土

牛黃 一字 別研

右為末 棗肉為丸 如麻子大 煎人參湯下 一歲十丸 大小

加減用

細辛大黃湯 湯氏方 治風癇熱癇

細辛 去苗 炮 大黃 炮 防風 去蘆 各一兩 甘草 灸二錢半

右咬咀 每服二錢 水半盞 加犀角屑少許 煎服

竹瀝膏 湯氏方 治小兒諸癇

白朮 蜜炒二錢半 大附子 去皮 臍 犀角 鎊末 各一錢

厚朴 半草水 煮焙 乾二錢半 定慢火 炙黃 色 金蝎 七箇 每一箇用大葉薄 荷 畏湯 泡 麻黃 令軟 纏

行矣心未計余未三三二

右為未取竹瀝為膏丸黑豆大每服用金錢薄荷湯化下
一丸隨兒大小加減

至寶丹 錢氏方 治諸癇急驚卒中客忤並宜服之

安息香 一兩半為末無灰酒飛過瀝過沙石
約取一兩慢火熬成膏入蒸肉用

琥珀 研 硃砂 雄黃 各一兩 研水飛 銀箔 五十

龍腦 射香 各二錢半 牛黃 各研 生烏犀角

生玳瑁 各一兩 金箔 五十片一
半為衣

右生犀玳瑁搗羅為細末入餘藥令勻將安息香膏以重
湯煮凝成搜和為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子大二
歲服二丸人參湯化下大小量意加減

一方 醫方集成 治小兒癲癇及婦人心風諸疾

用茸遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和茸遂末將
猪心批作兩片以藥入在內用綿縛定以皮紙包裹水濕
入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末一錢
和勻分作四丸每服一丸猪心煎湯化下再服別取猪心
煎湯此方神效

龍腦地黃膏 宜明方 治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天吊

驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病不愈
與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃 別搗 甘草 各半兩 雄黃 水窟者一
別搗

麝香 一錢 生腦子 分別研

右五味各製了再入乳鉢內研細煉蜜為膏油單裹如右

煎病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如小兒大人睡驚
及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服新汲水下大解暑毒
如孕婦人常服永生男女永無疾病如有大人陽毒傷寒
加輕粉二匣龍腦少許水化下一丸杏核大小兒看年紀
大小加減服立効

分股散宜明方治小兒卒風大人人口眼喎斜風涎暴心驚癇

天吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

巴豆半兩不出油 川大黃一兩 朴硝半兩

右大黃為末後入巴豆霜朴硝一處細研用油單貼起如
右前患每服半錢熱茶下吐下頭眩即愈如小兒咽喉緊
閉及驚吊等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下

時上吐下泄微瀉以吐利得快為效大人半錢小兒一字
看虛實加減只是二三服見効不宜頻服如吐瀉不定以
葱白湯立効

○急慢驚風 新增

附諸方

牛黃清心丸治小兒諸病狂亂驚癇痰涎壅塞精神昏憤見中風

一方治小兒口禁牙關不開諸病不効者

用天南星末一錢腦子少訶研勻用紙蘸生姜自然汁溫
一藥於左右大牙根上搽之便開

金箔鎮心丸和劑方治風痰壅熱心神恍惚急驚搐搦

紫河車黑豆末煮 山藥一兩 甘草五錢

煎二錢半

牙硝一錢 射香研半 金箔十二片 龍腦一錢
茯苓五錢 朱砂研飛一兩 人參五錢

右為末煉蜜成劑每兩作五十九以金箔為衣每服一丸
薄荷湯下常服安心止驚散邪涼膈

抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木
水生火謂我生者父母也肝為母心為子母安則子安况
心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理嬰孩
諸驚四時瘟疫和熱以致煩燥不寧痰嗽氣急瘡疹欲出
發搐並宜投此其藥性溫平不僭不燥常服驅風化痰鎮
心鮮熱和脾胃益精神

琥珀 人參 天竺黃 檀香

白茯苓各七錢半 甘草炙一兩 枳殼麸炒 枳實麸炒各五錢

辰砂水飛二兩半 白山藥入兩炒 牛膽南星炒五錢
金箔五十片

右各味為細末和勻取新汲水丸如芡實大陰乾用葱白
煎湯或薄荷湯痰壅嗽甚姜湯調化服

南星膏 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭常服去風
退熱消痰鎮心除百病

牛膽南星臘月黃牛膽將南星研和汁盛 人參

白朮 山藥 白茯苓 茯神去木 羌活
甘草炙各三錢 白僵蠶去嘴炒 全蝎去毒薄荷湯浸各三錢

辰砂二錢水飛別砂 射香一字

右為細末入辰砂麝香研勻煉蜜丸如芡實大金箔為衣
薄荷湯調化食後服

天麻丸 湯氏方 治急驚風四肢拘急壯熱口噤

天麻 雄黃 烏蛇肉 蟬殼 乾蝎

射香 細研 天竺黃 細研 桂心 天南星

白附子 膩粉 白芷 半夏 湯泡七次 各一分

右為末煮棗肉丸如棗豆大每服三五丸薄荷酒送下

珍珠丸 全嬰方 治小兒急驚風發搐涎潮壯熱及痰嗽壅塞
肚腹脹硬

白附子 一錢泡 滑石 一錢 巴豆 十五粒 去油

輕粉 一錢 天南星 一錢製

右為末麩糊丸如棗豆大二歲一二丸葱白湯送下
一方加蝎尾半錢炒

牛黃奪命散 拔萃方 治小兒肺脹喘滿肉高氣急兩脇肩動
陷下作坑兩鼻竅張胸亂嗽滑聲暖不鳴痰涎潮塞俗云
馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛 半生半熟 黑牽牛 半生半熟 各一兩 川大黃 二兩

檳榔 半兩 廣木香 三錢

右為一處研作細末入輕粉少許每服一錢用蜜水或漿
水調下不拘時候微利為度

驅風膏 全嬰方 治小兒肝風筋脉拘急面赤目青眼驚搐連
割及胎風

辰砂

蝎尾炒

當歸

草龍膽

川芎

山梔子

川大黃

羌活

防風去芦

甘草

各一錢

右為末入射香少許煉沙糖丸如雞頭子大二歲一丸薄荷竹葉蜜湯化下

瀉青丸 聖惠方治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物目直視

不搖得心熱則搖身反張強直目連斜或目內青或臟腑

發泄諸藥不止脾虛肝盛者見丹毒

○廣按已上二方皆瀉肝經風熱之劑也夫小兒肝常有

餘餘脾常不足故急驚風乃肝氣有餘宜用瀉青丸之類

瀉之慢驚風乃脾氣不足宜用醒脾散之類補之

大效疎風散

治初方

治嬰孩小兒驚熱痰風四證聚結於胸

臆之間令兒昏困沉重悶竅不通諸脈氣閉所以默默欲

食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐利宜與

服之立見甦省

錦文大黃 一錢半

雞心檳榔 一錢

朴硝

黑牽牛

七分半炒

陳橘皮 去白一錢

右為末二歲兒服半錢蜜少許薄荷湯調下看大小加減

服之

紅綿散 湯氏方治文驚傷寒

麻黃

去節

全蝎

炒

甘草

炙

天麻

大黃

溫紙

白附子

蘇木

炒各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

丹溪心法附錄卷三十一

三十四

全蝎觀音散 治慢驚慢驚者因久吐瀉而脾胃先虛脾胃
與肝母子也母虛亦令子衰二經俱虛則生頑涎頑涎者
脾肺所出也涎則滯流在於咽喉如水雞之聲時復喫痰
是也此方主之

全蝎去毒十箇 天麻煨 防風 白芷

黃芪蜜炙 甘草 茯苓各二錢半

人參二錢 白扁豆姜汁去皮

右為細末用棗肉煎湯調勻不拘時候

烏蝎回春子湯 治小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參 白朮 茯苓 甘草 川烏去皮

全蝎去毒炒各

右咬咀姜三片棗一枚去滓同煎食前服

理中湯 治小兒吐瀉手足厥冷加附子名附子理中湯回

陽方見中寒

八仙散湯氏方 治慢驚虛風

天麻 白附子 花蛇肉 防風去蘆

南星 半夏麴 冬瓜子 全蝎各等分

右咬咀每服一錢水半盞姜棗薄荷煎服加川烏尤妙

釀乳法湯氏方 治慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治

人參 木香 藿香 沉香 陳皮

神麴 麥蘖各等分 丁香截半

右咬咀每服四錢水一碗姜十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶

內煮至半碗乳母食後埋奶汁服之即便卧霎時令藥入乳之絡次令兒吃不可過飽亦良法也

吉州醒脾散 湯氏方

人參 去芦 橘紅 甘草 炙 白朮 白茯苓

全蝎 各半 木香 半夏 麩 各二錢 白附子 炮 四箇

陳倉米 二百粒 南星 炮 一箇

右為末每服一錢水半盞姜二片棗三枚煎服

木附湯 如方 治慢脾風身弓髮直吐乳食睡汗流不已

大附子 一箇炮 白朮 一兩煨

木香 半兩 肉豆蔻 一箇麩煨

甘草 半兩

右為末每服二錢水半盞姜二片棗二枚煎服

○唐按此方用附子不必疑蓋小兒慢驚風皆由吐瀉後

脾氣大虛時作痰涎非若急驚搐搦之緊猛也此方溫

寒燥溢行氣健脾適合其宜

神效萬金丹 瑞竹堂方 治小兒慢驚風急驚風十無一失

硃砂 研細末 真輕粉 研細末

右二味各等分不以多少用青蒿內取兒取出於淨磁盞

內將硃砂輕粉以虫汁就成丸如黃米大量兒大小加減

服之半歲一歲小兒服一丸乳汁送下如取虫時法止於

七月初五日取蒿虫則靈驗

一方 治急慢驚風神效

丹溪心法附錄卷之三十一

三十六

硃砂一分 輕粉一分 姜蚕七箇 炒 全蝎三箇 去毒 炒

右為細末，用人乳汁調服。詩曰：七箇姜蚕三箇蝎，一匙硃砂一片雪。不論急風與慢風，用時須用法人血。

天麻防風丸 和劑方 治一切驚風壯熱痰盛驚悸

自姜蚕 死者去絲嘴 半兩 天麻 煨 防風 人參 各一兩

牛黃 一錢 砂 全蝎 去毒 炒 半兩 硃砂 雄黃

射香 各一錢 半 細研 甘草 炙 二兩

右為末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服三丸，薄荷湯化下。

大天南星丸 和劑方 治小兒急慢驚風，涎心發搐，目睛上視。

天南星 牛膽制 半兩 硃砂 三錢 別研 腦子 人參

乳香 各半兩 別研 全蝎 十四箇 去毒 炒 射香 一錢 半

牛黃 天麻 防風 各二錢 半

右為末，煉蜜丸，如鷄頭大，每服一丸，荆芥薄荷湯下。

奪命散 湯氏方 治急慢驚風痰潮壅盛，滯塞於咽喉，間命在。

厚皮服此，蒸者無有不愈。

青礞石 一兩 入沙鍋內 同煨消 一兩 用白炭火 煨令通 紅 須消 盡 為 灰 候 藥 冷 如 金 色 取 去 研 為 細 末

右為末，急驚風痰發熱者，薄荷自然汁入蜜調服，慢驚脾

虛者，以青州白丸子再碾煎稀糊，入熟蜜調下，神效。青州

白丸子 方見中風

抱龍丸 治痰嗽驚風，時作潮熱。

牛膽南星 一兩 天竺黃 半兩 辰砂

雄黃 各二錢 半 射香 一錢 別研

右為末煉蜜丸如芡實大甘草薄荷湯化下丸

生珠膏 切切方 治急慢驚風

天麻 二錢半 硃砂 二錢 姜蚕 二錢 白附子 煨二錢

全蝎 二十箇 黑附子 二錢煨 射香 半字

蜈蚣 一條 南星 一錢半煨 花蛇 酒浸炙乾

右為末和勻煉蜜丸如鷄頭大每服一丸金銀箔薄荷湯

化下

○廣按用附子者孰則流通痰火之理也

太青膏 錢氏方

全蝎尾 去毒生 硃砂 研一錢 青黛 研一錢 天麻 一錢

天竺黃 一字 白附子 生一錢 射香 一字

烏梢蛇肉 酒浸焙乾取

右為末蜜和成膏每服一丸如皂角子大同半黃膏滋薄

荷湯化一處服之五歲以上同甘露散服 方見中書

牛黃膏 聖惠方 治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止煩熱

甘草末 二錢半 雄黃 一錢 川甜硝 二錢半

蒙豆粉 兩半 寒水石 生一錢 片腦 二錢

鬱金末 一錢

右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂角子大食後服

辰砂保命丹 秘方

射香 一錢 南星 炒 白附子 炮 硃砂 各半兩

蛇含石 四兩煨七次用米醋淬後用瓦焙

右件為末用端牛捺火為定用金箔點號若急驚薄荷湯下
下慢驚荆芥湯化下熱驚薄荷湯下風驚荆芥湯下
備急丸 應驗方 治急慢驚風

右以五月五日取地龍數條用竹刀分中截作兩段看地
龍跳得急者慢者各另處研爛用硃砂末同研和勻得
所丸如小菘豆大急驚用急跳者慢驚用慢跳者用金錢
薄荷湯送下量大小加丸數如合藥後分明寫記急慢各

另包裹收頓

愈風丹 儒門事親方 治大人小兒一切諸風

芍藥 川芎 白僵蚕 桔梗
細辛 去葉羌活 各半 麻黃 去節 防風 去芦

白芷 天麻 全蝎 各一 甘草 三錢

天南星 半兩 姜制 硃砂 半兩 為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下

全蝎散 直指方 治小兒驚風

人參 陳皮 各一 全蝎 炙一 甘草 炙半
南星 溫紙裹 煨三錢

右吹咀每服一錢水半鐘紫蘇姜棗煎服有熱加防風

硃砂丸 宣明方 治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取
驚積

硃砂 天南星 芭豆霜 各半

右為末，麩糊丸黍粒，大有病，虛實大小，每服二丸，或天吊
載上，每服四五丸，薄荷水下，立愈。
珍珠丸，宜明方治小兒，虛中積熱，驚癇等疾。

芭豆霜

膩粉二錢

滑石三錢

天南星

粉霜

各二錢半

蝎梢

續隨子

去皮各二十筒

右為末，研令極細，以糯粥為丸，如黃米，大小兒一歲以下，
每服三丸至五丸，十五歲每服五丸至十丸，茶湯下，荆芥
湯亦得量，虛實加減。

松風羌活散

散風邪，止驚搐，退肌熱。

羌活

粉草

天麻

茯苓

川芎二錢

荆芥穗

白僵蚕炒

白朮

白附子

炮各一錢

桔梗二錢

防風一錢

半一歲

全蝎

半錢去

刺炒

硃砂

五分

天南星

一字炮

右為細末，薄荷湯調下，如傷風鼻塞流涕，葱白湯下，
喘嗽氣促，桑白皮湯調下，若常服，白湯亦可。

真珠天麻丸

驚風痰熱，壅盛及撮口。

南星炮

天麻炮

白附子

炮各一錢

巴豆霜

十七箇粒去油

全蝎炮

滑石

二錢半

防風

半夏

姜汁炒各一錢

右為細末，麩糊丸如小豆，大百草霜為衣，每服五六丸，
淡姜湯下。

至聖保命丹

胎驚吊腹，目上視，手足抽掣，角弓反張，痰盛

急慢驚風

全蝎 十四枚 去毒

防風 五錢

白附子 炮

南星 炮

蟬蛻 去土

僵蚕 直者各一兩

天麻 五錢

硃砂

射香 各一錢

金箔 十片

右為末，後入硃砂射香和勻，以粳米餅為丸，如芡實大，每服一丸，金錢薄荷煎湯化下，急者二丸。

青珠丸 急慢驚風痰熱往來

天麻

半夏

南星

白附子

川烏 各二錢 頭尾全

乾蝎 七枚

姜活 二錢

硃砂 一錢為衣

姜蚕 七枚

青黛 一錢

右用研入巴豆七粒，去油，研勻，麩糊為丸，如黍米大，每服

五九金錢薄荷湯下

如驚睡瀉得青色是驚積，白色是

疳積赤色是熱積

安神散 治搐搦

用全蝎四箇，塘水浸一宿，南星大者一箇，開一穴，入蝎在

內，以南星末蓋其口，用麩火煨令赤色，取出，放地坑土

宿，去南星，用蝎為末，每服一字，磨力水調下。

犀角散 虛風有涎，胃氣弱，或吐乳，喉中作聲。

酸棗仁

麥門冬 去心

人參

白附子

茯苓

去皮各二錢

硃砂 一錢

右為細末，每服半錢，磨犀角湯下，日二服，此藥壓穀，過熟

安心定神

照驚丸 初劑方治心蘊和熱怔忡不安睡中驚啼風痰壅盛

茯苓 去皮 鈇粉 蛇黃 煨醋 南星 炮

史君子 去核各 腦子 半兩 別研

右為末糯米糊丸如皂莢子大硃砂為衣薄荷湯調下

安神丹 御藥院方治小兒心神不寧困卧多驚痰涎壅盛

硃砂 二錢 人參 二錢 乳香 半兩各 酸棗仁 炒去皮下

遠志 去心二 錢半

右為末蜜丸如榛子大金箔為衣每服一丸人參湯化下

寧眠散 御藥院方治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星 炮製 人參 去芦 白附子 炮各 乾蝎 二十箇 半兩 乳香 各二 錢半

乾赤頭蜈蚣 一條酒浸酥 灸微黃 血蝎 各二 錢半

右為末每服一字用水酒少許浸薄荷酒下

寧心膏 全要方治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如人

將補眠睡驚壓常服鎮心除百病

人參 去芦 白朮 白茯苓 去皮 茯神 山藥

薤活 甘草 各一 硃砂 二錢 腦麝 各一 錢

右為末煉蜜丸如鷄頭大一歲一丸薄荷湯化下

○五疳五軟新增

附諸方

蘆薈丸 湯氏方治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

黃連 去鬚 龍膽草 蕪荑 各一兩去皮先炒黃色次

右各件為末別入蘆薈末二錢半和勻飯飲丸如黍米大

隨大小加減空心米湯下

驚甲散 湯氏方治疳勞骨蒸

驚甲 九助者沸湯浸洗 黃芪 蜜炙 白芍藥 各一兩

生熟地黃 當歸 去芦洗 人參 去芦各半兩

地骨皮 半兩

右吹咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸 湯氏方治骨蒸痔瘡肌體黃瘦

木香 半兩 宣黃連 生地黃 銀州柴胡

驚甲 九助者沸湯浸洗令淨次 青皮 各一兩

石為末猪肚一枚入藥於內麻繩纏定於沙鍋內煮熟取出細研為丸如麻子大米飲下大小加減不拘時

大胡黃連丸 湯氏方治驚疳腹脹面動多睡肌躄黃瘦五心煩熱

胡黃連 黃連 苦練子 各兩 白蕪荑 去皮半兩 炒

乾蟾頭 二錢半 燒存性 蘆薈 二錢 射香 二錢

青代黑 二兩

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆一枚在內却用油單紙一層覆之蒸熟又入後四味麩糊丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後卧時日三服 龍膽丸 和劑方治小兒疳發熱

龍膽草 去芦 黃連 青皮 史君子 去穢各一錢

右為末猪膽汁丸如蘿蔔子大每服二十九以意加減臨

一卧温水下

胡黃連丸 直指方治小兒熱疳

胡黃連 各半 川黃連 各半 硃砂 二錢半

右為末入猪膽內繫定懸於銚中煮時又取出入蘆
蒼菁黛各二錢半去足蝦蟆灰二錢射香少許粳米飲丸
如麻子大每服十丸米飲湯下

蘆蒼丸 陳氏方治小兒五疳

蘆蒼 去皮 青黛 各二錢半 真射香 少許
檳榔 各二錢半 宣連 半兩 積猪膽 一箇
蟬殼 二十箇

右為末猪膽丸如麻子大每服五十九飯飲吞下

肥兒丸 和劑方

治小兒疳病夫小兒疳病者多因關乳喫食
太早以致脾胃受傷虛而生濕濕而生熱濕熱太甚所以
生虫日漸羸瘦腹大髮豎不能行步面黃口臭發熱面無
精采此藥殺虫退熱進食

神麩 炒 黃連 各一兩 麥蘖 炒 肉豆蔻煨
史君子肉 各半兩 枳榔 木香 各二錢

右為細末猪膽汁并麩糊為丸如粟米大每服五十九
用米湯送下食前

疳丸 子瑞竹堂方治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心
腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癥乳癖
疝氣痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳食及療

五腫痲疾八種痢疾肌肉消瘦氣僉腹大神氣昏憤情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑進飲食生肌肉悅顏色功効非常不能盡述

蘿蔔子一兩 微炒 陳皮去白 青皮去月 三稜炮

蓬朮炮各半兩 黑牽牛七錢半半生半熟 胡椒二錢半

木香一錢半分

右為末麴糊和丸如菘豆大空心用蘿蔔子煎湯送下或生薑湯亦可量兒大小加減丸數

○廣按此藥緊峻去病有功病退則已不可過服恐傷正氣

蘆薈丸 和劑方 治疳氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿頭髮作穗

標鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來目澁口臭齒齕黑爛常服長肌肉退黃殺疳虫進食

大皂角 乾蝦蟆已上等分同燒存性為末一兩入下項藥

青黛二錢半 蘆薈 硃砂 射香各一錢

右研勻湯浸蒸餅和丸如麻子大每三歲兒服二十九不計時米湯下量大小加減服

史君子丸 和劑方 治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復疔痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

史君子去皮一兩 厚朴制 陳皮去白 川芎各二錢半

右為末煉蜜為丸如皂子大三歲一丸陳米飲化下
○廣按此方用藥平和可以久服

六神丸 全嬰方治小兒疳氣消瘦臟腑怯弱泄瀉虛滑乳食
減少飲食無度心腹脹滿

木香

丁香

肉豆蔻

麩果煨

訶子

炮去核

史君子

炮去皮各半兩

蘆薈

一兩

右為末棗肉和丸如菜豆大三歲三十九米湯下

○廣按疳本濕熱宜用苦寒藥今此方用苦溫藥何也殊不知再久泄瀉虛滑則為溫寒宜用苦溫藥本草云苦寒去濕熱苦溫去濕寒是也

大蘆薈丸 發明治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

蘆薈

木香

白蕪荑

雷丸

青皮

鶴虱

微炒各半兩

右為細末粟米飯和丸如菜豆大米湯送下二十九無時
集聖丸 治小兒疳病通用

芫薺

五靈脂

好夜明砂

砂仁

陳皮

青皮

莪朮

木香

史君子

煨各二錢

黃連

蝦蟇

日炙焦各三分

右為末用雄豬膽二枚取汁和藥入糝糊丸麻子大每服
十五丸米飲送下

大蘆薈丸 治諸疳

蘆薈

蕪荑

木香

青黛

檳榔

蟬殼

黃連

炒各二錢

胡黃連

半兩

射香

少許

右為末猪膽汁二枚取汁浸糕為丸麻子大每服二十九
米飲下

黃連丸 治痢疾

黃連 半兩 蕪荑 去皮 史君子 去殼半兩 洗淨研

右為末用雄雀膽丸如菘豆大每服二十九米飲空心送

下

蘆薈丸 治痔殺虫

蘆薈 半兩 史君子 焙 三稜 生 石榴皮 焙

草龍膽 生各五分 苦練根 焙少許

右為細末麴糊丸如蘿蔔子大每服五丸量大小加減米

飲送下再執麥門冬湯下

布袋丸 治諸痢疾回黃腹大飲食不潤肌膚

夜明砂 棟淨 蕪荑 炒去 史君子 肥白者微炒去 皮各二兩

白茯苓 去皮 白朮 無油者 人參 去芦

甘草 芦薈 細研 半兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如彈子大每用一九以生絹袋
盛之次用精猪肉二兩同藥一處煮候肉熟爛提取藥於
當嵐處懸掛將所煮肉并汁令小兒食之所懸之藥第二
日仍依前法煮食只待藥盡為度

六神丸 治諸痢

木香 濕紙 畏煨 黃連 去鬚 神麴 川練子肉

蘼蕪 麥蘖 炒各 等分

丹溪心法卷之二十一

四十七

右為細末以雄猪膽蒸熟為丸如麻子大每服三四十九
量大小加減米飲送下

肥兒丸 疳病蒸熱腹脇脹滿面色萎黃飲食遲滯大小便澀

交蘗炒 川黃連 大蕪荑 神麴炒

胡黃連各半

右為末以雄猪膽汁丸如麻子大每服三十丸食前米飲
送下乳母忌食酒麪生冷

如聖丸 冷熱痔瀉

胡黃連 川黃連 蕪荑 史君子各一兩 去皮

射香五分 研 乾蝦蟆五箇剉碎 酒熬成膏

右為末以蝦蟆膏子丸如麻子大每服三十九丸參湯下

肉棗丸 肉痔而瘡侵入口鼻

用肉棗二枚去核入青礬如核大在內以火煨存性為末
入射香少許清油調塗

煮肝散 再眼翳膜羞明不見物

夜明沙 蛤粉 穀精草各一兩

右為末每服一錢五七歲以上二錢用雄猪膽如匙大一
片批開糝葉在內攤勻以麻紫定米泔水半碗煮肝熟撈
出肝頭湯碗內薰眼分肝作三次嚼食仍用肝湯嚥下日
三服不拘時如大人雀目空心服至夜便見物如患日久
不效日作二服見效

小葺丸切切方 治胎中受熱遍身筋軟

丹溪心法附錄卷之三

丹溪心法附錄卷之三十一

鹿茸 川牛膝 肉苁蓉 木瓜

杜仲 鬼絲子 當歸 熟地黃

天麻 青鹽 各等分

右為末用煉蜜為丸如菉豆大鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散 切切方治小兒面紅唇白肌熱項軟

熟地黃 酒浸 白茯苓 羚羊角 酸棗仁 炒

虎脛骨 炙 肉桂 防風 甘草 各等分

右為末溫酒鹽湯化下皆可

羚羊角丸 揚氏方治小兒五六歲骨氣虛筋脈弱不能行者

羚羊角屑 白茯苓 去皮 防風 去芦

虎脛骨 塗醋炙 酸棗仁 炒 生苜 各半

黃芩 桂心 當歸 炒二錢

右為末煉蜜丸如菉豆大食前以溫酒研破三五丸服之
一月漸漸即可行也

○吐瀉痢瘕 新增

附諸方

觀音散 和劑方治小兒外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進

乳食

石蓮肉 炒去心 二錢半 白蘆豆 錢一 茯苓 一錢半

人參 一兩 神麩 炒二錢 白芷 綿黃芪

木香 甘草 各一錢

全蝎觀音散 和劑方治小兒外感風冷內傷飲食脾胃受傷

丹溪心法附錄卷之三十一

嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸瘦大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進飲食及治吐瀉致虛將成驚風

- 石蓮肉 人參去芦 白扁豆各一錢二分半 全蝎炒
- 天麻 木香 甘草灸去 羌活
- 防風去芦 白芷 黃芪各半錢 神麩一錢
- 白芷苓去皮七分半

右為末每服二錢乳汁調服或咬咀每服五錢用水一盞棗子煎服

人參白朮散 錢氏方 治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困失治

變成風癩不問陰陽虛實並宜服之

- 人參去芦 白朮去皮 木香
- 藿香去土 甘草各五分 乾葛一錢

右咬咀用水一盞煎至半盞去滓溫服

異功散 錢氏方 溫中和氣 治吐瀉不思食凡治小兒虛冷病先於數服以正其氣

- 人參去芦 白朮 白茯苓去皮 甘草灸
- 橘紅各一錢

右用水二盞生姜三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

醒脾散 集成 治小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉默默不食

木香 天麻 人參去芦 白茯苓去皮
白木 甘草炒 白僵蚕炒 白附子各半
全蝎二分半炒

右用水一盞 生姜三片 棗子一枚 煎至七分 去滓 溫服
辰砂益元散 應驗方 治小兒中暑吐瀉 小便赤少 夜卧不寧
心煩 作渴 常服 寧心 解熱

益元散 一兩 辰砂一錢
右研勻 每服五錢 用燈心竹葉湯調服 如嘔吐 生姜湯調服

黃連香薷飲 全嬰方 治小兒陰陽不順 清濁相干 霍亂吐瀉
體熱煩燥 昏目多渴

厚朴去皮姜制 黃連二味與生姜汁拌炒作紫色七分半 香薷三錢
右咬咀 一服用水一盞 酒半盞 煎至七分 去滓 水中頓冷服

一方加白蘆豆炒七分半

黃龍丸 全嬰方 治小兒中暑吐瀉 胃悶煩渴 昏迷身熱 有痰

半長二兩米醋 白茯苓 甘草各半兩
右為末 生姜汁煮麩糊為丸 如小豆大 每服二十丸 煎生
姜灯心湯送下 量大小加減丸數

五苓散 全嬰方 治大人小兒中暑伏熱 煩渴 身熱 頭痛 霍亂
吐瀉 小便赤少 心神恍惚

澤瀉一錢 白木一錢五分 猪苓一錢 肉桂一錢

赤茯苓一錢

右為細末每服一錢熱湯調下不拘時服加辰砂各辰砂五苓散去辰砂加生料平胃散用蒼朮橘皮甘草厚朴二方共一處生薑棗子同煎名胃苓散

香朴飲子

集成

治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚狀

人參

去芦

白茯苓

去皮

甘草

炙去皮

紫蘇

木瓜

澤瀉

香薷

半夏麴

白蘆豆

陳皮去白

烏梅

厚朴

各四兩

右用水

一盞煎至七分去滓溫服

玉露散

一名甘露飲

治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體熱頭眩或伏熱吐瀉亦作傷風熱熱煩渴

石膏

寒水石

各一兩

甘草

半兩

右為細末每服五錢灯心湯調下暑熱冷水下吐不止生

姜湯下

人參散

宜明方

治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參

一兩

茯苓

二兩

生犀

桔梗

各二錢

甘草

乾葛

各半兩

右為末每服用一大錢水一鍾如入灯心五莖同煎至六分溫服無時煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減服內救散 調氣進食止瀉嘔

木香

人參

白朮

茯苓

甘草

茯苓

各等分

藿香

行氣心法附錄卷之二

五

右為末每服一錢米飲調下

益黃散 錢氏方治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並皆治

之

丁香 四錢不見火 訶子 炮去核 青皮 去白各一兩 甘草 炙

陳皮 去白二兩

右為末每服二錢水半盞煎食前服

藿香散 經濟方治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

藿香 一錢 丁香 人參 白朮

茯苓 神麩 匾豆 各半錢

右為末每服半錢白湯調下下方用紫蘇木瓜湯調下

硃沉煎 按碎方治小兒嘔吐不止

硃砂 二錢飛過 沉香 二錢 藿香 二錢 滑石 半兩

丁香 十四箇

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油點成花子炒藥在上頂更墜瀝去水却用煎水送下

助胃膏 湯氏方治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻 十四箇 木香 炮二錢 縮砂仁 四十箇

乾山藥 一兩 肉豆蔻 四箇炮 人參 去芦

白朮 白茯苓 甘草 各半兩

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下 下方煉蜜為丸

如芡實大一歲下丸米湯調下

訶子湯 湯氏方治臟寒泄瀉

開漢心法附錄卷之二

訶子

炮取

人參

去芦

白茯苓

去皮

白朮

各一兩

木香

炮

陳皮

去白

甘草

炙

肉豆蔻

各半兩

右為末每服二錢水一盞姜二片煎半盞溫服寒甚者加附子

白朮丁香丸

水瀉脾虛飲食不進水穀不化

白朮

丕油者二錢半泔水浸半日切焙

半夏

一錢半湯泡七次

丁香

半錢微炒

右為細末用生姜自然汁煮糊為丸如梧桐子大十歲上下可服二十五丸七八歲二十丸五六歲十四五丸二三歲十丸週歲五七丸用姜湯或米湯無時送下一服不止日進二服新洩一服見效舊洩三服即止

乳豆丸 應驗方治小兒傷冷泄瀉滑腸不禁面青腹痛

肉豆蔻

麵裹煨三箇

乳香

二錢

右為末麵糊為丸如菉豆大米湯下三十丸

紫霜丸 治宿滯不化胸腹痞滿泄瀉如痢當以乘推利

杏仁

五十箇去皮尖別研

黛赭石

火煨醋淬研一兩

芭豆

去皮心膜油炒令紫色三十粒

赤石脂

末一兩

右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以上服三丸以乳汁或米飲下

王餅子 吐瀉驚疳乳食不消肚脹潮熱咳嗽急慢驚風及

痢疾

半夏

大者十箇二箇

巴豆

五十粒去殼另研

滑石

寒食麵各一兩

丹溪心法附錄卷之二

五十四

右為末滴水丸如菜豆大捏作餅每服五七餅或八九餅或十十二餅姜湯送下看大小加減一丸加輕粉

木香檳榔丸 治小兒初得痢疾赤白相雜裏急後重方見痢疾

○廣按小兒痢疾皆因感寒停積飲食所致初得一二日間元氣未虛宜用此丸與玉餅子分寒熱利之日子既久涉虛宜用香連丸木香散之類和之繼用豆蔻香連丸水煮木香丸之類服之

香連丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重方見痢疾

胃風湯 治風冷乘虛客干腸胃水穀不化泄瀉不利腸鳴疝痛或下如豆汁或頻下瘀血方見胃風

木香散

經濟方

治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白朮 用麩炒

麥芽

木香

人參

當歸

陳紅麴 各一錢同白朮炒

茯苓

神麴

甘草

青皮 各二錢

右為末每服半錢或一錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下

豆蔻香連丸

和劑方

治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣

客於腸間下痢赤白腹內疝痛日夜頻併不飲飲食

黃連

微炒二錢五分

肉蔻

二箇麩裹煨

木香 半兩

下香 二錢半

訶子

煨去核半兩

右為細末粟米粥和丸黍米大每服三十丸米湯下大小

加減丸數

水煮木香丸 治下痢赤白裏急後重

真人養臟湯 治熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急

後重臍腹絞痛並皆治之並見痢疾

木香散 湯氏方治冷痢腹痛不食

木香 炮一錢半 厚朴 姜制半面 白朮 一錢半 龍骨

當歸 淨洗各半兩 乾姜 炮 訶子肉 各二錢半

右為末水半盞姜三片煎服隨大小加減

一方 治休息痢及痔瀉日久不能安者湯氏方

用鷄子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內溶以鷄子拌和炒熟空心食之

赤石脂散 錢氏方 治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂 刷去土 伏龍肝 各等分

右為末每用半錢傅腸頭上頻用

又方 治瀉痢後脫肛 用陳槐花不拘多少為末陳米湯調下

養胃湯 治內傷生冷外感風寒增寒吐熱或發寒熱

方見瘡類

草菓飲 張氏方 治發瘡寒多熱少或遍身浮腫者

厚朴 青皮去白 草菓 藿香

半夏麴 甘草炙 丁香皮 神麴 良姜 各等分

右以咀，每服二錢水一盞，姜二片，棗一枚，空心煎服。

○廣按以上二方治小兒瘡疾，寒多熱少，無汗者。

清脾湯 治因食傷脾，停滯痰飲，發為寒熱，方見瘡類。

常山飲 張氏方 治一切瘡疾。

常山 人參 草菓 知母 甘草

厚朴 姜汁制一宿炒 貝母 半夏麩 茯苓

右以咀，每服二錢水半盞，姜三片，棗一枚，空心煎服，忌雞肉牛肉諸般毒食。

○廣按已上二方治小兒瘡疾，熱多寒少，有汗者，鬼哭飲湯氏方治瘡疾久未愈者。

常山 大腹皮 茯苓 鱉甲 醋炙

甘草 各分

右為末，用桃柳枝各七寸，同煎，臨發時服之，略吐，出涎不效。

露星飲 湯氏方 治久瘡成勞。

秦艸 去芦 白朮 柴胡 去芦 茯苓 去皮 半夏麩

檳榔 黃苓 常山 甘草 官桂 各等分

右以咀，每服三錢，酒醋各一盞，姜三片，煎露一宿，次早服。

○感冒四氣 新增

附諸方

麻黃湯 錢氏方 治傷寒發熱咳嗽喘急。

麻黃 去根節剉 肉桂 去粗皮 甘草 一錢

用藥心法附錄卷二十一 五十七

杏仁 四錢去尖炒
令黃色

右咬咀每服四錢水一盞煎服有汗不宜服

人參羌活散 和劑方

羌活 白獨活 柴胡 去芦 川芎 人參

甘草 炙 白茯苓 各一兩 前胡 桔梗 去芦 地骨皮

天麻 酒浸焙各半兩 枳殼 去穰一兩炒

右咬咀每服二錢水半盞姜一片薄荷一葉棗半枚煎服

瘡疹未發亦可服

解肌湯 湯氏方 治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃 去節半兩或用七錢半 人參 芍藥 獨活 各半兩

川芎 前胡 各二錢半

右咬咀每服二錢薄荷一葉姜一片水半盞煎服

七寶散 湯氏方 治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉 香附子 炒去毛 橘皮 甘草

枳梗 白芷 川芎 各一兩 加麻黃 半兩

右咬咀每二錢水一盞姜一片棗半枚煎服

參蘇飲 和劑方 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝結為執此藥

鮮肌退熱寬中快膈止嘔吐開胃進食

紫蘇葉 乾葛 半夏 製 前胡 去苗

人參 去苗 白茯苓 各六分 枳殼 去穰炒 甘草 炙去皮

桔梗 去芦 陳皮 各四分

一方加木香少許

右用水一盞生姜三片棗一枚煎溫服

不換金正氣散 和劑方 治四時傷寒感冒風濕瘴疫時氣頭

疼吐熱或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴 制 藿香 去土 甘草 去皮 半夏 制

蒼朮 制 陳皮 各八分

用水一盞姜三片棗子一枚煎至半盞溫服

黃連香薷散 治伏暑發渴或作瘡痢並宜服之 方見中

紅綿散 治夾驚傷寒 方見驚風

金沸草散 和劑方 治風化痰除頭目昏痛項頸強急往來寒

熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠粘及時行寒疫壯熱惡風

旋覆花 去梗 前胡 各七分 荆芥 一錢 麻黃 七分

甘草 炙 半夏 制 赤芍藥 各二分

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至八分溫服

薄荷散 湯氏方 治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉 兩半 羌活 全蝎 麻黃 去節

甘草 二錢 姜番 天竺黃 白附子 炮各二錢半

右為末每服一錢水半盞煎服加竹葉少許尤妙

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽鼻塞聲重 方見咳嗽

潤肺散 和劑方 治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母 麩炒 杏仁 去皮麩炒 麻黃 去根 人參 各二兩

阿膠 炒半兩 陳皮 二錢 甘草 一兩 桔梗 半兩

右吹咀每服二錢水一盞食後煎服

人參散 經濟方 治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參 天花粉

右為末每服半錢蜜水調下

百部丸 湯氏方 治小兒感寒咳嗽

百部 焙乾 麻黃 去節各二錢半 杏仁 四十箇去皮尖

右為末煉蜜丸如芡實大熟水化下

一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸噲化尤妙

瀉肝散 錢氏方 治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮 各一兩 地骨皮 各一兩 甘草 各二錢半

右為末每服四錢水一盞粳米同煎食後服

補肺散 錢氏方 治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠 炒一兩半 牛蒡子 各半錢 馬兜鈴 兩半

杏仁 七箇去皮尖 糯米 四兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

流金丸 全嬰方 治小兒咳嗽痰盛

半夏 二錢制 白礬 拮二錢 寒水石 煨六錢 硃砂 一錢

雄黃 一錢

右為末麵糊為丸芡豆大生姜湯下每服二十丸大小加

減丸數

雄黃丸 治小兒諸般咳嗽塩醋等噤魚治大人

雄黃 五銖 半夏 一兩 人言 明者 白礬

巴豆 另研各二錢

右用明礬火化開入信石礬枯乾再研為末再炒成砂同前藥為末和勻麵糊為丸如梧桐每服三十丸大小如減臨睡桑白皮湯冷送下或冷茶湯下亦可

升麻葛根湯 錢氏方 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹未發疑似之間並宜服之

升麻 白芍 甘草 各一錢 葛根 二錢

右用水一盞煎至半盞去粗稍熱服日二三服

柴胡升麻湯 和劑方 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼口燥咽乾心胃煩滿寒熱往來咳嗽痰盛涕唾稠粘

柴胡 去苗 前胡 去苗 乾葛 石膏

赤芍藥 各半 升麻 三分 桑白皮 微炒 黃芩 各四分半

荆芥 五分半

人參前胡湯 湯氏方 治小兒感冒發熱

前胡 一錢四分 柴胡 去苗 半夏 湯泡七次

黃芩 人參 去芦 桔梗 去芦 甘草 各七分

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至半盞溫服治瘧加地骨皮去土半錢

柴苓散 湯氏方 治腹中伏熱候如溫狀

柴胡 去苗 麥門冬 去心 人參 去芦 赤茯苓 去皮

甘草 各一錢 黃芩 去芦四分

右用水一盞入小麥二十粒青竹葉七片煎服

地骨皮散 集成 治虛熱潮作 亦治傷寒吐熱

知母 柴胡 去苗 甘草 炙去 人參 去芦

地骨皮 皮去 赤茯苓 皮去 半夏 製各 七次

右用水一盞 生姜三片 煎至半盞 去渣 溫服

加減建中湯 湯氏方 治傷寒發熱自汗 虛煩

熟地黃 甘草 炙 人參 各半 黃耆 二兩

白芍藥 三兩

右咬咀 每服二錢 水半盞 煎服

田方導赤散 板碎方 治小兒傷寒煩熱 小便赤色 大便褐色

面赤

生地黃 木通 甘草 各等分

益黃散 按萃方 治小兒客熱在內 不思乳食 宜服 導赤散

次服 此藥方見小兒吐瀉

柴苓湯 治小兒傷寒煩熱 小便赤色 大便褐色 面赤

柴胡 去苗 一錢 半夏 人參 黃芩

甘草 白朮 澤瀉 猪苓 各五分

桂 三分 茯苓

右咬咀 水一盞 生姜三片 煎至半盞 去渣 溫服 無時

三黃犀角散 湯氏方 治臟腑熱秘

犀角屑 大黃 酒蒸 鈞藤 梔子仁

甘草 黃芩 各半

右為末 看兒大小 加減熱湯 調服

○廣按小兒多有鬱熱因外感風寒內傷乳食而鬱熱發於外鼻塞者是因外感而發以麻黃湯人參羌活湯以後之類治之鼻不塞者是因內傷而發宜升麻葛根湯柴胡升麻湯以後之類治之

○蟲癩疝氣 新增

附諸方

化蟲散 治嬰孩小兒蛔厥腹痛 幼幼方曰蛔厥多似慢

驚但唇口紫者是蛔厥 湯氏曰每月初五日巳前蟲頭

向上可取以後可安

雷丸 三錢 史君子 去穀 十筒 鶴虱 二錢 甘草

大黃 各三錢

右為細末用猪肉煮汁調空心服

檳榔遺豆散 治嬰孩蛔虫咬心吐涎疼痛惡哭不止

檳榔 性炒有 鶴虱 貫衆 乾漆 性炒存

蕪荑 川練子 史君子肉 雷丸

雄黃 黃丹 炒 錫灰 炒不見星 木香 各二分

巴豆 去皮心 輕粉 一錢

右為細末酒煮糊丸如黍子大五更早用猪肉葱油煎將兩細嚼莫吞引虫頭向上吐去肉用猪肉汁調化虫散送服檳榔丸至巳時取下虫積可進食五歲可服七分十歲服一錢大人亦可服

化虫圓丸 和劑方 治一切疳虫攻刺心腹疼痛不已 料與合

眼

胡椒炒 鶴虱 檳榔 苦楝皮 各五錢

白礬枯一錢 二分半

右為末麵糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下

靈礬散錢氏方 治小兒虫咬心痛欲絕者

五灵脂末一錢 白礬火枯半錢

右為末每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

安虫散錢氏方 凡虫不可盡去宜安之

檳榔 胡粉炒黃 川練子去皮核科 鶴虱炒黃各二兩

白礬枯過 錢半

右為末每服一錢温米飲調下

川練丸錢氏方 治上中二焦虛或冒寒虫動作痛

乾漆五錢杵碎炒 烟出盡 雄黃二錢半 巴豆霜一錢

右為末麩糊丸如黍米大看兒大小與服取東向石榴根

煎湯下痛者煎有子苦練根湯下或蕪荑湯下亦可

蕪荑散錢氏方 治諸虫作痛

白蕪荑去肩 乾漆 炒令烟盡 等分

右為末每服一錢米飲調下臨發時服

化虫丸湯氏方 治因再生虫五心煩熱

蕪荑 黃連 神麩炒 麥蘖炒各等分

右為末麩糊丸如黍米大空心米飲下

三稜散湯氏方 治積氣肚痛

丹溪心法卷之五

六十四

縮砂仁 甘草 炙 益智 炒去 三稜

莪木 青皮 去穢炒 各等分

右為末白湯點下

治疝氣方 湯氏方

芫花 醋浸 水香 檳榔 三稜 炒各 半兩

附子 炮 茯苓 去皮 青皮 去白 全蝎

肉桂 礪砂 各二

右為末將礪砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糠醋打麩糊丸如菘豆大每服三十九丸空心温酒下未効再服

一方

小兒心痛欲絕一時無藥可察急用艾灸足大指中男

左女右

小兒疝痛可灸足大指中後以韭菜聚毛間名大敦穴男左女右

○積聚癖塊 新增

附諸方

快膈消食丸 集成 消食積

縮砂仁 橘皮 京三稜 莪木

神麩 麥芽 各半 香附子 一兩 畧炒

右為末麩糊丸如麻子大食後白湯下隨大小加減

紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷寒傳裏大便酸臭乳食不消或已

得汗身熱不除及夜蒸發熱多日不解因食成癩先寒後熱並宜服之方見吐瀉痢瘧

十全丹 湯氏方 治小兒乳哺不調傷於脾胃丁奚哺露

枳殼去白 檳榔 青皮 陳皮各半

木香二錢 蓬朮 三稜 砂仁各半

丁香二錢 香附子炒一兩

右為末神麴打麴糊和丸如黍米大空心米湯送下五十丸

異香散 治小兒疳積腫脹調理脾胃

三稜 莪朮 青皮 陳皮

半長麴 藿香 桔梗 益智仁

枳殼 香附子 砂仁 丁香

甘草

右劉散生薑三片棗一枚同煎食遠服

香枝丸 治小兒積氣發熱肚腹膨脹肢體瘦弱飲食不為肌膚

木香 丁香 檳榔去疔 枳殼去穢

甘松 史君子去殼 神麴炒 麥芽炒各二錢半

三稜煨 莪朮煨 青皮 陳皮

香附炒各五錢 胡黃連一錢

右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲送下食遠服

三稜散

三稜 莪木 甘草 益智去殼
青皮 陳皮 神麴 麥芽各二錢

右為細末，白湯調化，下不拘時候。

七聖丸 湯氏方 消積滯，調脾胃。

芫花 先用醋浸一宿，炒，漸乾，再入三稜莪木同炒，令赤色，入陳皮、川練，同炒，微焦，出用。

蓬莪木 陳皮去白 京三稜 川練取肉

青皮去白 杏仁去皮尖

右件為細末，入巴豆二十粒，去油膜，和自醋糊丸，如粟米。

大，每歲常服二丸，鹽卧熱水送下，常服宜去巴豆。

六味三稜丸 五六箇，月小兒末，與穀食，有癖積者。

莪木煨 三稜煨 神麴各 麥蘖炒

青皮 陳皮各等分

右為細末，稀麵糊丸，如菘豆大，每服三十丸，白湯下。

三稜煎丸 飲食過多，痞悶疼痛，食不消化，久而成癖，又治

婦人血積，血塊，乾血氣，經閉。

莪木黑角者 三稜各一兩二味，溫紙包煨 大黃去皮八兩

右為末，先以大黃銀石器內，好醋漬令平，慢火熬微乾，入

二味為丸，如菘豆大，每服十丸，至二十丸，食後溫白湯送

下，應實加減，服大人如梧桐子大，每服四十丸。

月蟾丸 秘方 治小兒脾癖癥瘕。

木香 人參 黃芪 當歸
桔梗 黃連 三稜炮 蓬木

驚甲 餅灸 夜明沙 綠礬 枳實 史君子

苦練根皮 訶子 各一兩 蝦蟆 燒存性 七錢半

右件為末，如菘豆大，每服三四十九丸，食前米飲下，忌生冷雜果子發脾之物，大人癥瘕丸，如梧桐子大，空心服，夜明沙蝦蟆黃連，服五七十九。

一方 治小兒癖積膏藥

用水紅花子炒一錢，大黃朴硝山梔子滑石灰各一錢，酒醱鷄旦大，一塊共搗和為膏，用青綿布攤貼，再用湯瓶熱熨，用平帕勒之，三日後揭起，肉黑如墨，是其効也。

一方 治小兒癖積丸蒸

用三稜義木阿魏蘆蒼白木陳皮各二錢，水紅花子炒三錢

大黃三錢為細末，棗肉搗為丸，如菘豆大，每服三十九丸，空心米飲下，其遂散 湯氏方 治胸膈伏熱，內停飲食，以致臟腑不舒，氣結脹滿。

其遂 煨令赤 青皮 去白 黃芩 大黃 炒各等分

右咬咀，每服二錢水半盞煎服，以和為度。

取水方 湯氏方 積水疳水並皆治之。

其遂 青皮 去白 陳皮 去白 木香 炮各一兩 檳榔 生用

右為末，紫蘇木瓜湯點下，忌服甘草。

退腫消毒散 湯氏方 治積水驚水，或飲水過多，停積於脾，或

四肢腫而身熱，宜用藥內消之，其腫自退。

蘿蔔子 赤小豆 甘草 炙 陳皮 各半 木香 一錢

右咬咀，每服二錢水一小盞，姜棗煎服。

丹溪心法附錄卷之二十一
勻氣散 御藥院方 治脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶小便不利

利

桑白皮 兩子 陳皮 兩去白 桔梗 兩炒 甘草 兩炙

藿香葉 兩半 木通 兩四 赤茯苓 兩去皮

右以咀每服二錢水一小盞姜二片煎服

木香散 湯氏方 右為末灯心葱白煎服

木通 一兩 牽牛 兩半 滑石 一兩

○調理脾胃

附諸方

參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱不進飲食方見調補脾胃

四君子湯 調脾胃進飲食見補損

溫脾散 和劑方 治脾胃不和腹脇虛脹不進飲食困倦無力

訶子 兩炮去核 人參 兩各七 白朮 兩 木香 兩

桔梗 兩各半 茯苓 兩 藿香 兩 陳皮 兩

黃芪 兩各半 甘草 兩二

右以咀每服二錢水半盞姜棗煎服不拘時

丁香散 和劑方 治胃虛氣逆嘔乳不食

人參 兩半 丁香 兩 藿香葉 兩各二

右以咀每服二錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服

厚朴 兩六 乾姜 兩炮 甘草 兩各二 白朮 兩三

右以咀每服四錢水一小盞姜二片煎空心熱服

調中散 湯氏方 治脾胃不和

丹溪心法附錄卷之二
人參去芦 白茯苓去皮 木香 白朮

甘草炙 乾姜炮 藿香葉 宿砂仁

香附子炒去毛 丁香等分

右為末每服一錢姜棗煎湯下如肚疼以白湯點下

醒脾散湯氏方治小兒脾胃怯弱為風冷所乘體熱頭疼霍亂

亂

天南星二箇重八錢者 人參去芦 丁香四十粒

白茯苓 藿香葉 白朮

甘草炙各半

右為末生姜冬瓜子煎服

加減觀音散湯氏方調理脾胃宜常服之

白朮炒 人參去芦 白匱豆蒸 白茯苓去皮

麥蘖炒 黃芪蜜水 甘草 乾山藥

神麴 香附子炮去毛

右為末每服一錢空心米湯調下

平胃散經濟方治吐逆頻併手足心熱不進飲食

紅麴三錢半 甘草炙一錢 白朮一錢半

右為末每服半錢煎棗子米飲下

銀白散簡易方治小兒百病

霍香去土 天麻炒 糯米炒丁方用糯

姜蚕炒去絲 川升麻 甘草炒各錢半 白朮判以棗豆同炒令香不用豆

白附子半錢 木香濕紙裹

山藥

黃芪 炒

人參 各一

白茯苓 一兩

白匾豆 一兩

右為末，隨証加減，常服。沸湯或米飲調下。慢驚、搐搦、射香飯飲下。急驚、定後吐不止，陳米飲下。夾驚、傷寒、發搐、薄荷、葱白湯下。壯熱、面赤、乾葛、金錢、薄荷湯下。天柱、倒行、步脚、軟濃、米飲下。疳氣、腹急、多渴、百合湯下。飲食不知、飽飢、不生肌肉、炒麥、芽生、姜煎湯下。神氣、脫語、言不正、及吐瀉、藿香湯下。暴瀉、紫蘇、木瓜湯下。白赤、痢不進、飲食、米飲煎、罌粟、殼湯下。稟受、怯弱、每白一服、常服。調理、脾胃、姜棗湯下。和劑、云木、香黃芪、白附子、姜蚕、糯米、藿香、加知母、共味、各等分。

瀉黃散

按萃方瀉脾熱、目黃、口不能吮乳

藿香 七錢

山梔子 二兩

甘草 半兩

石膏 半兩

防風 兩

右剉用蜜酒微炒香為細末，每服一錢至二錢，水一盞同煎，清汁服。

異功散 按萃方温中和氣、治吐瀉、不思飲食、凡小兒虛冷病、先與數服、以正其氣、方見吐瀉痢瘡。

進食散

進食神效

白匾豆 微炒

石蓮肉 炒去心

人參 焙各二錢半

茯苓 一錢

神麩 二錢

甘草 炙

白芷

木香

黃芪 各一錢

蜜水塗灸

紅靈心散附錄卷三十一

七十一

右為細末每服嬰孩一字一二歲半錢四五歲一錢水半
鍾生姜一片棗子半枚煎十數沸調末服之

人參沉香散 治脾氣脹

人參 木香 白朮 沉香 各伍錢

茯苓 二兩 甘草 白芷 各三錢

右為末每服一錢米飲調下嘔吐藿香湯下

○小兒雜方 新增

附諸方

小兒初生回氣法 保生要方

小兒初生氣欲絕不能啼哭者必是難產或冒寒所致急
以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶急燃大紙捻蘸油點燈

於臍帶上往來通帶薰燒之蓋臍帶連兒腹待火氣由臍
入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴
洗浴洗了方斷臍帶

通小兒大小便法 保生要方

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先
嗽了口吸唾兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡
三五次嗽口吸唾取紅赤為度須臾自通不爾無生益有
此證知此法可得再生

煉臍法

嘗聞子在母腹中胞胎十月止於臍中與母通氣初降生
之時雖曰胞胎已破始於兒口鼻中接天地之氣而呼吸

之其臍中所通之氣猶未盡絕况收生之母不明通氣之
大理不知斷臍之細功粗心妄意以致斷臍之初因所通
之氣招風入內者有之其法新生小兒綿裹臍帶離肚五
六寸處先用軟綿繒住脚於線外將臍咬斷片時去線待
血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭三五炷結作純塔狀帛
腰裹切不可常時指看待臍根落去自然無事一法小
兒降生之後即將軟線貼臍根繒住待第三日離肚二指
將臍剪斷用生姜自然汁或香油和麵裹臍四圍將臍頭
鋪艾灸三炷謂之薰臍後不招風

射香 蜈蚣 牛黃末 青黛末各一

薄荷七字 蝎尾去尾毒為末半錢
右為末熟棗內和成膏新綿上塗勻貼於臍上四方可出
一指許火上灸火頻熨百日裏外小兒可用此塗并浴法
浴體法錢氏方

天麻二錢 蝎尾去毒 硃砂各半 烏蝎肉酒浸焙
青黛各三 白礬各三 射香一字

右為末每用三錢水一碗桃枝一握同煎溫熱浴兒勿浴
背上

雄黃解毒丸 治小兒痰熱上攻發作纏喉風喉痺雙鵝腫
痛湯藥不下咽痛頰腫等証用此藥吐之

雄黃一兩 巴豆去油十 麝金一錢

丹溪心法附錄卷之三

七十三

右為末醋糊丸如黍米大熱茶清下七丸至十九吐出頭
涎即避太効如口噤以物幹開灌之下咽無不活者
吐風散 治小兒急中風口噤不開不省人事

全蝎

一箇 瓜蒂 十箇 赤小豆 三十粒

右為末一歲一字温米飲調下未出再服

○廣按丹溪云小兒急慢驚風發熱口噤手心伏執痰熱
咳嗽痰喘此類証並宜湧法吐之別此方可以通用

救生散

猪牙皂角

炮

天南星

生

半夏

生

荆芥穗

川烏

天麻

防風

僵蚕

去紫

細辛

全蝎

毒去炒 各一錢

草烏

炒

薄荷

各五分

雄黃 五分

右為末入射香一字藥少許研勻用竹管盛藥吹入鼻中
開閉再用生薑汁調藥搽牙根上

疎風散 治小兒五臟中風身體不能自收昌悶不知疼痛
口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風

犀角

麻黃 去節 人參

當歸

川芎

羌活

遠志 去心

茯神 去木 甘草

各等分

右咬咀用水煎食前服永除病根不成癩疾
白餅子 錢氏方治小兒停乳以致嘔吐泄瀉腹脹潮熱驚疳
喘嗽等証用此藥下之

巴豆 二十四箇去皮用水 天南星 炮

半夏 湯炮七次 輕粉 滑石 各一錢

右研勻巴豆後入瓊藥以糯米飯為丸小豆大捻作餅子煎蒸湯下

廣按人乳味甘戀膈易於停積所以小兒之病多繫於此此方用南星半夏以豁痰飲用輕粉滑石以瀉濕熱用巴豆以通利積滯推陳致新之妙用也

室鑑二稜煎丸 治小兒飲食過多痞悶疼痛宿食不化久而成癖

廣木 黑角者 荆三稜 二味濕紙裹煨為末各一兩

大黃 去皮八兩歸文者

右將大黃為末銀石器內以好醋浸令透慢火熬成膏和二藥為丸麻子大或菘豆大每一二十丸食前溫水下

廣木化癖丸 治乳食不消心腹飽脹壯熱喘急嘔吐痰涎食癥乳癖

代赭石 醋淬 當歸 炒 硃砂 研 枳殼 炒

廣木 炮 荆三稜 炮各半兩 木香 一兩

射香 巴豆 去油各二錢半

右為末研勻麩糊丸如麻子大每一歲兒二丸米飲下
○廣按已上二方消導之劑也但有寒熱輕重之分宜選用為妙

一方 治小兒外腎腫硬及陰瘡

用乾地龍為末先葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅其上

三白散 和劑方治小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹以致大小便不利皆治

白牽牛二兩 桑白皮 木通去節白木
陳皮各五錢

右為末每服二錢姜湯調下空心服
牡丹散 濟生方治小兒外腎偏墜

防風去芦 牡丹皮去皮各等分
右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒薑湯點服亦可

痔瘡方

白礬煨 五倍子各一錢

右為末蠶水洗淨貼患處

金華散 錢氏方治小兒一切濕瘡疔癬等瘡

黃蘗各半兩 黃連各半兩 黃丹一兩 輕粉一錢
並為末 水飛

右同研勻先以溫水洗然後貼之

一方湯氏方治濕癬瘡

用蛇床子為末先以菲根煎湯洗次用臘月豬脂調敷之

羊蹄散 小兒頭癬久不瘥者

白礬半兩 羊蹄根四兩 黃丹少許

右搗爛入米醋半盞調均候癬極痒搽之至瘥即止

洗去再搽

治大腸虛弱肛門脫下湯氏方

龍骨

訶子肉各一兩

沒石子大者二枚

瞿粟殼

去穢醋塗各二兩

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟欸欸以手托上又用輒一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊敷層壓定使熱氣上透不可過熱令病者坐布上如覺布溫逐旋減之常得溫熱為度并常服煎藥

治鼻衄湯氏方用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血妄

行取汁飲之立効

白殿散湯氏方治小兒凍耳成瘡或癢或痛

黃蘗

白殿

各等分

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

生附散湯氏方治凍爛脚成瘡

用生附子為末麩水調貼之即愈

香薷煎湯氏方治小兒生發燥痛

陳皮薷二兩

胡粉一兩

猪脂半兩

右用水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉

和令勻塗冷頭上日日頻用之

芩黃散湯氏方治小兒齒不生

大芩薷

乾地黃各半兩

山薯蕷

當歸

芍藥

甘草

灸各二錢五分

右為末熱湯調服用搽齒脚

黃連散 張子和方 治頭瘡

川黃連 黃柏去粗皮 真輕粉 草決明 各等分

右為末用生小油調藥於瘡上塗立效

一方 治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名曰蝨痔瘡切切方

黃丹 藜豆粉一錢 白礬一錢飛過

右研細乾付瘡上唾調亦可

軟青膏 治一切風熱及小兒頭瘡

巴豆七箇 瀝青 黃蠟 香油 各五兩

膩粉一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

大馬散 治小兒癰癤腫毒

南星 赤小豆 草烏 黃柏 各等分

右為末生姜自然汁調貼患處或用米醋調尤佳

槲皮散 治嬰孩小兒解癩癧作疼痛

槲皮 去粗皮此樹在處處有印包蓋樹葉也

右不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗

白芨散 治小兒癩癧膿汁不乾

白芨 貝母去心各 輕粉二錢

右為末先槲皮散洗過後用清油調付

龍骨散 治小兒停耳

白礬煨一錢 龍骨煨一錢 黃丹炒一錢 乾胭脂半錢

射香一字

右為末以綿杖子展却耳中膿水用藥末一字搽在耳中
勿令風入

耳瘡方

黃連去頂

蛇床子各一錢

輕粉一字

右為末鵝毛管吹藥入耳內

連床散

治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器膚

囊痒則抓爛黃水汁淋漓燥痛

黃連去鬚

蛇床子去土

五倍子二錢

輕粉五分

右為末先以荆芥葱煎湯洗拭乾後用清油調傳

金銀散

治嬰孩小兒眉間生瘡名煉銀瘡

煨金銀鍋一箇

輕粉五分

右為末用麻油調傳

澤瀉散

治小兒鼻下兩傍瘡濕痒爛

澤瀉

藜蘆

甘草炙

山梔子各一錢

右為末用甘草煎湯調後服

地黃湯

治小兒鼻衄

川芎

生地黃

赤芍藥

當歸各等分

蒲黃少許

右以咀用水煎不拘時

蒲黃散

治初生小兒大小便下血

生蒲黃 油頭髮 燒灰各一錢

右為末用生地黄汁或米飲調乳前服

立効散 治小兒瀉血

蒲黃 生地黄 生甘草 赤茯苓 去皮各等分

右以咀用水煎入髮灰調勻食前服

聖惠方 治小兒龜胸

大黃 煨三錢 天門冬 去心 百合 木通

杏仁 去皮尖 麩炒 枳殼 炒 桑白皮 蜜炒 葶藶 隔紙炒

朴硝 各五錢

右為末煉蜜丸如芡實大用溫湯調化食後仍用灸兩乳前各一寸半上兩行三骨間六處各灸三壯春夏從下灸

起秋冬從上灸起依法灸之

枳殼丸 治小兒龜背

枳殼 炒 防風 去芦 獨活 去芦 大黃 煨

前胡 去芦 當歸 府黃 去節各三錢

右為末麩糊丸如黍米大用米飲食後服仍用灸肺俞穴

在三椎下兩傍各一寸半心俞穴五椎下兩傍各一寸半

膈俞穴七椎下兩傍各一寸各灸三壯

芎藭散 治小兒齒遲

川芎 山藥 當歸 芍藥 炒

甘草 炙各二錢半

右為末用白湯調化食後服將藥末搽齒根

菖蒲丸 治小兒語遲

人參 石菖蒲

川芎 當歸

麥門冬去心 遠志去心
乳香 硃砂各二錢

右為末煉蜜丸如黍米大用米飲食遠服三十丸

虎骨丸 治小兒行遲

虎脛骨酥油炙 生地黄酒洗 白茯苓去皮 酸棗仁炒

肉桂去粗皮 防風 當歸酒洗 川芎

牛膝酒洗去芦

右為末煉蜜丸如黍米大用三十丸木瓜湯食前服

牡蠣散 治小兒盜汗

牡蠣煨二錢 黃芪蜜炙一兩 生地黄一兩

右以咀分作三服水煎不拘時

廣按小兒如草頭之露水上泡用藥不可不謹也

夫小兒之病多因脾胃嬌嫩乳食傷積痰火結滯而然

其証不一且舉其尤者而言乳食傷胃則為嘔吐乳食

傷脾則為泄瀉吐瀉既久則成慢驚或為疳積乳食停

積則生濕痰痰則生火痰火交作則為急驚

5
3323

丹溪心法附錄卷五

全五



