

丹溪心法附餘

卷三十二

小兒門下
痘疹



丹溪心法附餘卷之二十三

痘瘡一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補 氣虛者人參白朮加解毒藥血
 虛者四物湯中加解毒藥 酒炒黃芩黃連名解毒藥
 凡痘疹初出之特色白者便用大補氣血人參白朮黃耆川
 芎升麻乾葛甘草丁香酒洗當歸白芍藥 若大便
 瀉加訶子肉豆蔻 但見紅點便忌葛根湯恐發得表虛
 也

吐瀉食少為裏虛 不吐瀉能食為裏實裏實而補則結癰

毒 陷伏倒壓為表虛灰白者亦表虛或用燒人屎 紅
活凝凸為表實表實而更復用藥表之藥則要清燥不結
痲

吐瀉陷伏二者俱見為表裏俱虛

黑陷甚者亦用燒人屎蜜水調服 出子和方

痘瘡初出時或未見時有患者宜預服此藥多者令少重者
令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌
乾喫入硃砂末尤妙

痘瘡分入清濁就形氣上取身法

黑陷一種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃耆酒紫草人
參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸川

芎酒洗芍藥之類或加紅花

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根黃連

黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大鮮疽毒

膿灰白色靜者怯者作寒者

勇者燥者燥發者作熱者

痘瘡鼠粘子連翹山查甘草此四味始終必用之藥

全白色將壓時如豆殼者蓋因初起時飲水多其壓不齊俗

呼倒壓不好但服食表之劑消息他大小便如大便秘通

大便小便秘通小便

有初起煩燥譫語狂瀉引飲若飲水則後來壓不齊急以涼

藥解其標如益元散之類亦可服

瘵塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無力
氣快 輕者用漆蜜水調滑石末以羽潤瘵上

虛瘵者以笑表之劑加涼血藥

實瘵如大使不通者以大黃寒涼之藥少許與之下其結糞
疎則無毒蜜則有毒宜涼藥解之雖數十貼亦不妨無言眼
之患

瘵乾者宜退火濕者用瀉濕退火只用輕劑芥荆升麻葛根
之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類

如瘵瘡傷眼必用山柘决明赤芍藥當歸尾黃連防風連翹
升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣復自

明

痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥下且不可緩已成膿
必用涼藥為主赤芍甘草節連翹桔梗 上引用升麻葛
根 下引用續柳牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜蒌之類
大便燥用大黃發寒熱用黃柏黃芩

痘瘡黑屬血熱涼血為主 白屬氣虛補氣為主 中黑陷
而外白起得遲者則相兼而治

初起時自汗不妨蓋濕熱薰蒸而然故也

痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足 虛則黃蒼
生血活血之劑助之畧佐以風藥 實則白芍為君黃芩
亦為君佐 以白芷連翹續斷之類

若屬寒陳氏方亦可用

入方 鮮痘瘡毒

絲瓜 升麻 酒芍藥 生甘草 黑豆

山查 赤小豆 犀角 等分

右以咀每服三錢水一盞煎六分溫服

又方 治痘瘡已出未出皆可服

硃砂

右為細末蜜水調服多者可減少者可無

痘瘡敷藥

貝母 南星 僵蚕 天花粉 白芷

寒水石 最多 草烏 大黃 猪牙皂角

右為末醋調傅之

附諸方

○補虛

黃耆紫草人參湯 治痘瘡表虛黑陷 即前丹溪方

黃耆 酒炒 紫草 酒炒 人參 各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散 治痘瘡裏虛吐瀉及和胃助氣 楊氏方

人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 木香 各等分

右為末每服五錢水一大盞姜蜜同煎六分服

白朮散 治裏虛吐瀉煩渴除身熱清神生津痘無顏色首

尾可服

人參 白朮 茯苓 甘草 木香

藿香 各七 乾薑 一錢四分 一方作乾姜止泄瀉用

右為粗末水一大盞姜棗同煎至六分溫服

大補湯 實表裏補氣血治痘瘡陷伏不紅者

當歸 川芎 白芍藥 生地黄 人參

白朮 甘草 白茯苓 黃耆 官桂 各等分

右咬咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

痘瘡治例

心法附錄曰小兒凡覺身熱証似傷寒若未經瘡痘疑似未明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活散

執甚者則與升麻蒼根湯人參敗毒散

痘瘡已出則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫葍飲子紫葍木香湯紫葍木通湯或快斑散

出太甚者人參敗毒散犀角地黄湯

小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四順

清涼飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胃腹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

煩渴者甘草散烏梅湯

若下痢嘔逆者木香理中湯甘草乾姜湯

若陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入射香老酒調列或不用酒則木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之

然而瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其有大便自利所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用化毒湯可也或不用亦可若大小二便一或閉焉則腸胃壅塞脈絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉黧然不旋踵而告變矣

○發熱

惶惶散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓 細辛 桔梗 瓜蒌根 人參

甘草 炙 白朮 川芎 各等分

右為末每二錢水煎入薄荷三葉同煎服

參蘇飲 治小兒時氣傷風傷寒發熱惡寒咳嗽未明痘症是與不是疑似之間此藥甚為穩當

楊氏調解散即是此方

前胡 人參 紫蘇葉 乾葛 半夏 湯泡七次

茯苓 各三分 枳殼 陳皮 甘草 桔梗 各二分

右吹咀姜棗煎微熱服

人參羌活散

羌活

獨活

柴胡

人參

川芎

枳殼

茯苓各三分

前胡

北梗

天麻

地骨皮

甘草

炙各一分半

加麻黃薄荷葱白煎服

汗後尚熱宜服此去麻黃加紫

草

類已見三五點加紫葢陳皮赤芍使熱退瘡出亦

輕更調辰砂末半錢以制胎毒

消毒救苦散按方治斑疹悉具消化便令不出如已出稀

者再不生斑

麻黃

羌活

防風各五

川芎

藜蘆

葛根

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡各二

細辛

橘皮

紅花

蘇木

生地黃

酒黃柏

連翹各五

黃連三分生甘草一分吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞煎去渣熱服

三豆子湯

治天行豆瘡但覺有此證即服之

赤小豆

黑豆

菘豆各一

甘草節五錢

右淘淨水煮熟任意食豆飲十七日自不發

惡實膏

用惡實子為末蜜調貼額門上免有患眼之疾熱甚者

升麻葛根湯

加山查大力子其瘡稀疎而易愈

川升麻 甘草 白芍藥各一錢 葛根半錢

右咬咀作一服水一盞半煎八分溫服

人參敗毒散方見前

涼膈散 治小兒瘡疹未出三焦積熱煩燥多渴及面赤面

熱頭昏咽噪喉咽腫痛口瘡便溺赤澁狂言譫妄睡卧不

安並宜服之

大黃 朴硝 甘草 梔子仁 黃芩

薄荷葉各一兩 連翹四兩

右為末每服二錢竹葉五片蜜步小水一盞煎六分溫服
若瘡疹已出發熱作渴脉實悶亂便實者亦宜服此便不
實者切不可服恐內虛而毒氣不能發外也

謹按瘡疹已發有寒熱溫涼不同形氣盛虛之異虛寒者
用異功散實熱者用涼膈散有起死迴生之效若以實熱
為虛寒用異功散虛寒為實熱用涼膈散死生在反掌之
間慎之慎之

○已出

化毒湯 治瘡痘已發以此消毒

紫草茸半兩 升麻 甘草炙各二錢半

右剉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散簡易方 治小兒瘡疹出不快透及倒靨下切惡候

紫草茸 木通去節 甘草 枳殼去白炒

丹溪心法卷之三

右吹阻每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草 木通 黃耆 川芎

木香 甘草 炙減半

右為粗末水煎服 大便閉加枳殼 大便如常加糯米

百粒 楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫葺木香湯 治瘡出不快大便泄利

紫葺 木香 茯苓 白朮 等分

甘草 炙少許

入糯米煎服 楊氏云紫葺能利大便白朮木香佐之

紫葺木通湯

紫葺 人參 木通 糯米 等分

甘草 減半

右剉煎二錢溫服 內虛大便利者可入南木香去紫葺

快斑散

紫葺 蟬殼 人參 白芍 各二錢半

木通 一錢 甘草 炙半錢

右剉散煎二錢溫服

又方

紫葺茸 五錢 陳皮 二錢 黃耆 三錢 赤芍 五錢

甘草 炙三錢

右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下二錢服後瘡

丹溪心法卷之三

七

備身四肢佳服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調 楊氏云發豆瘡最妙或加
甘草紫草

消毒散 和劑方 治毒飲壅遏壯熱心煩瘡疹難出未能勻透

牛蒡子 炒六兩 荊芥穗 一兩 甘草 炙二兩 防風

升麻 各一兩半

右以咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服

○出大甚者

人參敗毒散 方見前

犀角地黄湯

犀角 一兩 生芩 二兩 赤芍 七錢半 牡丹皮 一兩

右以咀三歲兒三錢水煎

○稠密者

加味犀角消毒散

惡實 四兩 炒 甘草 炙一兩 防風 半兩 荊芥穗 二兩

宜加山查酒黃芩酒洗紫草減食加入參

右為末煎紫草糯米羌姜湯調服食後臨卧日三

黍粘子湯 拔萃方 治癩子已出稠密身表執急與此藥以防

已後青乾黑陷

鼠粘子 炒香 當歸身 酒洗 甘草 各一錢 柴胡

連翹 黃芩 黃芪 各一錢 地骨皮 一錢

丹溪心法附錄卷三十三

十一

右為粗末每服二錢水煎去滓溫服空心藥進且休與乳食

○小便赤澀者

大連翹湯

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前

當歸

防風

柴胡

赤芍

滑石

蟬蛻

甘草炙各一錢

黃芩

山梔子

甘露飲子

生苜

熟苜

天門冬去心

麥門冬去心

山茵陳

枇杷葉去毛

枳殼去穢

黃芩

石斛

山茵陳

甘草

右剉每一錢水一盞煎八分食後服

五苓散

加麥門冬煎服方見中暑

○大便閉結內煩外熱者

小柴胡湯

加枳殼同煎服方見溫熱類

四順清涼飲子

當歸

赤芍

大黃虛者煨實者生

甘草

各等分

一方加陳皮梗米煎

○咽喉痛者

如聖飲子

丹溪心法附錄卷三十三

十一

桔梗 甘草 鼠粘子炒各二錢 麥門冬三錢

右為末竹葉同煎二三錢

一方加荆芥防風重者竹瀝同煎

鼠粘子湯

鼠粘子炒四錢 荆芥穗二錢 甘草一錢 防風半錢

右為細末沸湯點服 去防風各消毒散

○喘滿氣壅者

麻黃黃芩湯

麻黃三錢 赤芍 黃芩各二錢半 甘草炙 桂枝各半錢

○胃腹脹滿者

桔梗枳殼湯

枳殼 桔梗各二兩 甘草炙半兩

右剉姜煎

二陳加枳殼湯

半夏 橘紅 茯苓 甘草 加枳殼

右剉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草 瓜蒌根等分

右為末每服一錢煎服

烏梅湯

小黑豆 菟豆各一合 烏梅二箇

右吹咀新汲水一碗煎取清汁旋服

人參麥門冬散 集驗方治發熱煩渴

麥門冬 一兩 去心 人參 甘草 炙 陳皮

白朮 姜製各半兩 厚朴

右吹咀每服二錢水一盞煎六分去渣溫服不拘時

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜 方見中寒

○陷入者

加味四聖散 方見前

胡荽酒

以荒荽煎酒薄傅其身厚傅其足噴其衣服併以厚綿蓋之

獨聖散

牛蒡子 炒五錢 白僵蚕 二錢半

右末入紫草三莖同煎薄進二服 前條云獨聖散入射香老酒調劑如不用酒則木香煎湯調服

又方

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末每服半錢入射香少許木香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許調下

○黑龍者

宣風散

檳榔二箇

陳皮

甘草各半兩

黑丑

四兩半生半熟

右為末每一錢量大小與蜜湯調下

無價散 御藥院方 治斑瘡不出黑陷於死者

人猪猪犬膽長燒

少許微將蜜水調

百者救生無一死

黃金萬錠也難漚

右將前四物於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火煨令烟盡白色為度但是瘡發不快倒壓黑陷者及一切惡瘡每用一字蜜湯調服其效如神

一說人糞用九歲以下無疾童子者猪猪犬糞用未破陽雄者先於重九日各置於淨處飼之以飯勿令雜食過旬日換盡腸之宿垢方收其糞陰乾候臘八日未出時燒

百祥丸

紅芽木戟不以多少陰乾漿水煮極軟去骨日中曝乾復細元汁中煮汁盡焙為末水丸如粟米大每服一二十九丸研赤芝之麻湯下

又湯氏方 治小兒豆疹黑陷者

羌活 一兩

川山甲

醋炒

生人骨

火煨存性各半兩即人牙

麝香 少許

右四味為細末麻黃薄荷煎湯調一錢只用一服便起萬不失一

乳香散

治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒歸心急煎乳香

散服之

乳香 半錢或一二錢

右用水一盞煎服 一方加沒藥亦芍藥當歸同煎

○疔毒

四聖丹 治痘瘡中有長大紫色者為疔毒把住痘瘡不起

發急用簪尖挑破紐入此丹

珍珠 三五粒 犀尖 鐵器 碗豆 四十九粒
上煨微黃色研 燒灰存性

頭髮 燒灰 存性

右為細末用搽面油臘脂調成膏子將兒在溫爐處安在忌風寒穢氣先用簪尖平撥開疔口將藥紐入疔內即時變為紅白色餘瘡皆起 又嘗見有疔且者但挑破出其黑血即愈或挑開用口咽去黑血或用綿裹指用搽其黑

血辰法亦可蓋目疔豆破而毒氣得散也

○愈後諸疾

五福化毒散 湯氏方 治疹痘餘毒未解并上焦熱盛口齒出血

玄參 一兩 桔梗 去蘆 八錢 赤茯苓 人參

牙硝 別研各 青黛 二錢 甘草 一錢 麝香 半錢 別研

右為末入青黛和勻煉蜜為丸如芡實大金銀箔為衣磨

生犀水化下 齒血臭氣用生地黄汁化下

人參白朮散 錢氏方 治痘已壓身熱不退此藥清神生津除

煩止瀉

人參 白朮 藿香葉 木香

甘草

白茯苓

各一兩

乾葛二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

雄黃散 集驗方 治小兒因疳瘡牙齦生疳蝕瘡

雄黃一兩

銅綠二錢

右同研極細末量瘡大小乾搽其上

綿蠻散

陳氏方

治因痘瘡身體肢節上有疔蝕瘡膿水不絕

用此蠟綿蠻不拘多少以生白礬搥碎置其內炭火燒

令礬汁盡取細研乾搽瘡上

穀精草散

陳氏方

治痘已壓眼目翳膜或癰毒多淚

穀精草一兩

生蛤粉一兩

右為末借猪肝一葉以竹刀批作片子搽藥在內用葶繩

縛定於磁瓦器內貯水慢火煮熟令兒食之

一方 治癰瘡入眼

張子和方

麩炒黃蘗炙甘草

羌活防風等分搗

每服一錢將水下

揆雲見官直到老

又方 張子和方

硃砂

腦子

水銀

麝香各等

右四味研為細末用水銀調滴耳中

一方 治小兒出瘡疹眼內有雲翳 瑞竹堂方

輕粉

黃丹各等分

右為末竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有翳吹左

耳即退

麥湯散 治水豆 陳氏方

地骨皮半分

麻黃一分 甘草分 人參一分

滑石半分

大黃一分 知母各一分

甜葶藶一分 隔炒 羌活一分

右為末每服半錢水一盞小麥七粒同煎十數沸服

○陳氏痘疹證治

凡小兒痘疹未出已出之間有類傷寒之狀其痘疹病証自然憎寒壯熱身體疼痛太使黃稠此乃是正病也若無他疾不宜服藥

凡癩瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治如表裏俱實者

後用藥傳之

一捻金散 治小兒鵝口口瘡

雄黃三錢 鵬砂一錢 龍腦少許 甘草半錢

右為末乾摻患處或用蜜調搽

一方 小兒白屑滿舌狀如鵝口葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口上如不脫濃者粟米汁以綿纏筋頭拭之切用煨過黃丹摻之

一方 小兒初生舌下有膜如石榴子連於舌根令兒言語不亮可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰摻之葛氏方

瀉心湯 錢氏方治小兒口瘡

用黃連去芦為末蜜水調服洗心散丸妙方見火類

硃礬散 和劑方 治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白礬等分爲末使亂髮纏指搽拭舌上令淨以藥傳之

一方 治小兒口瘡

枯過白礬 一兩 黃丹 一錢半 乳香 半錢

微炒 右件煉蜜爲丸如皂子大臨卧噙化小兒用筋頭點

一方 治小兒心有客熱滿口生瘡 揚氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

又方

用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏餅外用紙護貼

致令臟腑受冷榮衛澁滯則血氣不能衝貫皮膚肌肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多瘡場煩燥喘渴而死皆因宜利解散之過也縱得其生而必罕矣若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送下七味肉豆蔻丸治之如瀉止任服不止者多服

若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能靨也如身溫腹脹咬牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者蕩散真氣故多死矣速與十一味木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩猪胰一塊以淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑滋潤

使瘡痂易落百無滯碍切不可妄投宜藥恐內虛瘡毒入於裏傷兒真氣

若六七月身壯熱不大便其脈緊盛與三味消毒散微得利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩三日至十三日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白朮散

若痘瘡欲壓已壓之間或不能壓腹脹煩渴者不可與水蜜若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之

若痘瘡欲壓已壓之間頭溫足指冷或腹脹瀉瀉氣促者不

可與水蜜若飲者即死急煎十二味異攻散救之

若十日至十一日當壓不壓其身不壯熱悶亂不寧臥則嘔氣煩渴咬牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之即死

若十一日十二日瘡痂已落其瘡癢猶黷或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煖物又不宜食五辛五味并有毒之物恐熱毒薰于肝膈眼目多生翳障若不依此禁忌必為小兒終身之患用兩味穀精草散治之

若豆瘡已壓其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西瓜紅柿等冷物食之若食之轉生焦渴或頭溫足冷或腹脹或時瀉或咬牙以致難愈速與十一味木香散救之即瘡

若身壯熱經月不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治之
熱退住服如不愈只服七味人參白朮散治之

若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘毒
未盡以四味射干鼠粘子湯治之如不愈者以七味人參
白朮散主之

若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風湯治之如不愈
者以七味人參白朮散主之

若源嗜稠粘身熱鼻乾大便如膏小便黃赤以十六味人參
清膈散治之如不愈只服七味人參白朮散立效

若發實此熱胸中煩悶大便堅實卧則喘急以五味前胡枳
殼湯治之

凡痘瘡首尾不宜與水與少與冷熱湯則可若候與之瘡磨

之後其痂遲落或身生癰腫若鍼之成疔蝕瘡血水不絕
甚則面黃唇白以致難愈者何也蓋脾胃屬土外主身之

肌肉祗緣飲水過多濕損脾胃搏於肌肉其脾胃肌肉虛
則津液衰少津液衰少則榮衛滯滯榮衛滯滯氣血不能

周流凝結不散故瘡痂遲落而生癰腫也
若微作渴者以六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七
味人參白朮散治之

若身熱大渴以七味人參白朮散治之如不愈者只服十一
味木香散治之

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身温

渴者或身熱面紅白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬
牙渴者或飲水轉渴不止者以上九證即非熱也乃脾胃
肌肉虛津液衰少故也宜服十一味木香散治之如不愈
者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱
實而瘡不致於痒場喘渴死矣

若痘疹已歷未愈之間五臟未實肌肉常虛血氣未得平復
忽被風邪搏於膚膜之間則津液澀滯故成痔蝕瘡也宜
用雄黃散綿繭散等藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致
殺人

凡斑駁疹毒之病俗呼疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱
毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤斑通

體也凡發赤斑者十生一死發黑斑者十死一生難治葛
根麥門冬散生地黃散主之

○廣按丹溪癩疹豆瘡各立病目所治不同而陳氏瘡疹
混同立論豈不惧哉夫豆瘡出於脾其間有熱燥者有
寒熱者而癩疹出於心肺心肺屬陽多是風熱兼痰而
作宜於通聖散中消息之陳氏此篇却言斑疹乃是肺
胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生
地黃散活之方合病情可見瘡疹不可一途而治也明
矣

凡痘瘡或悞抓成瘡膿血淋漓緣血氣衰肌肉虛故也切勿不
可用新牛糞燒灰貼之其臭穢反觸其瘡宜用敗草散治

九法附會卷三十一
之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

黃帝問曰飲食陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰虛用木香散加丁香官桂治之陰盛則補陽虛用異攻散加木香當歸每一兩藥共加一錢異攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使豆瘡易出易壓不致痒塌木香散性溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也善治小兒腹脹瀉瀉其效如神不能盡述大抵天地萬物遇春而生癸至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣克實自然易出易壓蓋因外常和暖內無冷氣

之所由也

凡痘疹五不治一痒塌寒戰不止者一紫黑色喘渴不寧者三灰白色陷頂腹脹喘渴者四頭溫足冷悶亂飲水者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若豆瘡已出七日之間其瘡不光澤不起癢根窠不紅痒塌抓搔謂之表虛也可隨證服藥蓋脾主身之肌肉肺主身之皮毛今痘瘡出是肌肉皮毛受其證也治法先當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏沖和其瘡自然易出易壓也故經云表病裏和不治而自愈也

今將痘疹輕重開具于后

輕者作三次出大小不一等頭面稀少

眼中無

根窠紅

肥滿光澤

重者

一齊并出

如蚤種

稠密

瀉渴

灰白色

頭溫足冷

身溫腹脹

輕變重

犯房事

不思口

先曾瀉

飲冷水

餌涼藥

重變輕

避風寒

常和煖

大便稠

今將痘疹方開其于后

胡荽酒

以荽荽煎酒塗房噴之以避穢濁之氣

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則痘疹少入眼內

升麻葛根湯

四味

方見前

木香散

十一味

木香

大腹皮

人參去芦

桂心

青皮去穢

赤茯苓去皮

前胡去芦

訶梨勒去核

半夏姜製

丁香

甘草各三錢

右咬咀每服二錢水一盞姜三片同煎空心溫服量兒大小

小加減一方去桂心丁香加桂枝藿香

異攻散

十二味

木香

當歸各三錢半

官桂去粗皮

茯苓去皮

白朮各二錢

人參

厚朴姜炒

肉豆蔻

丁香 陳皮各二錢半 半夏姜製 附子炮去皮各一錢半

右咬咀每服二錢水一盞姜五片肥棗三枚同煎空心溫服量大小加減 一方去丁香附子加藿香乾姜肉豆蔻丸七味

木香 縮砂仁各三錢 白龍骨 訶子肉

肉豆蔻各半兩 赤石脂 枯白礬各七錢半

右為細末麪糊丸如黍米大一歲服三五丸二歲服百丸米飲湯下瀉甚者煎異攻散吞下瀉不止多服或瀉水穀白色淡黃色木香散送

消毒散 出後身壯熱不大便其脉緊盛用此微利

牛旁子四兩炒 荆芥穗 甘草各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

人參麥門冬散六味 出後身反發熱煩渴者 方見前

人參白朮散七味 出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉 方見前

柴胡麥門冬散六味 出後身壯熱經日不除

柴胡 甘草炙 人參去蘆 黑參各二錢半

龍膽草一錢半 麥門冬去心三錢

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

射干鼠粘子湯四味 壯熱便實口舌生瘡咽喉腫痛

鼠粘子四兩炒香 甘草炙 升麻 射干各一兩

右每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

桔梗甘草防風湯三味 治風熱咳嗽咽隔不利

桔梗

甘草 灸

防風 各等分

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減
人參清膈散 十六味 治涕唾稠粘身熱鼻乾

人參

柴胡

當歸

芍藥

知母

桑白皮

白朮

黃耆

紫菀

地骨皮

茯苓

甘草

桔梗

各一兩

黃芩

半兩

石膏

滑石

各一兩半

右每服二錢水一盞姜三片同煎溫服量大小加減

前胡枳殼湯 五味 疾實壯熱胸中煩悶大便堅實

前胡

一兩

枳殼

赤茯苓

大黃

甘草

灸各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服

雄黃散

因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

方見前

雄黃散

因痘瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不絕者

敗草散

用蓋房多年爛草或蓋牆爛草亦可其草經霜露

感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不以多少曬乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐卧可用一二升攤於席上令兒坐卧其效如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

韶粉散

痘瘡纒愈而毒氣尚未全散瘡如雞落其瘢猶黯

或凹凸內起當用此藥塗之

韶粉一兩 輕粉一錢
右和研勻入煉過猪脂油調和如膏薄付瘡上如痘瘡欲落不落當滅癩痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以瓷盒盛之塗瘡上如痘瘡痒甚俱搗成瘡及瘡如欲落不落用上等白蜜塗之其癩落亦無紫黑癩痕

穀精草散 治熱毒薰於肝膈眼目多生翳障

蒼木散 治痘瘡入眼

- 蒼木 乾葛 各一兩 槐花 藁本 蛇蛻
- 防風 枸杞 白蒺藜 各三錢 黃芩

- 川芎 各半兩 白菊花 木賊 甘草 各二兩

- 蟬蛻 四錢 乳香 沒藥 各半 硬石膏

穀精草 三錢

右為末每二錢白水煎食後服

菊花散 治痘瘡入眼

- 白菊花 三兩 菜豆殼 蜜蒙花 旋覆花
- 穀精草 甘草 各一兩

右為末每服二錢用乾柿一枚粟米泔一盞煎乾為度取乾柿食後服之

蟬菊散 豆瘡入目或病後生翳障

- 蟬蛻 去土淨洗 白菊花 各等分

右為末每服二錢水一鍾入蜜少許同煎乳食後溫服量
兒大小加減

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根 麥門冬 去心各人參 去蘆石膏 半兩

川升麻 錢 甘草 茯苓 各二 赤芍藥 一錢

右每服二錢水一盞煎溫服看兒大小加減

生地黃散 治斑駁疹毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黃 半兩 麥門冬 去心七錢 杏仁 湯泡去皮

款冬花 陳皮 各三錢 甘草 三錢

右每服二錢水一盞煎服量大小加減

麥湯散 治水痘方見前

廣按瘡疹之源蓋由母胎娠之時飲食煎炒炙煇厚味
醇酒兒在腹中浸漬食母血穢蘊而成毒伏於五臟之
間及生之後或因外感風寒內傷生冷跌撲驚恐時氣
流行觸動毒火發於肌膚之間心臟之毒為癩肺之毒
為疹肝臟之毒為水泡瘡脾臟之毒為膿泡瘡小兒稟
厚毒少氣血調勻表裏充實則易發易愈或稟弱毒
盛表裏虛氣血弱必須醫藥調治庶幾有生前輩明醫
錢仲陽氏出究其病源是熱是燥故用辛涼之藥以清
熱潤燥及陳文中氏出又見病源之中有寒濕者故用
辛溫之劑以溫寒散濕此二先生兩得之後之宗錢氏
者惟知辛涼之是勢而寒濕者不宜宗陳氏者惟以辛

溫之是從而熱燥者不可小兒懼此禍患可勝計哉苟能用一子之長而無一家之弊斯可也故丹溪朱先生曰豆瘡者氣血虛表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退火瘡濕者是溫宜瀉濕又曰燼灰白色靜者怯者作寒看勇者燥者燉發者作熱看先生之言可謂活潑潑地矣以此觀之小兒豆瘡表裏充實者固不必於藥而虛中有寒濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方補虛及痘瘡治例具之於前使小兒痘瘡屬熱燥者宗之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘瘡屬寒濕者宗之後之業是科者必以補虛為主視其形色脈證寒濕熱燥及天時寒暄而分治之嬰孩之幸也又按

王節齋論曰丹溪痘瘡治法最為明備近世通用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若豆瘡陷伏淡白色及內瀉滑腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方若身盛稠密紅紫色及大便燥結者此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救且是胎毒古人治法只解毒然吐瀉裏虛則送毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹溪陳文中二法通用斯無弊也

○痘瘡屬虛寒者宜可延至十數日後方死屬毒盛轉

丹溪心法附餘卷之二十三終
紫色者，不過七八日。蓋痘是胎毒自內出，一三五七日方
出，毒氣尚在內，出至六日則當盡發於表，七八九日
成膿而結痂矣。若毒氣盛不能盡出，過六日毒反內入
臟腑，故須於六日以前毒氣該出之時，急服涼血解毒
之藥，以驅出之。六日以後醫無及矣。故其死最急者，虛
弱毒氣少者，只是氣血不足，不能貫膿成就，故綿延日
久而後死，此虛實輕重之分也。
○痘瘡多者，是毒氣多，便先宜解毒，不然則恐氣血周
貫不足，故隨後亦宜兼補藥，以助成臟血。



