



痘瘡新書標目

總論

見点

収靨

嫩衝熱合併

腐敗熱

治療總論

見点之期

収靨

偽痘

序熱

灌膿

稠密痘

神經熱合併

合併諸病

不整痘治法

灌膿之期

病毒轉移

并諸統症

真痘之徵

真偽二痘之癩痕并別  
經驗十二條

元スト 痘瘡新書

總論

夫痘瘡ノ世ニ見ルニヤ支那ニ於テハ其說浩蕪紛々人詳  
カニ三難シ一本朝ニ在テハ庚ニ聖武帝天平七年乙亥春  
始テ筑紫ニ流行ニ和蘭ニ於テハ記元子六百二十二年朝  
孝德帝十四年ニ始リシト云ヘリ○此毒ノ本性和漢俱ニ其  
説多シト虫率皆陰陽五行藏腑经络ニ原キ人ニ見ル処ニ  
就テ憶断セル者ニメ絶テ其理ニ本キテ究竟セル者ニ非  
サルハ一モ取りテ確拠トスルニ足者ナシ西人ハ唯定數  
ヲ見ヘタル傳染毒ナリト云ヘリ其害約ニメ優ナリト云

フヘシ〇此病性ノ傳染毒ナル一固ヨリ多言ヲ待タズ接  
瘧ノ人身ニ感染スルヲ以見ルヘシ而メ其傳染スルヤ或  
ハ直ニ其毒ニ觸レテ即チ病ニ堪瘧是或ハ氣ニ由テ傳ヘ  
一被流行ト  
ナル所以ナリ或ハ曾テ瘧ヲ患シ者ノ用ニ衣服畧械等ニ觸  
テ感スルアリ世俗瘧ノ呪ト云テ患瘧ヲ患テ死スル呪ノ  
類リ然氏一度患ヒ者ニハ傳染スル一ナシ瘧瘧百日咳  
ハ再感スル一ナリ熱瘧梅毒所鮮ノ如キハ否ス其理種々  
百般説者アリ金未夕明テラス尚且治療ニ益ナシ故ニ  
此ニ贊肥前ノ天草大村丑寫及ヒ周防ノ岩國ノ如キハ其  
傳染セン一ヲ恐レテ瘧瘧流行スル取ハ他邦ニ適カス若  
他邦ニアリテ其流行ニ會スル時ハ國ニ還リ或ハ國中ニ

瘧ヲ患ル者アレハ遠ク山中ニ送リテ其傳染ヲ避ク故ニ  
此二國ハ瘧ヲ患ル者甚稀ニ  
西洋ニモ亦此ノ如クシテ瘧ヲ免ル一ヲ説明セリ是人  
身固有ノ毒ニ非スメ一種ノ傳染毒タル所以ナリ元瘧瘧  
麻疹梅毒等ノ傳染病ハ年歴久キニ隨ヒ其性緩柔ニナル  
一西洋書中ニ見タリ本朝ニ於テ見聞セルモ亦然リ〇蓋  
其毒質ハ異成一ナシト云之ヲ感受スル者ノ休瘧ニ隨ヒ  
其瘧瘧ト熱性トハ各同ニカラスニ一種ノ瘧苗ヲ以テ數見  
ト各アルヲ又其毒ヲ感受シ直ニ瘧ヲ染スル者ニアラス  
以テ見ヘシ又其毒ヲ感受シ直ニ瘧ヲ染スル者ニアラス  
其已ニ傳染セルモ數日間休中ニ潛伏メ人身ノ平康ヲ損

七八早キハ六七日晩キハ二十日ヲ経テ乃序起テ起三病  
扶ヲ十久者之接瘧ヲ行ヘル者其期此ノ如シ此ニ由テ  
此ノ如成シ  
疑ナシ

生瘧瘧ヲ患サル者アリ是一種ノ異類ニメ瘧毒ニ染マサ  
ルモノト言シノ外其理未タ知ルヘカラス一瘧親子兄弟  
キト云フ如然ルニ未タ嘗テ瘧ヲ患シ事非又ト云者ノ中  
極輕瘧ヲ得発熱ノニメ毒ヲ排泄シ一粒モ見點セサル  
者或ハ胎中ニメ已ニ瘧ヲ病余接瘧ヲ行フニ接痕紅暈ヲ  
瘧ヲ醸サ入而ノ其紅暈ト熱トニ退キスル者ニ再ヒ接  
瘧スレハ感受景况ヲ見ハサ入又自然瘧流行スレハ絶テ  
之ニ染ケル者ヲ実驗セリ是亦極輕瘧トシテ政羅巴ノ  
經驗書中ニ小兒瘧痲或ハ瘧痕アリ瘧ヲ分塊シ其後接瘧自

然瘧共ニ感受セサル  
者ヲ説上セルト多シ  
此毒ハ年齢男女稟賦等ニ拘ハラズ一般ニ罹リ胎兒モ  
亦之ヲ免カレズ常ニ流行ノ始メハ輕ク一般ニ流行ニ及  
テ即惡性ニ變テ終リニ至リテ復タ良性トナル瘧昔ハ瘧  
ニ數年ヲ測テ流行セリ近今ニ至リテハ其休止ノ間逐次  
ニ短縮シ瘧ノ如ハ大抵四時流行スルカ如ク然レテ春季ニ  
始リ夏壯シニ秋ニ衰ユ冬ニ藏ル而テ春ニ至リ即又始レ  
ハ年間流行セルカ如クト其間自然間然ノ時期在ニ  
大凡体質乾枯強硬ナル者ハ濕潤弛弱ナル者ヨリ其症劇  
甚ナリ故ニ小兒婦人及ヒ林格脫弱ナル人ハ胃子壯年強  
硬ナル人ヨリ危險少シトス○瘧瘡善性ナル者ハ其經過  
ノ間ヲ分子四期トス故ニ各期九三四日ヲ出ヌ十四日或



○瘧ハ各期ニ於テ注意スヘキノ事件アルカ故ニ之ヲ確  
定スルノ肝要ナリトス然レ唯瘧熱ヲ以テ定メ難シ何ト  
成ハ熱微ニメ瘧家之ヲ知ス或認テ他病トナシ意ヲ留ス  
瘧熱ノ初期較著ナラサレハナリ是故ニ瘧疹見點ノ始ヲ  
以テ第二期ノ始ノトシ而後前後ノ期ヲ確定スルヲ切実  
ナリトス

第一期 序熱

此期ハ瘧熱ノ初ヨリ見點前三日若クハ四日順正瘧ハ多  
ハ三ナ六  
時間序熱暫苗スレ凡日數ヲトス○身体弛柔皮膚脆弱ニ  
以テ推スハ四日ニ至ト有  
メ色白キ小兒ハ瘧熱セス或ハ熱微ニメ著シカラス其ノ

他ノ諸症モ亦從テ怪易ナル者アリ又數日前ヨリ既ニ其  
廉平ヲ失ヘル者アリ又時トメ神志潤腸セル者ナリ然レ  
大抵先リ惡寒戰栗ニ次キテ灼熱ヲ瘧ニ脈疾瘧脈ハ大抑  
ハ  
凡瘧數ナレニ人ヲ瘧ニ中微者口唇ヲトス小兒瀉アレハ  
ヲ好シ其ニキテ以テ甚ク諸症齊ニ當リテ増劇シ煩悶シ  
微トスヘシ  
食機ヲ亡ビ或ハ食味ヲ變シ舌上白苔アリ心窩若洞ニ大  
便秘結シ小便白濁ニ人淫渣ヲ見ワシ志耐憂ニ腫ヲ嗜シ  
睡中驚駭或ハ搐搦シ謔言妄語ニ或ハ惡心嘔逆ニ頭痛腹  
痛腰痛○因見反脹メ啼泣スルハ腹痛ヲ微ニ前ニ屈ムハ  
痛ヲ微ス  
煩燥声嘔シ脘下痛ニ嫌フ以知ルヘシ面色萎黃ニ眼中翳

獨ニメ重キヲ莫ニ殊ニ左眼流淚ニ其疾麻疹ニ於ルカ如ク  
熱スル一ナリ鼻中痒ク嚏ヲ發シ或ハ衄血シ氣息蒸氣  
汗尿等ニ瘡瘡自家ノ臭氣ヲ見シ其臭恰モ蠶タニ蒸餅ノ  
如ク或ハ身体諸部癢痒ヲ帯ヒタル刺痛遊走スル一アリ  
總テ熱病ノ諸症ヲ終シ次キテ汗出テ熱大抵午後十日晡  
トニ終ス大人ニ在リテハ諸症小兒ヨリ劇烈ナリ

第二期 見點

此期ハ序熱ノ初ヨリ第三日第四日ノ終リヲ以テ始トシ  
更ニ熱ノ發作發行ト共ニ小斑ヲ見ハス此斑疹第一ニ人  
稀痘トスヘク四五粒リハ  
セル者稠痘ヲ非スヘシ 簇聚多クハ面部ニ始リ先ツ任  
振山根

上人中ニ終スル者重シトス見先口吻ヨリ示后頸胸腹ノ  
終スル者ハ輕シトス

兩側背脊腕肘手足ニ至リ竟ニ髮間ニ及足蹠ニ生スルヲ

出脊トシ輕痘ハ足蹠ニ發セサル者アリ故ニ痘必ス足蹠  
ニ發スルヲ以テ出脊ト認ムヘカラス

通計十二時ヲ以全身ニ發出ス生性痘ハ面部ニ  
生スルトナリ 其小疹始

メハ皮膚ノ赤色ト終ニ區別スヘク或ハ指ヲ以テ子細ニ

探索スレハ皮下ニ微硬ヲ覺エル者十二時ヲ過テ其中央

ノ透明點ト陷凹ト益顯著ニナリ漸ク突起メ小疹ヲ十三

疹頭白色ヲ見ワシ是ニ於テ痘圍赤色排花色ヲ良トス朱  
色ノ者ハ后紫也ニ

變アリノ腫脹增加ス痘間ヲ距ル一遠ニ從ヒ其紅暈腫脹

愈廣大ニナリ痘十分ニ起脹スレハ諸症消散メ食機故ニ

復シ精神爽快ヲ覺シ唯皮膚ノ灼熱癢痒眼目ノ微痛ヲ詔  
フルノ三九ヲ見點ノ際ハ始終咽喉眼目ニ疼痛ヲ覺シ小  
便快利セス大便秘スル者ニ又大人ニ於テハ癸汗次ノ期  
迄持タスル者アリ癸汗甚カラサレハ惡症ニアラス

弟三期 灌膿

此期ハ癸病弟六日弟七日見點四日五日ヲ云ニ人更ニ並膿挺ヲ癸  
シ其熱殊ニ夜ニ方リテ劇ク脈疾ニ人患者安靜テラス刺  
衝性知覺屬スルヲ云ノ者或ハ痘顆夥多ニ癸シタル者ハ其熱  
期中方二期四日ヲ云誓苗スル者ニ〇此期ニ至リテ痘粒及其  
間隙愈焮赤腫脹ニ中央ノ陷凹突起シ見点ノ次序ニ從ヒ

膿液充実ス重キ者ハ痘顆集合シ痘間ノ赤色增加人容貞

惡醜ニナリ眼閉合シテ見点能ス鼻孔塞リ痘五分以上ニテ眼封セ

鼻塞カチリタル者ハ竟ニ四肢腫脹疼痛ヲ運持スル一能

ハサレニ至ル此時ニ当リテ大人ハ流涎シ疼痛不寐シ其

便混濁ニ人涎渣ヲ見シ貫膿増進スルニ從ヒ赤色減シ其

膿初ハ稀薄ニ人術稠厚ニナリ癢痒甚ク患者自ラ皮膚ヲ

摩擦シ或ハ搔破スルニ至ル一アリ

弟四期 收靨

此期ハ癸病弟九日弟十一日ヲ以テ始トス是ニ於テ乃痘  
其見点ノ次序ヲ追フテ乾括スル者ナリ其痘先破潰メ粘

稠ノ液ヲ漏ラ然レ痘全ク空腔ヲ十サス其周囲ノ赤腫緊  
張ヲ遺シ漸次ニ乾キテ赤ヲ結ヒ遂ニ脱落シ黯赫色ノ堆  
痕ヲ遺ス又數日ノ間癢痒ト熱灼トヲ起ス者アリ○此期  
ニ放テ蒸氣増加シ尿中雲翳ヲ見ハシ其他赤斑痘痕數週  
ノ間去ラヌ或ハ痘痕渾濁ヲ残ス此期ノ誓苗四日痘ノ輕  
過ハ順正ト不整トニ從テ大ニ差異アリ唯自然善性ノ痘  
ノニ初期ヨリ通計十日若クハ十示日ニシテ全ク終ル

### 稠密痘

總テ痘顆夥多ニ又渾流スル者ニ於テ惡性ナラス神經熱  
ヲ兼ルカ固ヨリ論テ善性ナルモ亦危險ナリトス此痘  
如キヲ云

ハ序起ノ諸症劇シク又發汗スルト少ク且順痘ニ比スレ  
ハ見点或ハ早ク或晚ク其發出スル景况丹毒ノ如ク又已  
ニ見点スレト熱速ニ退カヌ貫膿ノ次序正シカラヌ縱ヒ  
其正キモ膿灰白色膿也ニメ結痂ニ移ルト遅ク常ニ  
流涎ヲ兼發シ小兒ニアリテハ下利ヲ發ス流涎ト利トハ惡  
固テ痘毒ニ膿起太甚ニメ膿液ヲ漏ス性ヲ非ストト患  
者衰弱スルト甚シ血中ノ滋養分ヲ失フ力故ニ此ノ如者  
ハ此場ハ痘後ニ至リテ身ヲ侵蝕ス或ハ痘後ノ後再復痘瘡  
ヲ終スルトアリ再復痘瘡或ハ潰瘍ヲ生スル者ハ生活力  
ヲ危險ナル者ニ由テ又結痂ニ至リテ痘一大片ヲ十三

其加脱落ノ後遺疑病ナリトス一多シ皮膚層滯滯或ハ眼候鼻  
直育等ノ  
類ナク云フ

嗽衝熱合併

痘瘡嗽衝性トハ固ヨリ嗽衝性ノ病ナレハ頃正痘ニアリ  
整痘ナルカ故見點ノ後モ成者ハ稍臆液様ノ諸症見ハレ  
尚諸症暫留セル者ナリ  
腸胃汚物ノ諸症ナリ序熱其ク脈強緊ニメ実頸動脈劇ク繁  
兼ル者云フ  
勤ニ内部疼痛アリテ皮膚層灼熱シ呼吸短促困難大渴引飲  
舌上苔ナク乾燥シ且火赤トナリ語言妄語シ凡テ諸症猛  
烈成者ヲ嗽衝痘トス此症第一期ニ於テ諸出血ノ血下血  
殊ニ婦人月経来ル一ナレハ常ニ嗽衝ノ状減退ス此ノ如

痘ニ於テハ眼目嗽衝熱疼痛又赤色ニナリ又眼球ニ痘ナ  
糸スル一多キニ由テ眼嗽衝侵スル日ヨリ殊ニ眼ヲ登シ又  
氣管肺藏其他内藏動モスレハ輒嗽衝ヲ登シ此ニ由テ見  
巨前乎然トメ斃ル一ナリ  
是痘ノ発地十分ナラス病毒内藏ニ轉移スルニ由ル又從  
ヒ死ヲ致サ、ルモ貫膿ヲ障碍スル力故ニ常ニ危険ナリ  
トス○痘神全熱腐敗熱ヲ合併スル者ヲ惡性症ト名クル  
ナリ稠膿性嗽衝熱ト危萬ナリト金モ生活力美シ血液混  
解腐敗ニ傾リテ以テ危殆甚シク治療難又効ナク萎シ  
唯ニ改ニ惡性ト各ク

痘疹神經熱合併

痘瘡神聖熱ヲ兼ル者ハ見息前後共ニ身体衰弱スル一其  
ク精神昏困倦シ諸力脱シ面色淡白ニ時惺惺ニ常ニ熱  
警苗シ渴少シク四肢顛掉シ脈少ニメ跌疾且顛震ニ見點  
次序正シカラズ或ハ早ク或晚クモ見點此ノ部ノ痘粒  
ニ地界ヲ分テ彼ノ部ニ在テハ簇々聚合シ見點ニ先テ榮  
スル処ノ諸症ハ輕易ニメ却テ其后劇烈ニナリ痘粒少ニ  
メ尖リ起脹微ニメ紅暈ヲ見ワス動輒痘消散シ定期ニ於  
テ貫膿セズ病初一種ノ口氣ヲ出恰塩藏ノ鑪ヨリ蒸発ス  
ル臭氣ノ如シ痘自家ノ一種臭氣痘多ク渾流ノ種々ノ形  
状ヲ十三時トメ丹毒或麻疹ノ如ニメ速ニ白色トナリ亦

右水泡此痘皮薄ク光亮竹膜ノ如ク瑠璃ノ如ク其形長  
余ノ惡性ナリ飲進ニ或稠厚ノ黃膿ヲ含メル一アリ  
ニ変ニ透明酷厲ノ水液ヲ含或ハ唯氣ヲ含時トメ腕子ニ  
胡椒子或ハ鳩印大ノ痘ヲ榮ニ見息后衰弱愈加ハリ痘因  
結麗土ノ如クニ白ク若麗土ハ似タリ骨皮膚層嬌嫩ニメ冷  
ハ上口唇率急シ全身強硬メ遂ニ死ニ瀕ス又時トメ周圍  
白色ニメ痘顛汚穢天藍色ニナリテ突起ス若シ貫膿ニ至  
ルモ亦順正ナラズメ乳頭状ノ如ク硬腫ヲナス此ノ如キ  
者ハ呼吸寬靜ニナリ搖擗或ハ内部嫩衝日曲テ急死ヲ至  
ス一アリ

腐敗熱

痘腐敗熱ノ症候具ハリ痘疹榮見メ即搔癢覺不各青色  
或ハ赭褐色或ハ黒色ヲ見シ痘窩陥所侵蝕性ノ液ヲ含シ  
或ハ其液中血ヲ帶ヒ痘間ノ皮膚皴狀ノ如キ斑ヲ帯シ其  
斑腫脹セズ却テ跨窠膜表皮ノ下ニアル模ナリ中ニ浸揺シ鼻孔腸中  
尿道等ヨリ敗黒血ヲ漏出ス是ニ由テ諸力速ニ減耗シ痘  
中造膿ノ微アルトテ少病室屍臭滿步依中ヨリ漏出スル  
諸物啞小便疼亦亦屍臭ヲナス是血液溶解腐敗セルノ致ス  
也ナレハ第五日第六日ニ当リテ死スルモノナリ

合併諸病

胆液或ハ其他肝部膿迫ヲ覺ハ口中若ク或ハ  
尾私多利設腸胃中汚物蛔虫粘液酸敗舌苔積ノ微アル  
才覺大便其他ノ粘排泄物常ニ異ナル等ナリ聖京極様此症ハ  
諸症咳嗽困倦涕淚目赤下多ク結舌咽喉鼻口直腸ノ如  
キ粘液膜ニ變化ヲ致ス  
儂戸復則様重京極ノ諸症ニ似テ肢節ヲ帯シ其痛ノ感動  
及ヒ他ノ諸病膿血皮膚病痛ヲ帯シ是ニ由テ其経ノ次  
序ヲ妨碍スルト多少アリ

第一期

此期ニ於テハ疾ノ轉候ヲ預メ以テ来スル能ハス痘瘡  
飯ヲ預メ来スルハ痘類ヲ以テ推シルヲ切実トス痘疹榮見  
セサルハ痘瘡タルトテ決定シテ推シルヲ切実トス痘疹榮見

然氏大抵第一期ノ熱緩性ナル者ハ良徴トシ難ク却テ  
危険ニ陥ルト多シ極輕病ニ於テ第一期ノ熱ニ及テ大抵  
乾燥大渴引飲譫言妄言其他熱病ニ傍登スル諸症ヲ合ス  
ル者ニ於テハ他病ヲ加ヘス播擲モ亦劇甚ナラス蛔虫生  
久ク未嘗者ハ且長ク暫留スルニ非サレハ危険ナルト云テ  
リ此諸症ハ痘十分ニ登見スレハ速ニ消散シ却テ其痘良  
性ナル者多シ○劇甚ノ躁擾煩悶ハ危険ナリト虫鬱憂昏  
迷嗜眠持久シ脈漸ク細少トナリ患者統テ戰振スル者ニ  
比スレハ危険少シ胆液様其他厄私多里設ノ状態ナリ屢  
ク嘔吐シ腸胃ノ因アルモノ序熱中吐下且ツ因若メ吐シ

難ク内藏烈シク疼痛シ胸部ノ刺痛ニ煩悶心悸動ヲ兼ル  
モノ声音弱ク或ハ全ク出入言語明ナラズ顔面黧澹萎衰  
シ弁識ナク鬱憂スル者ハ連綿タル鬱憂昏迷ノ如ク経過  
危険ヲ兆ス發汗劇甚ニメ防止シ唯若ク大抵大人ニ於テ  
ハ危険トス○流涎愈々早ク粘液愈々膠厚ニメ咯出シ  
難キ者或腰痛腋痛甚キ者ハ愈々稠密惡痘ヲ兆ス○序熱  
一二日前或ハ見點ノ始メ何レノ部力多少ノ大痘ヲ登シ  
貫膿シ或ハ腋下ニ膿瘍ヲ登スル者アリ此ニ症善兆ナル  
ト多シ

第二期

此期ハ痘毒ノ侵入シテ皮膚ノ深部ニ至リテ膿瘍ヲ成スルニ至ル也



少絶呼吸困唯譫言狂躁或ハ弁識瘵亡シ昏睡スル者或ハ  
一度流涎セシ者今全ク閉止シ腹中雷鳴ハ或ハ下利スル  
モノ等ハ第九日ニ方テ通直ノ便一行アルハ善ク已ニ  
下利ハ内攻ノ兆ナリト魚小兒ニ於テハ之ニ由テ危険モ  
ス心テ痘瘡経過ノ間此期ヲ危険トスルハ神圣痘腐敗痘  
ハ多ク第八日第九日ニ死シ稠密渾流ノ痘ハハ少シモ膿無  
九日ニ死ス猶膿スル者ハ第茹第十日ニ方テ死ヲ致  
力故ニ○此期ニ至テ預メ善惡ヲ決スルニハ貫膿ノ景况  
ヲ以テスルハ諸微ノ内最切実トス殊ニ前額ノ痘ヲ目的  
トス從ニハ眉上ヨリ髮際迄ノ間ニ患痘百箇アルハ一ア

貫膿ニ至ルノ痘二十箇ニ及テ者ハ間々死ヲ免ル。一ア  
リ其他面部及ヒ身体四肢ニ貫膿アリト魚死ヲ免ル。一ア  
無シ○痘瘡見点ヨリ四日ニ至テ速ニ黄色トナリ恰モ膿  
熱スル力如ク殊ニ黄熟口辺ニ於テ甚ク委細ニ之ヲ診察  
スレハ含蓄ノ液真膿ニ非ス一種ノ酪房液ニメ多ク尾私  
多里設ヲ兼テ収靨ノ順序ヲ失ヒ見点ヨリ十二十三日ニ  
於テ死ス

第四期

前ノ三期ニ於テ経過順正ナル者ハ此期ニ較テ死ス者稀  
ニ○痘全ク乾燥セヌ或ハ甚日ヲ延キ或順序ヲ失シ此部

八既ニ痲ヲ結フニ彼ノ部ハ末夕疹ヲ十ス者又大小便難  
 ヲ皮膚乾燥ニ尚潰瘍ヲ遺シ敗血漿ヲ多ク瀰ス者ハ遺隸  
 病ヲ恐ルニキ也遺隸病多ク皮膚ニ癢スル片ハ深ク浸蝕  
 ノ骨ニ及ヒ或ハ腐骨或ハ骨ヲエントドール多骨腐骨疽  
 骨腫ヲ發シ又水腫四肢麻痺屈曲關節癒着慢性眼焮衝ヲ  
 癢ニ角膜翳ヲ殘シ又眼瞼慢性焮衝ヲ癢ニ癒着シ或ハ流  
 淚眼焮衝淚管漏眼灰白內障眼黑內障耳聾瘡耳烈ニキ咳嗽  
 痰血瘰癧性ノ喘息肺勞神識ノ衰弱痲痺健忘黑胆液病等  
 ヲ癢ス又身体大ニ衰弱ニ諸液ノ病的ノ性トナルニ由テ  
 勞瘵熱及ヒ諸腫病水腫狀ノ諸腫亦ヲ繼發

治療總論

夫瘡癩ハ別ニ挾雜ノ症ナリ順正ニハ顆粒多カラサル者  
 ノ治療ヲ施スニ及ハス唯自然良能ニ任セ第一期ニ於テ  
 ハ防焮ノ養生ヲ護リ室中ノ氣ヲ清涼ニシ溫度ハ患者ノ  
規則ニ從テ之ヲ増減セサルヲ良トス然レ小兒ノ如キハ  
其好ム處ヲ知ルヘカラサルカ故ニ溫度列ニ垂見黒見ノ寒  
溫計十四度トス盡日ニ於テハ清鮮ノ氣中ニ居ラシメ適宜  
以テ適度トス  
 二身体ヲ運動セシメ若シ之ヲ為スル能ハサル者ハ室中  
 氣ヲ交換清潔ニシ温覆ヲ禁ニ神志ヲ慰スルヲ良トス  
 此法方ハ瘡順正ニハ患者常ニ体格健康ノ者ニ宜シ虛弱  
 ノ小兒或ハ常ニ冒寒ニ易キ者ハ或ハ温暖ノ保護常習ト

十ル者等妄リニ行フ片ハ見点ヲ妨ク或内陷セシメ聖京  
倭樓ノ頂私ヲ合併ス又衰弱甚キ小兒ニ於テ清涼ノ撰生  
ニ過レハ急死ヲ致ス一アリ扶歌ノ空日總テ瘧中ハ新  
涼ノ氣ニ冒爾メ瘧瘡忽チ内陷ニ由テ瘧ノ症ヲ發セシ者  
ノ身体ヲ温暖ニ保護セシムルニ由テ瘧ヲ退キ瘧瘡再ヒ  
又内陷セテアリ此ヲ以テ考レハ寒氣ハ瘧瘡ノ發出ヲ妨ク  
ニ爾ト雖寒氣ノ瘧ニ於テハ瘧瘡ニ變セシムルハ明ナリ午カ  
期ニ於テハ常ヨリヤ、身体ヲ温暖ニ保護スルハ温暖ハ  
過トスモ布ノ茵蓐厚衣ノ殊ニ第ニ於テハ寒冷氣  
ヲ侵ス寸ハ動モスレハ貫膿ヲ妨ク病毒轉移ヲ致ス力故  
ニ之ヲ慎ニ唯室中ノ空氣ヲ交換シ之ヲ清潔ニスル一ヲ

要ス何レト成レハ此期ハ瘧ノ傳染氣多ク大氣中及ヒ他  
ノ物ヲ傳播スルニ由テ空中ニ不潔ノ蒸氣鬱滯シ是ヨリ  
熱ヲ發起シ諸夜ヲ變性スル一アリハナリノ小兒瘧瘡ヲ  
撥破スレハ面部ニ滲澤ヲ遺ス力故ニ意ヲ用テ之ヲ防ク  
ニシ

### 不整瘧治法

第一期ニ於テハ瘧瘡タル一確定シ難シ故ニ熱度及ヒ傍  
癘ノ諸症ニ応ニ熱病ノ治則ニ從ヒ之ヲ処置スルニ扶歌  
ハ瘧毒ノ萌生ヲ戒ニ力為シ第一期第二期ニ於テ加ホ  
ルヲ取テ小兒ハ半食ヨリ一食大人ハ二三食ヨリ二三食  
日ニ一ニ次用ヒ又吐瀉清涼ノ疎通劑ヲ与テ一道路ヲ潔  
清ナラシメルヲ要トス殊ニ小兒ハ始廢々通利ヲ得セ

メテ年多血ノ者ニ於テハ刺路ヲ行又吐酒石ヲ水ニ  
下利ナキモ清淨ニ吐リテ劇勸ニ由テ毒ヲ直ニ排シ  
シ瘧ノ類ノ自然吐下ノ始莫大ナリト云フ故ニ此方  
法最モ良トハ可キ者ナラズ然ルニ序熱ニ於テ瘧  
確定スルトハ他ノ熱病ヲ誤テ瘧トシ加苗タルヲ  
用ヒ治療ヲ行ヒ適度ノ劑ヲ用テ腸胃ヲ清淨ニスルヲ以テ  
瘧トス期ノ治此期ニ於テ瘧スル播擲ハ見点后速ニ消散ス  
故ニ戸窓ヲ啓キ新鮮清涼ノ氣ヲ受クルヲ以テ足レリトス  
然レ瘧劇キ嗽衝起テ兼子脈緊ニメ謔言昏睡播擲亦ヲ瘧  
スル中ハ大人ニ於テハ刺路ヲ行へ硝石此症ニハ中硝石  
以下劑ヲ用ル硝石ニ勝稀塩酸或ハ酸味ノ飲液扶歌蘭  
ニリトス

瘧ノ類ハ大小便ノ通利ヲ増劇ニ患者ノ力ヲ内服セシメ  
為ニ衰耗スルニ至ルアリト云フ  
清涼新鮮ノ氣ヲ吸入レ冷水ノ以テ頭部ヲ洗ハシメ小兒  
ニ於テハ時ヨリ長ク苗連スルメ如擗ナル故ニ清涼治方ヲ持  
ムルナラズシテ顯顯ニ水蛭ヲ貼シ稀塩酸ヲ内服セシム歌扶  
蘭土ノ瘧瘡ニ於テハ硝石中和塩ノ如キ真ノ清涼劑ハ瘧  
ノ刺衝機ヲ換害シテ衰耗下利ヲ經スルニ在改ニ瘧和稀  
経劑誘導ノ方法ヲ以テ瘧ノ清涼劑トス瘧瘡少キカ  
故ニ示カト云ハセシ年ノ流行性ハ以テ瘧ノ嗽衝機少キカ  
行テ示カト云ハセシ年ノ流行性ハ以テ瘧ノ嗽衝機少キカ  
二流行スル瘧瘡ニ緩和劑誘導ノ法ヲ用テ瘧瘡ノ多クハ小兒  
十ニ力故ニ緩和劑誘導ノ法ヲ用テ瘧瘡ノ多クハ小兒  
防刺路過當ノ症ヲ見ワスモハ硝石中和塩等ヲ用テ清涼  
知覺銳敏ニメ神經体ノ刺衝ニ由ルモノハ阿芙蓉ハ細碎



ヲ脈腸ニ貼シ 破衝瘰癧ニ於テハ莞菁膏苒子冷水ヲ以テ頭  
部ヲ洗片ハ顔面ニ瘰癧ノ瘰癧出ヲ減スリ莫私多日先微温湯ヨ  
後リ顔面頭胸腕ヲ日々洗滌シ清涼酸菓ノ飲料或ハ冷  
水ヲ飲シメ酒石ノ下劑或ハ行ヒ日々過直ノ  
通利ヲ便ニ過セシム瘰癧見点ノ熱尚増進シ昏眩嗜眠  
痛舌苔ヲ顯ハス者多クハ蛔虫腺腫等ノ内アルニ由ル此  
ノ如キ症ハ治瘰癧丸直シク  
治瘰癧丸方 加羅女児夏右一味鏡烈燒酒過直ヲ加シ火  
ニ上セ水氣ヲ散シ白蘆饒ヲ以テ八十九三患者ノ年齢  
ニ從セ用エ可シ一歳ハ一粒二歳ハ二粒其餘之ニ順スレ  
滿那一日四至ルリ等ノ下劑ヲ予テ通利ヲ取リ蛔虫ニハ

乳汁ヲ以テ灌腸法ヲ行フヲ良ト大腸胃中胆液鬱滯ノ症  
ハ微量ノ耳永谷ノ林度吐酒石等ヲ配伍シ粘液滯積ニハ  
酒石礮砂ヲ適當トス○瘰癧毒固着之性ニヨリ或ハ患者ノ  
体質ニ由テ他ノ因ナク見点起脹怠慢ナル者ハ之ヲ催進  
スルニ能ハス然レ昏冒謔言妄語狂躁搗搗水浮探衣摸狀  
小便短少ホノ症ヲ瘰癧ニ見點起脹怠慢ナルハ蛔虫生齒或  
ハ瘰癧毒惡性酷厲ニメ皮膚層ノ神至ヲ劇ク刺衝スルニ由テ  
瘰癧ス此ノ如キ症ハ亞鉛荖ヲ用テ皮膚層ノ瘰癧ヲ鎮靜ス  
シ此菜ハ其効驗速ニメ切実ナリ殊ニ小兒ニ在テハ放肆  
常ニ倍ス故ニ惡果ノ藥劑ヲ投スル難ニ亞鉛荖ハ無味ニ



中ニ之ヲ用レハ却テ其運営ヲ扶テ謔語瘥寧搦搯殊ニ皮  
層ノ瘥寧ヲ鎮靜ニ造膿ヲ助テ熱ヲ過度ニシ莖氣ヲ發起  
シ瘡瘡灰白平塌スルヲ赤也トシ起脹セシム故ニ其症ニ  
從テ他ノ藥ハ配伍シ用レニ喻ハ常ニ蛔虫ノ瘥アル者ニ  
再服ヲ伍スルカ如シ○皮膚ノ瘥寧ヲ鎮靜セニト欲セハ  
一歳ヨリ三歳ノ児ハ二六歳迄ハ三六歳迄ハ四八歳  
取り一取毎ニ用テ十二取ヨリ十八時間持久ニ其後半日  
間体止ニ再ヒ大量ニ之ヲ用テニ然ラサルハ他ノ鎮瘥  
劑ノ如ク習テ効ヲ奏シ難シ○上ニ列挙スルカ如キ頭腦  
ノ諸症ヲ瘥スル者ニ於テハ其因ヲ問ハス脚湯法ヲ行ヒ

乳汁ニフテ子ルヲ浸シ腋部皮四支ノ纏絡ニ脈腸ニ效子  
泥ヲ貼シ緩和ノキリスラレテ行ニハ瘥寧ヲ鎮メ熱ヲ減  
シ表皮ト尿道ヲ開キ沕レ液ノ酷厉ヲ緩和稀釈ニス○時  
トメ大人ニ於テハ此期迄焮衝熱誓苗シ瘡ノ見点起脹ヲ  
妨碍スルコトアリ期ノ如キ者ニ於テハ清涼劑ヲ待長ニ症  
ニ從テ顛顛ニ水蛭ヲ貼テ諸言昏睡搦搯狂躁ノ如キ腦ノ  
○昆判美曰傷血ハ第一期ニ行テ常法トス其後ハ患者  
多血ニメ身体強硬脈緊美強ノ如キ真焮衝ノ諸瘡ヲ見ハ  
ニ其焮衝莫要ノ部ニ瘥セル知覺遲鈍ニメ對抗熱瘡ニ  
モノ耳之ヲ行テ直ニトス  
良能此毒ヲ排泄セシトスヲ瘥人ニテ勞ヒ不定ナル力故  
ルニ由テ對抗熱ト各クヲ瘥人ニテ勞ヒ不定ナル力故  
ニ見点セサル者ハ速ニ吐劑行ニ此ニ吐劑ハ腸胃汚物ノ為

此刺動ニ因テ痘ノ發ルヲ促スル為用ルニ布羅涅兒ニ芥子ノ浸割ヲ浸シ兩脚  
ヲ浴包シ或ハ完膏膏芥子泥ヲ敷入如此症ハ病毒轉移ニ  
易ク骨ニ潰瘍ヲ發スルヲ防フ故ニ發那ハ扶敵毒ニ利ノ期  
ナリニ由テ収斂劑善アリ然レ發那ニ適當ノ症アリテ止  
ムトテ得テモハ薄葉トシ他葉ヲ配伍シ用ヘシテ止  
亞兒尼加葡萄酒ホヲ服サシ人國ノ刺衝挽過甚ナルニ由  
テ葡萄酒過當レカタシト云々昆刺美又之ヲ内服茶ニ用ヒ  
スレ梅毒スルニ多クハ適當スル者少クカラ以テ然レ小兒  
常ニ酒ヲ好ム力如キハ用ヒ温浴法ヲ行フ昆刺美酒葡萄酒  
亦ヲ配伍此期ハ痘毒眼目ヲ浸スナアルニ注意シ冷水ヲ  
以テ屢洗ヒ電腦布浸シタル布ヲ云々又ハ電氣水ヲヲ眼  
上ニ置キ是ヲ防フニ若シ斑點ヲ為モノニ於テハ鉛糖水ヲ

滴入シ之ヲ消散セシムニシ○大便不利水汚ナラサル下  
利ハ止マラズ  
ニ由テ起脹急腹ニ或ハ痘瘡惡色トナリ起増進ニ其他惡  
症ヲ發スル者ハ因其ニ從テ之ヲ療ムニ腸胃中胆汁蚶  
虫其他ノ汚物滯滯ニ由ル者ハ乙百葛格之吐劑或確砂ノ  
解疑劑施綿施那治痘凡其適當ノ下劑ヲ撰用ニ積滯ヲ徐  
キ之ヲ留止スニ乙洩乙液溶解ニ一種ノ酷厲物ニ變ニ腸  
ヲ刺戟衝動スルニ由テ下利ヲ發スル者ハ眼目鼻中ヨリ  
酷厲液ヲ漏ス此ノ症ハ確砂効ナク下利モ亦腸ノ刺衝拔  
ヲ増進ス故ニ沙列布或ハ舍電波讓各ノ並刺比亞煎ノ如  
キ緩和保換ノ劑ヲ内服セシメ醬粉ノ幾利私的示ホヲ行

トシ此下利ニ由テ患者衰弱スルヲ恐ル、時ハ微量ノ  
吐根吐根ハ吐下ノ効實ニ此ノ皮膚ノ痙攣ヲ鎮靜シ莖莖ヲ  
ヲ用テ右ノ法方尚効ナキ時ハ阿芙蓉此藥ハ吐下鎮靜ノ  
魚氏魚氏幼穉ノ者ニハ害ヲ為故ヲ用テ之ヲ止ムニ然レ瘧  
瘧十分ニ膿膿シ酷房ノ初ニ液ヲ排除スルニ非ラサレハ  
一度苗ルモ復タ瘧スルノ常ニ多シ○皮膚膨脹ノ年之ニ  
觸ルニ莖餅ノ如ク神識致疾ノ者ニ於テ屢々下利ヲ瘧  
スルノアリ此症ハ瘧神全熱ヲ蕪子知覺銳敏ヨリ瘧スル  
者ナリ此症ハ温煖ニ保護シ腹部ヲ温煖揮瘧ノ劑ヲ以テ  
遂漏シ脚湯ヲ行ヒ燼巾ニ民經列里精ヲ加ヒ内服セシム

下利尚甚シキニ於テハ微量ノ阿芙蓉此症ニハ舎電振護

灌膿之劑

第三期ハ已ニ之レ迄行フ治療ニ由テ過劇ノ刺衝ヲ過度  
ニシ貴要ノ部ニ血液逼淺スルヲ防キ神経ノ運営ヲ狂リ  
良膿ヲ膿入者等ニ於テハ医治ヲ要セム然レ凡瘧毒排泄  
ノ道路ニ障碍アル者ハ医家務テ之ヲ除クニ從ヒハ皮  
膚之運営皮神全ニ刺衝ノ景况尚殘苗スル者ハ瘧ノ瘧出  
及ヒ灌膿ヲ妨ク又序熱ニ由テ諸運営衰弱シ熱此ノ期  
ニ至テ尚退クカサレハ自休ノ諸液溶弱腐敗ニ傾キ易ク  
瘧瘡隆起セム或ハ陷凹ニ思也ヲ頭入者ハ西鉛膏ヲ用ヒ

皮膚ノ瘡乎ヲ鎮メ幾那做衝ノ景況ヲ魚ル者ニ禁ヲ兼用  
ムレハ身体ノ諸器ヲ保固強壯ニシ織維ノ弾力ヲ増シ腐  
敗ヲ防キ瘡瘡ノ起脹造膿ヲ扶ク苔麻林度利ヲ要スル者  
胆液ノ性ヲ魚ハ強キ下利ヲ禁セズ適宜ノ通利ヲ催シ石  
饒様ノ酸質ヲ含ム故ニ幾那ニ配伍シ用レハ此人如キ症  
ニ撐効ヲ奏ス強キ抗酸ヲ此ノ症ニ用レハ咳嗽下利ヲ増  
劇ニ水瘡瘡稀薄ノ液ヲ含ミ灰白ノ起脹ヲ防ク故ニ植物  
酸ト魚氏用ルルヲ禁ス○瘡瘡陷没シ水様ノ液ヲ含ミ  
水様水様其類嬌嫩ニメ紅暈去リ皮膚慘黯ニメ冷一顔面脹腫  
十分十ラズ瘡乎様ノ戰栗ヲ禁シ或ハ咬呀スル者ハ神全

熱合併ノ症トス阿芙蓉丹衣ノ香竜齒魚兒尼加温浴法荒  
菁膏水銀摩擦法如ルニ虚症ハ水様瘡ニハ水銀摩擦法在  
此ヲ兼用スルニ由テ下ノ水銀條等ヲ撰用スルニ○皮膚  
ノ瘡乎誓由シ瘡疹猫四シ膿ヲ含マサル者ハ竜齒良効ヲ  
奏スト魚内服セシムルハ煩悶壓迫亦ヲ免ス故ニ外用  
及七幾利私埵児トシ用ルヲ良トス○面部腫脹減退シ瘡  
瘡急率ニ乾燥スルハ内陷ニメ危篤ノ症ニ布羅涅児ヲ温  
乳ニ浸シ兩腕ヲ圍繞シ或ハ芫菁膏末ト芥子ノ麩布ヲ造  
リ之ヲ貼スレハ胸内ニ窮積セシ液ヲ外表ニ誘導シ  
瘡瘡ヲ夷シ良膿ヲ膿メ故ニ分利ノ期ニ先后セズ的當ノ

時ニ此外用法及ヒ脚湯ヲ行ヒハ胸部ノ諸症ヲ除キ瘡瘡  
ヲノ順正ニ経過セシム○常ニ腺腫ヲ患ル小兒瘡ニ瘡ル  
片ハ毎日一二入ノ耳液ヲ用ヒテ腺腫ヲ解疑ニ流涎ヲ催  
スニシ此葉ハ唾腺ノ運営ヲ増進シ咽喉胸内ノ粘稠液ヲ  
疏解シ瘡瘡ノ榮出隆起ヲ扶ク○此期ニ榮ニル流涎ハ瘡  
毒分利ナル力微温ノ飲劑ヲ多服セシメ冷飲ヲ避ケ務テ  
之ヲ催スヲ良トス故ニ津唾甚タ粘膠ニメ持ニ遏止セシ  
トスル者或ハ吐咯スルノ困難ニメ呼吸室塞セシトスル  
ノ恐アル者等ハ軟和菜芍藥 錦葵 大麦 無花果ノ類ノ蒸氣或刺戟菜合  
漱劑西亦尼加白並根尔偏注射法以テ喉中或ハ鼻中ニ榮  
答里亞苻子等ノ類

汁ヲ注射 蒸漏劑ノ昆刺刺ハ芥子等ヲ行ヒ芫菁膏ヲ咽喉ノ  
外部ニ貼シ水銀軟膏ヲ頸ニ摩擦シ或ハ耳液ヲ口内ニ擦  
入シ耳液金硫磺結尔茂私密濕利列微量ノ吐酒石等ヲ用  
ヒ又身体ノ衰弱甚キニ由テ流涎止ム者ニハ神全強壯劑  
瀨中亞尼加電出產白並鹿ヲ内服セシム危急ノ症ニ  
角精耳硝石精福布滿鎮痛液類  
於テハ其狀態ニ從テ浮血吐劑モ亦行フニシ○醋房ノ津  
唾ヲ分泌スルノ夥多ニメ口内及咽喉侵襲セラル者ハ  
粘滯菜ノ含漱劑ヲ以テ之ヲ緩和シ芫菁膏ヲ項ニ貼シ海  
葱醋蜜及自他ノ利尿菜ヲ用テ醋房液ヲ誘導スニニ津唾  
ヲ嚥下スル片ハ其醋房液ニ由テ疼痛煩悶掃擗ホヲ榮シ

冷ニ死スル者アリ故ニ必嚙下ヲ禁ス○此期ニ於テ眼中  
ノ白膜角膜ホニ痘疹ヲ登スルヲ見ハ速ニ稀鉛糖水或ハ  
稀升汞水ヲ滴入シ或ハ赤降膏ヲ眼腔内ニ塗リ又項ニ羌  
膏膏ヲ貼ニ痘疹ヲ消散セシムルヲ好ムニ日欬糖水  
ハ痘疹ヲ消滅シ及ヒノホノス腺ニ痘毒固着スルヲ防  
キ眼中ノ痘ヲ潰瘍工至テシメス此期ニ於テ眼病ヲ登ス  
ル中ニ必治スル難シ故ニ痘中ハ温乳ヲ以テ屢々眼汁  
ヲ潤灌シ或ハ洗滌シ眼腔ノ処置シ屢々鉛糖水ヲ滴入ス  
ニシト登見ノ後六七日ニ至テ痘瘡渾流ノ膿ヲ含マズ偏  
四思也トナリヒニ四日間状態ヲ変セズ或ハ面部ノ腫脹  
終ニ減退シ膿ヲ膿サズ乾枯シ或ハ皮膚層剥脱メ灰白トナ  
リ其也皓麗土ノ如ク四支浮腫ニ或滋潤シテ赤色光沢ヲ

失ヒ是迄非常ニ増劇セシ皮膚層ノ灼熱及知覺頓ニ止ニ脉  
細疾トナリ呼吸困重聲啞シ四支顛震諸力脱シ惡臭ノ者  
ヲ下利シ煩悶搐搦ヲ登スル者ハ險惡危篤ニ人良能ノ運  
營抑壓セラレ對抗力ヲ莫起シ痘毒ヲ驅除スルヲ能ハサ  
ルノ致ス処ナルニ由テ素ヨリ医術ノ及者ニ非スト至防  
腐衝動強性ノ劑昆刺臭曰疾ノ状態ニ從テ芳香ノ菜品葡  
萄ハ電出油ヲ浸シタル布綿ヲ以テ身體彼是ノ部ヲ摩擦シ  
或ハ芳香膏ノ浸劑ニ葡萄酒若クハ酒精ヲ加テタル蘆漏  
劑羌膏皆皆効アリ又腐敗ニ非テ誠ムニ然レ此諸劑  
ル痘ハ温煖ニ保護スニシト云々誠ムニ然レ此諸劑  
効ヲ奏スルヲ稀ニメ多クハ一二日ノ間ニ死ヲ致ス○痘  
ノ形状常ナラズ多ク初ニ様ノ液ニ血ノ交合セシモノヲ

含ニ痘間ノ皮膚層ニ血斑ヲ生シ鼻孔腸中ヨリ虚性ノ出血  
ヲ發スル者ハ腐敗熱ノ治法ニ從テ之ヲ療スニ殊ニ皮  
層ヲ劇ク刺戟スル者ハ幾那抗酸ヲ内服セシメ竟出テ皮  
層ニ擦入スルヲ良トス○各期ニ於テ恢復熱ヲ發ス然レ  
惡性痘ニ於テハ其目的ヲ誤リ反テ刺戟増進ニ血液ヲ腐  
敗ヲ倍加スルカ故ニ此ノ如症ハ衝動性強ク刺戟ヲ増進  
セサル薬劑ヲ佳トス阿芙蓉ハ過度ノ刺戟ヲ鎮靜ニ皮膚  
ノ神全強壯ニスルニ由テ痘毒ヲ外表ニ誘導スル生活ノ  
運営ヲ適度ニシ其毒ノ身体ヲ蕩蕪スル勢ヲ挫ク効ヲ具  
有スルカ故ニ惡性痘ニ於テハ神全強壯劑中ノ冠トリ煩

悶狂躁面色灰白痘頂黒色陷凹スル者或ハ痘瘡乾燥スル  
者声嘎喘鳴嚔下困難衰下利不眠瘧等ノ症ニ用テ惡性  
ヲ鎮靜シ膿ヲ膿ニ痘瘡ヲ再發セシム昆刺美日咽喉疼痛  
割莖漏割其他胃脘ノ嗽衝ニ称亞芙蓉ヲ用テ害アル諸症  
用スル諸薬水蛭ホヲ用ト云々ヲ兼發スル片ハ他ノ薬ト配伍シ或急用ノ之ヲ防クニ  
從令ハ諸液ノ沸騰或ハ血液腦ニ逆流スル者亦ニハ酸質  
ノ薬ヲ配伍シ或ハ醋水ノキリスヲ用テ兼用ニ足部ニ  
茶泡膏ヲ貼入大便秘結スル者醋水ノ吉利松的兒ヲ行ヒ  
或ハ多末林度漏那ホノ下劑ヲ兼用ニ之ヲ防クニ○阿  
芙蓉ヲ麻酔力ヲ恐ルニ者ハ哥喜一茶碗ヲ兼用ニ之ヲ減

スルヲ佳トス又之レニ無テ然レズ幾那ヲ内服セシメ或  
ハキリスラールルハ内服ノ量ニ倍カスニト云クトシ用  
ルヲ殊ニ良トス此菜ハ其量ヲ精細ニメ用ルト要トス殊  
ニ小兒ニ於テハ僅ニ過用スレハ危險ノ麻痺ヲ發ス故ニ  
造膿弟クハ鎮痙ノ為ニ用ルニハ微量ヲ取り屢子フルヲ  
良トス寃葛兒曰阿片ヲ持長シ用レハ大害ヲ為ス故小兒  
ニ於テハ舍電其症退片ハ速ニ后服ヲ禁スニト云フ阿芙蓉液一滴ヲ亞鉛花ニ瓦中ニ隔シ砂  
糖ヲ加テ用テ粉ニ至ルモ二滴ニ過ク可カラズ莫私  
片ノ兪ヲ唯ハ刺衝機大過ニメ知覺機ハ達シル力故ニ阿  
禁スト若阿芙蓉ヲ内服セシメ難キ者ニハ幾那ノ煎汁ニ

混和シキリスラールヲ以テ肛門ニ注射スレハ其効内服  
ニ同シ○菜液ヲ注射シ又シク腸中ニ留止スルト要ス  
ル症アリ然ルニ小兒ハ忽チ洩泄メ長ク之ヲ保タズ此時  
阿芙蓉液一二滴ヲ混和シ灌腸スレハ直下ニ漏ストナシ  
○阿片適當ノ症ヲ見ハシ身体ノ衰弱甚キ者若クハ諸液  
溶解ニ傾ク者ハ傑列乙様ノ品沙列布煎鷄肉汁亦ヲ用ス  
ニシ是亦ノ品ハ輕キ茲養ノ類ヲ具フルニ由テ此ノ如キ  
症ニ適當トスト金滋養ノ類ヲ多ク含蓄スル品ハ此症ニ  
大害アリトス○痘灌膿スルト最モ甚キ者ハ尖利ノ乱力  
或ハ小鉄ヲ以テ痘巔ヲ破リ膿ヲ洩シ尔后海綿ヲ温乳或

ハ微温湯ニ浸シ痘ヲ洗滌スレハ皮膚ノ緊張退キ熱及ヒ  
神全諸症ヲ減シ膿液ヲ血中ニ吸伏スルヲ防禦ス莫私  
相密痘ハ之ヲ破洞ニ海綿ヲ温乳或微温湯ニ浸シ其部ニ  
置キ意ヲ用ヒ膿汁ヲ榕出シ少シモ膿ノ十キ様ニ共ニ  
膿ヲ溶解シタルヲ待テ之ヲ行フニ○水銀ハ第一期二期  
ノ初ニ於テ良効ヲ奏スト虫灌膿ノ期ニ於テ惡症ヲ顯ス  
者ニ之ヲ内服セシムレハ衰托下利ヲ増進スル力故ニ慢  
ニ之ヲ投スニカラス然レ此期ニ至ラ尚水銀適當ノ症アリ  
第一ハ脾藏若クハ皮膚ニ閉塞有テ瘰癧出或ハ起脹ヲ妨  
ク初ヨリ惡性ニノ痘瘡灰白陷凹ナル者ニ已ニ阿芙蓉ヲ  
試用メ良膿ヲ醸サ、ル者第一ハ皮膚ノ腺非常ヲ硬厚ニ

ノ分離ノ運営宜シカラサル者ホニ水銀膏ヲ外用スレハ  
強ク局処ヲ刺戟スルト猶厚ノ物ニ液ヲ稀釈解疑スルト  
人ニツノ効力ニ由テ膿ヲ醸然ス其方尋常水銀膏黎豆大  
ヲ取り頸腕内股ホニ擦入スレハ皮膚ヲ火醸膿タル力為  
ニ便トラシムニ由テ痘瘡内ニ良膿ヲ顯リスニ至ル迄三  
四日ノ間一日ニ一次之ヲ行テ良トス此ノ方ニ由テ膿ヲ  
醸ニタル痘瘡ハ収靨ノ期ニ至リ尚定度ヲ越テ造膿ノ運  
営止マサルト有ト虫其他害アルヲ見ス第一ニ痘瘡ニ於テ  
ハ其毒皮表ニ集積スルニ由テ他病ニ水銀膏ヲ摩擦セシ  
加ク吐涎ヲ發セス血液ヲ溶解セス皮膚ノ水脈ヲ刺戟衝

動シ血液ヲ稠厚ニスルニ由テ却テ脈浮ニ人莫トナル故  
ニ惡性ノ水様痘ニ外用スレハ衝動割トナル其効發泡蒸  
ノ如ク甚ク峻速ニメ又痘毒ノ酷厲直チ挫キ惡性ヲ殺セ  
サラシム水様痘ニ水銀蒸ヲ用ルルニ恐ルニト虫扶散菊  
土昆刺実兩其説内一般ナルカ故ニ予之ニ從テ  
誠用セシニ其水様痘ハ腐敗ニ傾ト虫寒涼氣及ヒ酸性ノ  
効確美ナリ  
者善アリ此ノ如キ痘ハ血液ヲ稠厚ニスル諸法ニ從テ腐  
敗ヲ防止スルニ○鼻孔閉塞スルニ由テ呼吸ヲ障ルル  
甚キ者ハ温ノ蒸氣ヲ鼻中ニ薰蒸シ温乳或ハ軟和ノ菜液  
或ハ醋密ヲ水ニ和シ鼻中ニ注入シ鼻中ノ痘痂ヲ除去ス  
レハ大ニ輕快ヲ得ルナリ○痘ニ由テ封眼スルハ自然ニ

任スニ然レ煖衝熱疼痛アル者ハ温乳或ハ軟和ノ蒸氣  
ヲ行ヒ酷厲ノ痰液及ヒ膿様ノ液ヲ破ス者ハ注意メ眼瞼  
ヲ恐キ痘乳或ハ母乳ヲ眼中ニ滴入シ或ハ小水銃ヲ以テ  
注射スル良トス

收醫

此期ハ甚ク危險ニメ死ヲ致スモノ多シト然レ之レ迫行  
ヲ治療ニ由テ生路ニ趣リ者亦少カラズ大凡此期ノ母危  
ハ灌膿ノ善惡ニ關係ス故ニ二流ニ區別ス之ヲ療スニ  
第一痘ノ景况宜シカラズトイフニ始ヨリ治ヲ怠ラズ  
腸胃ヲ清淨ニシ努力メ痘毒ヲ除キ其他治療宜キヲ得テ

腦肺ニ染ルカ如キ危険ノ諸症退キ微熱ヲ帯ヒ良膿ヲ膿  
 ニ食欲故ニ復スル者ニ於テ早晚一回ニ収靨セズ膿液四  
 支ノ關節ニ集積シ一二日間曾熱ヲ登其他内部ノ運營  
 ニ碍障ナリ登汗下利閉塞ノ逆登氣孔ハ瘡瘡ニ由テ全ク  
 良膿ノ利尿下利ヲ登入取トメ膿様ノ者ヲ弛スナリ是レ  
 適宜ニ小便ニ渾濁ノ逆渣ヲ頭ス力如キ症ニ於テ瘡瘡  
 収靨ニ移ルヲ察セハ速ニ三四日間旃那滿那亦ノ下劑ニ  
 成排シ水浸劑ヲ兼用スニシ扶歌蘭土治療書ニ曰渾一良  
 池亦尼多洩尔水芦根蜀葵根煎亦ニ并硝石精ヲ加ニ多服  
 セシメ三四日間後和劑ヲ持久スニシ又瘡ノ状態ニ從テ  
 ニハ幾日毎日再取ルヲ良ナリト云々微利ヲ促シ稠膿瘡

弟ニ此症ハ初期五六日間治療ヲ怠ルニ由テ良膿独リ力  
 ヲ送スルヲ能ハス衝動劑ノ扶ヲ得テ漸ク造膿セシト魚  
 順正ノ如ク酷厉ノ初ニ液ヲ尽ク皮表ニ誘導メ膿膿  
 スルヲ能ハス故ニ初ニ液已ニ一二日前瘡毒ト共ニ表皮  
 ニ近ヲ誘導セラルト魚痘毒ハ其性揮發竅透ノ者ナル  
 ニ由テ尽ク表登膿膿シ初ニ液ハ多分半途ニ残留シ登表  
 入ニキ導路ヲ失ヒ止ムトヲ得ス再ヒ内部ニ戻流ノ腸胃  
 ノ汚物ニ混シ之ヲ泡膿セシムルニ由テ更ニ險惡ノ熱ヲ  
 起シ諸液腐敗ニ傾キ逆ニ生活力衰耗ス此人如キ症ハ瘡  
 膿ノ尙強壯劑衝動劑防腐ノ劑殊ニ亞芙蓉ヲ適當トス歟扶

蘭土曰痘造膿ノ期八九日ノ間遷延セシ危篤ノ患者此ノ  
ニ重芙蓉ヲ内服外用シ散ヒシト屢ミアリト云ク  
如キ惡痘ニ於テハ常期ノ外身体ノ諸部彼是人痘瘡潰瘍  
ニ愛シ久延ノ間潰膿スルトアリ是自然良能ノ致ス打膿  
法ニメ殘餘ノ痘毒ヲ排泄シ皮膚引縮シ酷惡トナルヲ防  
ク然リト虫帝ニ自然ニ人トシテ人徒ニ省過セズ收斂ニ移  
ルヲ察セス速ニ滿那首テ林度那亦ノ下劑ヲ投シ餘毒  
ノ排泄ヲ扶クニ殊ニ滿那ハ中和塩ノ如キ患者ヲ衰弱  
セハハレトナクメ下利ノ効切実ナリ此症ニ中和塩ノ下  
劑ヲ用レハ最モ危險トス滿那ヲ用ルモ發那ヲ内服セシ  
メ或キリスラールトシ或ハ亞兒尼加竜函ヲ兼用ス共ニ

保護強壯スルニシ又竜函ヲ外部ニ搽シ膿果ノ菓実ヲ食シ  
人室中ヲ清涼ニシ醋ヲ灌クホノ諸件ヲ行フ良トス昆刺  
種類湯ニ人膿ハ十ハシキ者ハ水銀劑滿那ヲタリ  
ト中和塩ホノ後下利ヲ持長シ毒ノ轉移ヲ防クニ然レ  
如キハ此ノ者衰弱甚シキ者或惡性痘ヲ○斯期ニ至テ膿  
ノ炎清涼新鮮ノ大氣ヲ要ス此ノ如キハ肌熱ヲ戒シ腐敗  
ヲ防止シ瘰癧ヲ鎮靜シ疲勞ヲ故復シ睡眠ヲ扶ク又醋水  
ヲ以テ瘰癧ヲ屢ク浣滌スレハ患者交映ヲ覺ニ身体ヲ強  
壯ニス○此期ハ痘毒ノ轉移ニ預メ注意スルニ殊ニ小兒  
ハ疼痛ノ部ヲ告ケサルニ由テ医家全躰ヲ屢ク検査スル  
ヲ要トス痘毒ハ胸部或ハ咽喉中ニ轉移シ易シ故ニ咳嗽

声嘔喘鳴煩悶等ノ症ヲ察セハ速ニ兩膊ニ癩泡膏ヲ貼シ  
肺腸ニ效子泥ヲ行ニ屢々下利ヲ投レ積久清涼酸果ノ飲  
液ヲ予ニ效糸ヲ温醋ニ浴解シ海绵ヲ浸シ之ヲ用テ口内  
ヲ屢々洗フニ此症ニハ吐劑ヲ禁ス若シ此レヲ用レハ  
肺臟已ニ痘毒ノ刺戟ニ由テ刺衝機増進ノ灼熱スル力故  
ニ大害ヲ致ス○昏睡抽掣譫言亦腦中ニ病毒轉移スルニ  
由テ察見セハ上ニ拳ル誘導療去ヲ適當ス○蘇歌蘭工治療  
書曰リ若シ収  
醫ノ斯ニ方テ腦肺亦ニ血液裏積ニ昏睡平厥至癩亦ヲ癩  
セシトスル者ハ刺路ヲ行フニ云  
痘毒外部ニ膊移スルハ大幸ナリ然レ者過スレハ再ヒ消  
散シ遂ニ内攻ノ内感ヲ侵襲ス若シ内陷セサルモ其部ヲ

侵蝕スルハ甚ク生涯ノ疾患ヲ残スニ由テ後ニ拳ル療治  
ニ從テ之ヲ救フニ○造膿不足ノ部ニ治療ヲ加ヘス此  
期ニ至テ皮膚層乾燥収縮シ腐敗熱或丹毒様ノ焮衝ヲ察シ  
若シクハ肺臟焮衝ノ声音全ク嘔ニ呼吸短息ノ勢力ナリ  
嚔下困難ナル者ハ一昼夜間吞クハ二昼夜間ニ於テ必死  
ヲ致ス小販ニ寒壞痘ヲ生シ大便自利脈膨腫疼痛シ四五  
顫震脈細數ホノ症ヲ患フル者ハ其症寛徐ニメ七八日間  
持長スルハ有リト魚死ヲ免ルハ一無ニ故ニ此ニ症ハ治  
療ヲ試ルモ全ク無益トス莫私土曰惡性神至燥腐敗様瘡  
於テハ劇キ惡寒搖擗昏睡亦  
如キ死人死ス此ノ如キ痘瘡ハ一黒色メ加テ若ヒ或ハ排シ  
如キ黄也ノ斑ヲ察ス此痘ニハ尸香鹿角塩ホヲ試ムニ

然氏効ヲ榮スル  
一ニ甚タ希ナリ

病毒傳移并諸流症

悪性危篤ノ痘ニ流弊スル症ハニツノ原由ニ由レリ一ハ  
痘瘡ヲ榮ン力為ニ俄ニ過劇ノ運動ヲ為ニ由テ身体甚ク  
シク衰弱シ血中ノ滋養分及拔ル撒謨廢衰反減損スルニ  
由テ癆瘵熱ヲ榮シ身体羸瘦筋骸維ノ衰弱乾咳粘汗衰耗  
下利莫私ト曰ク患者痘癩ヲ患下シ或ハ衰弱甚キ由テ  
私加量ニ是刺ホニ微量ノ等ヲ榮セズ此ノ如キ者ハ沙利布格偏僕首  
阿芙蓉ヲ加用スル等ヲ榮セズ此ノ如キ者ハ酒ト水  
トヲ混和シタル浴法或ハ芸香強壯ノ菜汁ニ石鹼ヲ解シ  
微温ニ入テ之ヲ浴セシメ閑豁清涼ノ空氣ヲ吸入シ乳汁幾

那等ヲ用ヒ又時トメ打膿法ヲ行ヒ緩下利ヲ与ルヲ良ト  
ス一ハ収靨ノ期ニ於テ下利ヲ急タリ若クハ悪性痘ノ膿  
ヲ開破シ漏スヲ急ル者若クハ早ク滋養厚味ノ食物ヲ喫  
スル者若クハ確攘ノ間冒寒スルホニ由テ痘毒傳移スル  
ホナリ此症ハ痘ヲ得ル者ニハ榮スルト希ナリ然レ痘瘡  
収靨ノ期ニ至テ速ニ痘毒傳移スル者ハ其危險トス何ニ  
トナレハ此ノ如キ急乎ノ轉移ハ人身ニ腐蝕荒暴スル酷  
厉毒ヲ未タ含ニ其毒好ニテ骨ノ關節筋ホニ附着ス又收  
靨ノ后八日若クハ十四日ニ至テ轉移スル者ハ少ク緩成  
者ニ人多分小潰瘍或ハ他ノ小疹或ハ眼焮衝或ハ咳嗽痛



再ニ接合シ醋膏溶解スルニ至テ朝夕眼ノ内緑ニ塗レハ  
通常一二日ニメ眼疾潰散ス之レ醋膏ト鷄印ト新和スル  
ニ由テ醋膏ノ刺戟負減少スルニ由テ○角膜翳ハ多ク治  
療ヲ怠ルニ由テ生ス上ニ云タル法方ニ從テ眼中痘瘡癢  
出セシムルト勿ラシムレハ能此症ヲ防ク然レモ若シ此  
症ヲ癢スルト有片小量ノ吐酒石ニ嵐婦ヲ混和シ内服セ  
シト逢砂溶液ヲ眼中ニ滴入ニ兼テ浴湯ヲ行キハ傳効ヲ  
奏ス○小腹若クハ兩足ノ腫脹ハ悉ク下劑ヲ行ハ速ニ消  
散ス○痘后癍痕及赤色ヲ遺ス之ヲ消除シ養潤ニセント  
欲セハ屢浴法ヲ行ヒ米水及膿脚ノ煎汁ヲ以テ奄蓋シ鯨

凶若扁担阿律諷百的里及誅竜凶ホヲ以テ製造セシメ石  
礫ヲ塗ルホハ大ニ効アリトス昆刺美曰痘瘡ヲ防カント  
欲セハ痘ヲ間キ膿液ニ患  
者身ヲ擦破スルヲ禁シ顔面ハ乳汁或ハ粘滑劑或ハ膿脚  
ホノ煎汁ニテ洗ヒ種々ノ蒸ヲ摩擦シ外氣ヲ防クニシ  
鼻孔眼瞼ヲ指陰門ホノ瘰着ヲ防クニハ綿撒米ニ油ヲ浸  
シ其部ノ兩間ニ居クニシ已ニ痊愈スル者ハ外科ノ法則  
ニ從テ之ヲ処置スニシ○取トメ知覺遲鈍ノ小兒ニ於テ  
ハ四五ニ疔瘡ノ状然ヲ遺ストアリ此症ニハ亞尔尼加番  
木蠶凡兒扒投私密斯ホヲ良トス此六畜毒所由也  
此毒ハ皮膚ニ入リテ血脈ヲ汚スルニ由テ生ズ  
其毒ハ皮膚ニ入リテ血脈ヲ汚スルニ由テ生ズ  
偽痘  
偽痘ノ世ニ顯ハレ人身ヲ侵襲スルト已ニ久ク又是ヲ接

人人身ニ其毒ノ傳染スルノ真痘ニ異ルノナリ其流行ス  
ルヤ多クハ真痘ニ前後シ已ニ真痘ヲ接セシ者ニ於テモ  
之ヲ感受シ殊ニ再ヒ患ル者アリ然レモ清涼防燠ノ劑ヲ用  
ヒキ許ノ劇熱ヲ兼發スル者ニ非レハ危險ノ症ニ至ル  
十シ○此痘初發ハ真痘ニ類似シテ動モスレハ錯雜ス  
キ力如ク見トト魚順序不整ニ人多クハ熱ヲ兼ヌ若ク  
兼ルモ輕易ニ人替苗人間短ク發熱一二日ニ人痘發見シ  
真ニ灌濃ニ移リ見点ヨリ四五日間ニ全ク收靨ス其他  
左ニ列挙スル微候ヲ参考人ノ之ヲ明弁ス  
真痘ノ微候

一 弟痘瘡ノ發見定処アリテ先顔面ニ始リ午腕胸腹膝足蹠  
ト順次ニ見点メ下部ニ終ルハ偽痘ハ体中發出セサル部十  
一 同日ニ見点ス  
二 弟痘ハ一種自家ノ臭氣アリテ癢タル蒸餅母ノ如シ偽  
ハ明状スルカサレ一種ノ臭  
アリテ真痘ノ臭氣ニ異ナリ  
三 弟痘熱取器熱吐ハ真偽共ニ發スルト魚真痘ニ於テハ  
諸劇甚ナリ  
四 弟三日人間ニ委ク見点メ其後發見スルノナリ偽痘ハ見  
點ニ再ヒ發見ス  
五 弟見点ノ痘灼熱ノ瘡痒ナク見点貫膿ノ間ハ小兒搔ク

ヲ欲セス偽痘ハ癩痒初ヨリ甚シ  
六弟痘瘡花也ナリ偽痘ハ終始ヲ論セズ痘ノ根脚ニ暗結  
七弟瘡出ノ痘大小有シカラスト魚口内午掌足破ノ痘委ク  
灌膿久偽痘ハ見点四日ニメ半ハ貫膿セズ或ハ細少ニメ  
如奇ニ或ハ含セサル者アリヲ真痘ノ  
八弟痘顆二分以以上瘡出スル者ニ於テハ弟三期ニ方必ス膿  
膿熱ノ瘡偽痘ハ膿膿熱ヲ瘡セズ  
九弟貫膿ニ罹ルヤ見点ノ順序ニ從ヒ痘瘡愈隆記シテ面部  
ノ腫脹増進スルニ及テ却テ面部腫脹甚ク貫膿ニ力  
十弟痘瘡悉ク瘡見ニ次テ左ノ状態ヲ顯ス

四真瘡ハ形鷄印ノ如ク偕同ニメ根脚深ク皮膚中ニ入り  
之極探スルニ分境正シク午ニ應ス又強固ニメ弾力アリ  
偽痘ハ嬌軟ニメ弾力ナク形稜豆ヲ半切ニメテ有クテ  
五真痘ニ小孔ヲ穿テハ些少ノ液速ニ流出シ一二時ヲ過  
シハ再ヒ以前ノ如ク其液充実ス偽痘ハ含蓄ノ液徐々ニ流  
トナリ再ヒ滿ルト無又真痘ノ如ク自ラ破開スルトナリ  
六真偽二痘大サ同シト魚真痘ハ含蓄ノ液多ク偽痘真  
痘ニ大ニ比スレハ其液少シ  
七真痘ノ痘瘡ハ阜隆スルト較著ニメ其阜隆落痂后久ク  
残留ス偽痘ハ如此阜隆ナシ

保真瘡含蓄ノ液ハ膿状ニメ稠厚板膠ナリ偽瘡之液ハ稀  
薄ニメ乳汁ノ如シ  
邊真瘡ノ瘡痂ハ厚クメ脂曰ク偽瘡瘡ハ薄メ形種々ナリ  
土真瘡ハ落痂ノ后瘡痕ニ赤斑ヲ残シ累月ヲ経テ漸ク消  
散偽瘡ノ残斑ハ直瘡ノ如ク久ク残留スルナリ  
知真瘡瘡痕ヲ残ス者ハ其美多シ偽瘡瘡痕残ス取ハ痘顆  
ニ比スレハ其美少クメ九リ十分ノ一ニ不過  
利真瘡ハ痘顆多シテ揮流スルカ如クニシテ一ツモ瘡  
痕ヲ遺ス  
真偽二瘡ノ瘡痕分別

真瘡ノ瘡痕ハ皮膚ト同色ニメ白色ナルトナク偽瘡ノ瘡  
痕ハ白色ニメ皮膚ノ色ト異ナリ○真瘡ハ橙皮ノ層ニ侶  
光沢ナク瘡底不平ナリ偽瘡ハ仰壳ノ層ニ侶テ滑沢ニメ  
光沢アリ○偽瘡ノ瘡痕中ニハ設嗜瘡ノ如キ小点或ハ小  
深アルトナリ真瘡ハ黒点ノ小点ニ三箇アリ其瘡痕多  
クレハ從テ黒点愈々多シ偽瘡ニ於ハ細小ニメ短キ毛一  
ニ毛ヲ生スルナリ偽瘡ノ因縁ハ或ハ因或ハ類曰クメ  
皮膚ト也ヲ同セス瘡痕白色ニメ深カラス反テ皮膚ヨリ  
少ク阜隆スル者アリ取トメ又幼穉ノ時偽瘡ニ罹リ老年  
ニ及テ其痕録痕瘡共ニ不平ナリ皺紋ヲ為ス者ハアリト

魚之ヲ縱横ニ牽引スレハ離放消散シ白色平滑トナル○  
真瘡ノ周縁ハ種々ニ分布シテ光沢ナク其色皮膚層ニ同ク  
痕底凹トナリ誠ニ之ヲ牽引スレハ縁底共ニ粗糙ニ大不  
平ナリ又長形ニ從テ之ヲ牽引スレハ癩痕細キ綿糸ヲ以  
テ縫透シアルカ如シ○偽瘡ノ癩痕ハ大サ種々ニメ芥子  
或ハ黎豆ノ如クニメ真瘡ノ如ク種々ノ不整ヲ為トナシ  
ト魚取トメ方形成者アリ精細ニ之ヲ験索スレハ真ノ方  
形ニ非ス偽瘡集合メ假リニ方形ヲナスモノナリ真瘡ノ  
痕形ハ凹反摺回ノ者希トメ多クハ種々ノ形ヲ為ス○偽  
瘡痕凹ハ其人ノ年齢ト其痕アリ部分ニ從テ差異アリ顔

面頰前額ニ於ハ深ク午腕背脊腹部足部ノ癩痕且十又以  
上ニメ偽瘡ニ罹ル者ハ其痕次第ニ消散シ殊ニ腹部背脊  
ニ於テ然リトス然レ其色白ハ全ク消散スルトナシ又瘡  
癩饒多ニメ残痕少クメ二十ク以上ナルモノナリ取トメ  
僅ニ一二ヲ残スノニ此痕顔面前額鼻上等ニ多ク午腕足  
脚腕部背脊ニ痕ヲ遺サス若シ遺スト有者ハ顔面ヨリ却  
テ其類多クメ齡四十或ハ五十ニ至リテ其痕底ハ平滑ニ  
ナルト魚白色退カス○真瘡ノ癩痕ハ其類多クメ算フルト  
能ハス其痕凹ノ淺深種々ニメ顔面午腕ニ多ク腕部背脊  
ニ少ク年ヲ注ルニ從テ消散ス腕部背脊ノ如キハ終ニ全



ニノ三四搏ノ間ニ一次結代ス皮膚乾燥シ尿道ノ疼痛ノ  
次前ノ如ク乳汁ノ如キ小便ノ利シ腹膨脹シ施ス陰茎摘  
引シ或ハ搦摩ス是ニ由テ其焮熱腫脹ス○脈疾ニメ浮尿  
道刺痛小便乳様ニメ冷ナル等ハ腸中ニ蛇虫アルノ確徵  
ニメ是ヨリ皮膚之瘡痒ヲ察シ瘡怪ヲ愛セシメ險地ニ至  
ルヲ疑ヒテ容レヌ故ニ左ノ散茶ヲ服サシメ醋ノキリス  
ラレテ行ヒ乳汁ヲ子ルヲ逐クシ兩脚ヲ纏絡ス時ニ至  
亞鉛華ニ丸白糖適量ハ景如常ニシテ此ハ散茶ニ至  
右和シ一包トナシ一飯茶毎ニ飲服セシム一包ニ其此  
散劑四包ヲ用ルノ后譫言止ニ翌朝至リ面赤瘡充脹ノ白

色トナリ粘液様ニメ惡臭アル大便ヲ通ルノニ行其中ニ  
蛇中一條ト影キ蛇虫ヲ雜ス患者今省覺スルニ由テ殊ニ  
小瓶ノ若間ト陰茎ノ焮痛ヲ訟フ此ノ部ニ瘡瘡ヲ生ル  
由テ焮衝愈ニ増加ス故ニ鉛糖ヲ微温湯ニ容解ノ莖湯セ  
シム舌上ト清潔トナリ浮數脈以前ノ如ク故ニ亞鉛花  
ヲ每瓶ハヲ増加セシメ持久シ用ヒ機那ノ水後ヲ兼用シ  
醋ノ灌腸ヲ再ヒ施ス此方法ヲ行ヒ瘡瘡日々ニ充脹裏ニ  
メ黄色トナリ危險ノ症諸ナク通時ヲ失ハス瘡瘡収醫シ  
一二日ノ間左ノ下劑ヲ用ヒ蛇虫粘液及死タル蛇虫ヲ下  
シテ全ク狀復ニ至ル方

癩那 酒石

後按此症蛇虫ニ由テ瘡險地ニ至ルカ故ニ直下ニセメニ  
シトク海人出ノ如キ峻効ノ驅虫劑ヲ用テ虫ヲ下スノ良  
ナルカ如シト虫氏見点后三日糞穢移ル時期ニ方テ瘡陷  
凹ト成ル故ニ直下ニ驅虫劑ヲ投レハ蛇虫愈々躁擾シ皮  
層ノ痠痒ヲ増進ス殊ニ下劑ヲ兼用セサレハ驅虫スルノ  
能ス下劑又内陷ヲ促ス故ニ亞鉛花ヲ用テ痠痒ヲ鎮メ虫  
ヲ驅リ脂ノヨリステルヲ以テ熱ヲ冷解シ瘡毒ヲ皮表ニ誘  
導シ○又瘡内陷スルニ至テ乳汁ノアラ子ルヲ行ヒ誘導  
ノ峻効アル莞菁葉ヲ用ヒサレハ尿道刺痛ノ症アルニ由

テ○大便通利ニ舌上清潔トナルニ至テ癩那ヲ用ユ然  
レ脈ニ熱狀アリテ素ト腸胃汚物アル症ナルカ故ニ水浸  
トシ脂ノヨリステルヲ行フ近世ノ熱病治法ニ比スレハ  
癩那ノ用ヒ早キカ如シト虫氏ト也各モ此如キ症ニ之  
ヲ稱拳ス是瘡癩ハ癩疹ヲ兼スル熱病ニテ造膿ノ為ニ諸  
種ヲ糞乾シテ衰弱スルノ甚キニ由テ稠密瘡ニ於テ腸胃  
汚物局処燉衛等ノ症ナキ者ニハ速ク癩那ヲ用ユルヲ良  
トス○此患者齡已ニハ歳ニメ腺腫蛇虫ノ確徵ヲ見ス然  
ハ初メシニキツルノム草味ヲ用ルヨリハ其衣ヲ配伍シ  
用ル症ノ如シ扶歇蘭土ヲ用ヒサルハ何ノ狀態ニ由ルヤ

疑フ所ニ...

第二

一女子年卅三年常ニ蛔虫ヲ下ス... 数瘡疹ヲ發シ而メ多ク水泡ヲ挾ム... 怪状サルカ如シト云フ...

幾那

答麻倫旬

民埵列里精

...

紅色ヲ呈セリ渴尚昨日ノ如クメ煩燥シ使ス胃寒メ疑ニ... 咳嗽シ流涕スル一甚ク口内鼻孔モ亦瘡ヲ發ス...

大便ヲ下ス其夜諸症安靜翌朝ニ至リテ瘡充実ノ紅暈ヲ... 潮シ内腫增長メ眼ヲ封シ復タ渴ヲ發ス由テ復タ幾那ヲ...

此瘰忽于萎平之亦肉脹消散之惡寒振慄煩悶之生之因  
之溫暖ノ帑布ヲ以テ兩手ヲ纏フ法方前ノ如シ又前法散  
劑ニ加呂女兒心ヲ加五朝又此ヲ服サシム此ニ由テ起脹  
便秘スレモ四五ノ瘰黃膿ヲ含ニ外部ノ腫脹十分ニ回復  
ス○咽喉ノ粘液稀解ニ蛻虫ヲ交ユタル大便ヲ得食機乃  
生而メ頭下ニ堅硬腫ヲ發メ疼痛大同危亦後奴謀ニ鹿角  
揮發塩ヲ加タル硬膏ヲ帖シ其上ニ溫暖ノ帑布ヲ処ス○  
十二日顔面及全身已ニ收靨ニ進ムト虫于豆ノ如ハ方今  
專ラ熟膿シ口内ノ瘰モ亦膿ヲ酸驚口瘡トナル尚且以齒  
牙ノ發生ニ由テ流涎甚メシ夕煩セシトセシ者八日ニ至

ヲ始テ愈工頷下ノ腫モ亦消散シ又腋下ニ於テ新ニ二箇  
ノ硬腫ヲ生シ且リ收靨ニ臨テ微熱ヲ起ス因テ屢ニ後下  
劑ヲ用ル一二日ニメ硬腫即チ軟化ノ遂ニ口ヲ開ク故ニ  
強壯劑ヲ与ル一二週ノ間ニメ全治ヲ得タリ  
後接近世ノ舍密家民埵列里精酸味ノ品ヲ伍用スル一ヲ  
禁ス又錄荖精ヲ用ル一症ニ適セサレハ却テ咳嗽ヲ増シ  
水様瘰ニアリテハ起脹ヲ障碍スル一何某ノ治療ノ條ニ  
出セリ今此症ニ是ヲ用テ害アル一以テ知ルニ且瘰已  
ニ一度紅腫セル者ニ頷中竜齒キリスルヲ行フテ后忽  
テ内陷セリ扶歌蘭土神至熱經驗ノ伎倆ノ以テ之ヲ治療

正始ノ神圣熱及ヒ近世ノ熱病治療ニ比較スルニ扶歇蘭  
土治療過劇ナルニ似タリ愚按ルニ這樣ノ症ハ幾那後加  
齊列民控利ノ如キヲ用テ適當トスルキ力如シ然ニ扶歇  
蘭土ハ竜齒額中人如キ太刺戟ノ劑ヲ用ルニ由リ反テ皮  
膚ノ瘡孚ヲ起シ内陷ヲ促セシ者之其九死ヲ脱免メ一生  
ヲ得ル者幸ト云ニシ

弟三

一男子齡五歲頭瘡ヲ患ルノ外恒常健康ナリ偶然トシテ  
熱ヲ發シ肌膚灼力如ク謔語シ吐逆甚ク頭瘡頓ニ乾燥ス  
發熱第一日ニメ無類惡形ノ痘斑ヲ發ス殊ニ面部ニ多シ

因テ緩吐劑ヲ与ヘ尔后毎半時ニ加呂女兒ハヲ服サシメ  
キリステルヲ行フ頭瘡内陷スルヲ以テ那腸ニ芫菁羔ヲ  
貼ス其夜謔言メ不体灼熱甚ク虫播擲ノ景况ナシ翌朝之  
ヲ診スルニ脈疾諸症前日ニ異ラス屢尿氣アリニ使少ク  
通シ痘悉ク消散ス 滿那知ヲ取り水ニ溶解シ服サシメ  
且一時毎ニ 亞鉛花ニ用テ此ニ由テ諸症稍安靜息臭  
ノ大使ニ行ヲ得胃ニ至リ稠痘復發ス病兒ノ体直々血過  
温ナル力故ニ硫黄精ヲ取りテナニ時間ニ用ヒ盡サシ  
ム尔来熱減スレバ水泻甚シクメ病兒衰弱シ痘變メ灰白  
トナル因テ再ヒ 亞鉛華ヲ投ス是ニ於テ痘一二日ニ良

膿膿シ亦先青羔ノ痕造膿スルノ甚ク愈スト余自餘ノ光  
况佳好ニ人全ク若路ニ踏ルノ得タリ  
後按此症始メ用ル処ノ吐劑及加呂女児切ナク滿那ノ下  
劑ヲ用ルニ至テ大使即通シ痘良善ヲ致スト較著ナリト  
虽近世療法ニ從ハハ己ニ自然吐ノ運動アルヲ以テ微量  
ノ吐酒石ヲ与テテ鮮劑トシ良能ノ運営ニ委任ス吐若  
クハ下其使ニ從テ分利スルヲ待テノ三且此ルニ由テ頭  
瘡再發又亦慮幾スニ扶歌蘭土寧ヲ加呂女児ヲ以テ痘  
ノ二奇菜トス今此痘ニ之ヲ用ルハ頭瘡再發ノ為力或ハ  
以テ奇菜トスルカ其理明ナラヌ抑又頭瘡ヲ毒毒トナカ

シカ將夕瘰癧瘻トスルカ如呂女児ヲ用テ至当ト云ニ  
若シ然ラズノ之ヲ概用セハ豈証妄ノ証ヲ免ルニ得  
シヤ扶歌蘭度神至熱經驗ノ如キ又攻撃ニ過ルニ似タリ  
今此ノ二菜ノ如キモ近世ノ治療ニ比スレハ良能ニ先リ  
テ奇効ヲ逆スル者ノ如シ○ワトトル曰惡性痘ハ内蔵ノ  
嫩衝ヲ殺シ易シ故ニ加呂女児効アリテ此說蓋シ切当ト  
云ニ若シ扶歌蘭度ノ奇菜ト稱スルニ雷同ノ慢リニ之  
ヲ用ヒハ必ス大害ヲ招カシ余竊ニ之ニ慨スルノアリ故  
ニ數言ヲ贅スルノミ

一女子年八歲嘗テ諸厄利私病ニ罹リ近頃又兩疔ニ劇痛  
及ヒ潰瘍ヲ發シ常ニ膿腫ヲ患フ既ニ六日以來瘡ヲ發  
ス指硬也ニメ蚊跡蚤癩ノ如ク扁平ニ人彈流ス且熾熱絞  
痛利煩悶譫言四支顫振瘰癧等ノ症ヲ發シ舌上汚苔  
アリテ赤色ナリ蓋シ以下利強壯劑ヲ任用スニキノ症ト  
ス由テ若ク林度 酒石ノ煎ヲ作り服サシム效子流ヲ  
兩脈腸ニ貼ス然レ下利尚増進メ水滲トナル翌日ニ至テ  
少モ佳候ヲ呈セス其瘡却テ乾枯セリ譫語少ク減シ頭痛  
舊ニ由テ甚脈疾ナリ前方ニ舍電華諫阿芙蓉一漏ヲ和シ  
每一時此ヲ用ヒ是ニ於テ一夜间ニ瘡充美メ黃也ヲ為シ

原曰復突起シ下利全ク止ム因テ阿芙蓉液ヲ去テ散那ヲ  
持重シ瘡定期ヲ逐テ貫膿ス遂ニ屢再亦下利ヲ用テ全効  
ヲ収ム其右少モ病毒轉移スルトナシ唯病兒固自ノ胎房  
毒アリテ脈ニ輸ヲ背及兩足ニ於テ甚彈流セル鉛色ノ瘡  
ヲ遺膿膿スルト久シ恒常患ヒ未リシ足痛此ニ由テ全ク  
消散シ未病ノ日ヨリ却而健康トナル

第五

一女子年記三才發熱メ腹痛嘔吐ス予即此酒石ヲ取テ水  
ニ溶シ服サシム粘液ト胆汁ヲ吐スルヲ夥シ發熱二日ニ  
メ稠密小瘡ヲ發シ彈流メ隙地ナシ尋テ呼吸短促甚タ口

内熱灼ヲ覺耳脈疾ニ人緊蓋シ是第一道焮衝セシトスル  
ノ景况ナルヲ認得タリ因テ消石掣酸酒石屋施茂永ニ微  
量ノ吐酒石ヲ知シ服ガシテ常用飲料ニヒリトリヨリ  
ヲ加テ吉利私參見トシ及懸布ヲ施ス五日ニ至テ諸症稍  
可ナルカ如シ第六日瘧起脹ニ熱適度ナリ一ニ日来施延  
セル下利少ク有シ然ニ較著ノ誘因ナリ人忽然トメ諸症  
爰忽シ内脹減シ瘧顆空腔トナリ煩燥悶乱大渴撲滅ス  
カテ又声嘎喘鳴咳嗽下困難咬牙ホノ如キ險症花ヒ起  
ル始ハ知覺鋭敏ニメ瘧ノ痛ニ着シカル者今ハ則全ク知  
覺ヲ失テリ因テ全硫黃竜各ニムヲ取リ裁那煎ヲ以テ

一時毎ニ送下セシ人竜出吉利私參見ヲ行ヒ莞背蒸ヲ貼  
ス然レ瘧ヲナサス翌日ニ至テ指搦劇甚呼吸嚔下愈益因  
難シ瘧顆陷及ニ甚中黒色ニ爰スルモノ多シ陸續下利メ  
惡臭ノ大使ヲ瀉ス○胸中ノ腐積甚シキニ由テ假ヒ功ヲ  
奏セサルニ強有力ノ排泄劑ヲ用スンハアル可ラス乃次  
然トメ吐酒石ヲ服サシメ吐ヲ取ル一二回尔来煩悶搗搦  
喘鳴愈々更ニ増進シ瘧瘡陷及スルノ驚駭スニキ力如ニ  
其色灰白ニメ死骨ノ如ク大黒斑ヲ交ニ其夜ニ至テ此死  
ニ至ル迄腦ノ諸患アルトナリ尚意識ヲ存セリ○既ニ乾  
泡蒸ヲ貼スルト二回ニメ十二時間ヲ経過ス凡全ク功績

十力利シニ今死後ニ至テ其部水泡ヲ祭セリ是レ死ニ由  
テ瘡去リ皮膚ノ緊張弛解スル力故ニ  
扶歌蘭度備考 此症第四ノ症ト比較スルニ凡テ惡性  
瘡ニカ、ル患者ハ神全衰弱ニ陥入スル下速力成力故ニ  
預メ此ニ注意メ早キニ趣テ我邦ヲ用ヒ以テ神全ヲ保固  
強壯スルヲ治瘡ノ要トス又方近流行スル処ノ瘡通常人  
清涼下劑適當ノ症少ク又肺藏神全等ニ瘡毒轉移スル并  
ニ當テ吐劑ヲ与フレハ危險ノ治法タリ又此道ノ瘡ニ何  
芙蓉ヲ用ルルハ其鎮瘡衝動ノ効ニ由テ奇効ヲ奏スル等  
ノ諸件ヲ發明スルニ足レリ ○後接 第四症ハ直下ニ

我邦ヲ緩下劑ニ伍用シ且ツ何芙蓉ニ由テ全治ヲ得タリ  
此症彼レニ比スレハ奇烈毒 合併スルナクメ其性輕  
易成力如シ然ニ我邦ヲ急リ列ニ消石ノ如キ清涼下劑ヲ  
用ヒ尚且ツヒツトリヲ一リノ如キ猛烈ノ礦酸ヲ以テ飲  
料ニ供スルニ由テ遂ニ救ヘ難ハサルニ至ナラシムル  
トル曰腸胃ノ嫩衝ニ祭スル者ハ硝石ヲ禁スト此說ニヨ  
ルハ硝石毒ヲ為サシテ明ニ  
第六  
一男子五方林頂嬌暴ニメ甚虛弱ナリ平素蛔虫ヲ下テ  
リ又屢吐血ス時ニ其女兒方ニ瘡ヲ病ムアリ此ト至テ曰

三居一八日ニメ微熱ヲ榮シ食氣減損シ差臨眠ヲ妨ク然  
氏吐瀉搦ヲ榮スルナリニ大黃 荅戶林皮ヲ用テ平  
便ヲ得タリ○第ニ日ニ至リ臍腹兩部ニ赤斑ヲ榮メ瘡ニ  
似タリ○第四日肌熱増進シ脈疾ニ瘡即見点入○第五日  
咽喉痛音聲剛濁トナリ熱勢増長シ頭ト四肢ト赤色腫脹  
其色恰濃赤瘡々々如シ大便秘ノ如ク小便少シク瀉  
ニメ臭氣アリ時トメ自瘡搦ヲ榮メ瘡類及其景况變態ナ  
シ滿那<sup>四</sup>ヲナシ一時半毎ニ錦花<sup>三</sup>ヲ用テ翌日ニ至リ  
熱稍減ス然氏疲憊メ眠ヲ嗜シ直五スルナリ能ス瘡々斑未  
タ退入屢々圍意ヲ生ス氏ニ便共ニ快利スルナリニ此症

蓋蠅虫ノ刺衝ナラシナリ意料ス因テ每服亞錦花<sup>三</sup>ニ加  
呂女<sup>ル</sup>ルヲ知シ以テ驅虫ノ効力ヲ逞並ニ發那冷瀉劑ヲ  
服サシム其夜ニ至リ腕熱増長メ屢々搦搦又  
因テ乳汁吾利私參見ヲ行ヒ肘陽ニ芥子泥ヲ貼ス此ス由  
テ其症退キ翌日患兒安穩ニ無數ノ蠅虫ヲ混シタル大使  
ニ行ヲ得タリ○八日猩々斑及瘡疹消散ス○第九日前ノ  
散劑ヲ用ヒ諸症佳好食氣少ク生ス然氏頗ル古昔アリ其  
夜嘔吐スルナリニ次再ヒ彼是ノ部ニ瘡疹見点ス此故ニ  
第十日吐瀉石ヲナシ服サシム之ニ由テ胆汁粘液ヲ吐ス  
ルナリ夥シク熱大ニ減ス十一日再ヒ無數ノ瘡疹ヲ榮ス而

テ前ニ発スル処ノ瘡ハ已起脹メ豊大ニメ熱凡亦増進ス  
○第十二日癩癧癩癧メ始ノ見点メ水泡トナル大瘡間ニ  
無数ノ疹ヲ生メ恰モ散布セルカ如ク今十分ニ起脹セリ  
然レ熱過度ニメ食氣微ク如ク平使ニ行ヲ得タリ（臣銘）  
花微量メ加呂女児ヲ加ヒ裁那嶺中ノ浸割ヲ以テ送下セ  
シムル一日々四回之ヲ用ル一日ニメ其後発スル処ノ  
瘡モ亦突起號ア景况佳適毎日線條ノ如キ粘液ヲ下ス  
一二行其中蠅虫ヲ交工ノ第七日ニ至テ収醫ニ向フ午晚  
ノ如ハ適當ノ劑ニ由テ十分起脹ス尋テ下割ヲ連進メ漸  
ク快復ニ趨テ唯液下ニ腺腫ヲ生レ凡旃那液ヲ用テ又消

散セリ○収醫后八日ヲ至テ撰生ヲ息タリ早ク已ニ外ニ  
出テ大氣ニ觸ルニ由テ眼中赤色ヲ生ス因テ再液下劑  
ヲ投シ又眼藥ヲ用テ速ニ消除セリ

第七

一男子年紀十四文偶然トメ惡寒發熱シ流テ頭痛惡心ヲ  
發ス○翌日ニ至リ吐酒石ヲ投メ胆汁粘液ヲ吐下ス然レ  
心反テ熱性増進ス固テ硝石ニ純精酒石微量ノ吐酒石ヲ  
加テ内服セシム○熱性益増進シ十四日ハ終日嗜眠ニ眩  
中謔語而已ニス脈象ニメ脈皮膚乾燥ス夜ニ至リテ身體  
強直ニメ厥冷スル一八分時因テ答戸林度厚酸酒石屋施

女尔ノ煎劑ヲ子ニ常飲料ニ硫黃精ヲ加用セ努力ノ清楚  
ノ氣ヲ引キ肺腸ニ芥子泥ヲ貼シ布羅痘兒ヲ温乳ニ懸メ  
而足ヲ絡纏シ緩和人キリステルヲ行フ蓋シ此症刺絡通  
当成ト血汚血ノ当否ニ至ラハ時一線ノ嫌疑ヲ惹クテ有  
故ニ如之ヲ措但嚮ニ貼スル処ノ芥子泥効ヲ羨シ殆ト昏  
瞶ニ陥ルノ危険ヲ免ルカ然レ煩悶狂燥ノ懼ルニキノ叫  
喚ヲ發シ幕外ニ出シトス終日人事ヲ省セス唯終ニ醒覺  
スルトアリ身体左側傍ヨリ咽喉ニ至ル迄劇痛アルヲ告  
訴ス○不斷鼻ヲ摩シ己ニ一二日未噴嚏セリ今日ニ至  
テ搯擗ヲ發シ流テ噴嚏スルト十二回且時アリテ鼻眼腫

脹シ又乍消散ス○頬ト午ト赤疹ヲ現ワシ脈浮疾ニメ呼  
吸困難シ大使難是僕効取當テ蛔虫ヲ患シテアリ因テ虫  
銘花ニ瓜加羅女尔一瓜ヲ糲和シ一取半毎ニ子ヲ幾那續  
中煎醋ヲ加工テ數里斯的見ヲ行ヒ乳汁製ノ毯布ヲ服上  
及ヒ兩足ニ貼ス然レ煩燥呻吟更ニ愈々増劇ス是ニ於テ  
再ヒ芥子泥ヲ換ヒ貼ス翌日ニ至テ未夕佳徵ヲ呈セス又  
其次日勝テ痘瘡見セス危驗ノ症尚苗速セリ○キリス  
ラル効ヲ羨セサルヲ以テ前法ニ滿那如ヲ加テ其他法方  
前ニ由ル一弟七日患者平夕醒覺セス喃々譫語シ然レ衣摸  
序メ再狂躁ス然レ脈少ク和ス又取アリテ洪大ニ不斷吐

嚙咬牙噴嚏シ微ク咳嗽ス其脈ヲ按スレハ怪滿セリ患者  
弁識ナシト魚其状ニ由テ之ヲ推セハ腹中痛処有テ覺工  
大便難ク少小便赤短然ナリ無数ノ疹ヲ現入シ足脚ニモ  
赤癢ニ及層乾燥セリ○少モ熱下ヲ欲セス強テ之ニ進  
アレハ即悉ク吐出ス是故ニ勉メテキリスレルト交換シ  
用フ○八日昨日ニ同シ翌朝ニ至精神昏憤甚タニ屢ク搗  
搗シ大便秘結ス是小腹ヲメ刺衝スルノ尤物トス目ヲ旋  
那葉一葉酒石半ヲ調和シ与ス是ニ於快下ヲ得ルト夥ク  
諸病隨テ安靜サリ痘也灰白ナレ凡總ニ起脹ニ進ム羌莖  
羔ヲ頰ニ貼シ前法哉那浸ヲ持長シ竜函亞鉛華各ニ人加

呂女亦心ヲノ散葉ヲ製ル一收半毎ニ腹サシム○第九日  
曉天ニ至テ諸症要穩精神醒覺メ能ク人事ヲ弁ニ安眠ス  
ル丁一二股間脈少ク疾ニメ緩ヲ帯ヒ声暖シ多ク吐嚙ス  
然レ咽中障得スル処ナシ小便渾濁ニメ視望セス渴甚ク  
皮潤澤シ痘少ク起脹メ紅潮ス前ニ貼スル処ノ羌莖羔大  
ニ器泡セリ○前ノ諸法方ヲ持長シム○十一日声暖ノ外諸症能  
ニ蓬砂ヲ合和シ屢々服サシム○十一日声暖ノ外諸症能  
耐レシ面部肉脹亦其シカラス尿中乳様ノ渣渣ヲ見ハシ  
大便饒多ニメ其中線状ノ粘液ト死蛔ヲ又工下ス今日始  
テ微ク食機ヲ生ス諸方前ニ由ル○十一日十二日ニ至リ

痘死類ノ色変シ無数ノ瘡分界シ面部已ニ収醫ニ移ル者  
アリ然ニ九疔劇痛ノ強硬ニ以テ運動ヲ妨ク因テ過乳ヲ  
以テ懸布ヲ作り其部ニ貼ス劇痛強硬共ニ消散ス此症蓋  
シ乞勿管ノ運営増劇セルニ由テ榮スル処ナリ故ニ予后  
又乎腫脹シ亦忽散消ス痘瘰起メ終ニ膿潰ス〇發那並痛  
那葉ヲ加工用ニ此ニ至テ散葉ヲ徹ス痘収醫ニ移リテ  
榮熱セス食氣旺盛ス又足脚腫脹メ白疹ヲ榮ス因テ拭淨  
薑法等ヲ行ヒ薩沙布羅私義那後劑ヲ用テ其症委ク消散  
ス扶歇蘭度備考 右ノ症ハ第一道ヲ徐淨スルニ由テ痘  
毒ヲ裂シ膿膿熱収醫熱モ亦是ニ由テ防キシモノナリ

後按 此症始ニ吐劑ヲ用ル其亘キ処ニ非ス第三ノ条ニ  
說解スル力如シ〇此痘蓋ニ嗽衝肚口メ蛔虫汚物ヲ合併  
スル者トス故ニ下劑驅虫劑ニ由テ僅カニ之ヲ救テ得  
タリ哉那瀕中竜出ナトノ効ニハ非ラサルニ且始メ硝百  
ヲ用ヒ又刺絡ヲ撮フルノ症ニメ卒然轍ヲ改メ哉那瀕中  
ニ轉スルニ至ルハ何リヤ攻補両力ヲ中庸ヲ得ス是又自  
然ニ踰越メ進取スルノ伎倆ト云ニ若ニ近今ノ法ニ從  
ハ、始ヨリ芍藥根蒲公根芦根解凝中和塩ノ微量ノ吐  
石等ヲ參用シ且傷症進退ヲ見テ下劑或ハ驅虫鎮瘧等ノ  
劑ヲ消息ニ腸胃ヲ清疎シ嗽衝ヲ消徐スルヲ得テ而后發

那ヲ用ヒ以テ十分ノ効ヲ収ムニキカ如シ

第八

一女子八女素賦嬌柔ナリ三日以來素熱シ讒言ヲ休セズ  
無業ノ痘見点シ肌熱熾盛ナルヲ悒クシ而痘起脹セズ  
熱退カス惡候此ノ如シノ尚醫療ヲモリス見点后八日ニ  
メ乃予ヲ招ク往テ之ヲ診スルニ其症左ノ如シ○面色ノ  
痘萎茶乾燥シ灰白或茶褐或ハ黒色ニメ假面ヲ覆力如ク  
四肢モ又稠密痺流久而テ足脚ノ如キハ深ク凹陷メ枯瘦  
色ノ痘ヲ混ス其餘ハ黄青色ノ大水泡ヲ成セリ終夜啼  
泣在燥スルヲ其ニ脈細疾声嘔ニ呼吸不利嚔下困難屢下

利ス粘膠惡臭ノ者ヲ漏シ四肢顛振メ挛縮ス困テ發那強  
後劑ニ蒼朮林皮ヲ秘シ服サシム海葱吐瀉石ヲ取テ毡布  
ヲ作り温メテ四肢ニ貼シ電出ノキリステ行フ○翌日  
啼返減ス自餘ノ諸症昨日ノ如シ煩渴引領甚シト亟嚔下  
困難ニメ飲ムヲ能ス声嘔益甚シク啼泣若クハ言語セシ  
ト欲スレハ輒煩悶シ少ク吐涎スルノミニメ全ク唾ス故  
ニ傍人ノ之ヲ聞クモ曉知スル能ハス四肢痘些モ膿ヲ膿サ  
ス黧赫色ニメ此レニ觸知覺ナシ也鉛花ニ二舎電華護  
阿芙蓉液ニ滴ヲ和シ一時半毎ニ服サシメ發那煎電出ノ  
キリステ行フ持長シ是膏羔ヲ四肢ニ貼ス此ニ由テ諸症

稍安定ナリ翌朝ニ至リテ声呼吸始メテ寛暢シ大便ニ行  
ヲ得タリ而水瀉ニアラズ頸及四肢ノ墜落トメ起張ニ再  
ヒ腫々ノ小疹ヲ發シ又連ニ膿潰ス患者嗜眠ニ其瘡燒  
クカ如キ疼痛ヲ覺ユ多リノ粘液ヲ下シ又僅ノ吐涎ヲ將  
出シ法方前ニ由ル漏那<sup>四</sup>ヲ兼用ス是レ初起ニ於テ下劑  
ヲ急タリ今又血液頭腦ニ滲洩スル微ヲ見タルヲ以テ故  
ナリ○十一日頸ト手ト稍収斂ニ至ル足脚ノ如トキハ今  
赤色腫脹シ又足蹠ニ大小泡ヲ發ス因テ之ヲ破漏メ黃白  
水ヲ洩シ脈狀瘡平煩悶亦大ニ鎮定ニ食氣微シク生ス然  
ルニ終夜<sup>脚</sup>脚<sup>筋</sup>菜用ヲ急ルヲ忽然トメ大ニ煩躁ス因テ又

前ノ阿芙蓉液ヲ和タル散茶ヲ取リ我那煎ヲ以テ送下セ  
シムルト三四其症即チ消散セリ此ニ由テ之ヲ見レハ此  
兒獨リ良藥ノ運當ノミニ由テ死ヲ免ル者ニアラズ亦  
大ニ医ノ補聖ヲ須ツテアルト明カナリ○十一日ニ至テ  
我那煎及ヒ下劑ヲ連進スルニ由テ諸症平復セリ唯嘶嘔  
咳嗽ノミ依然トメ退カス因テ茴香水ニ護護母母泥煎散  
ヲ添解シ我那煎新海煎吐瀉石微量ヲ稠和シ用ヒテニ  
症亦全ク除ク而メ足部ノ瘡潰瘍ニ變ニ四週間ヲ徑テ漸  
次ニ愈ユ以テ步行スルト得タリ

第九

一男子十歳嘗テ劇シキ諸厄里私病ニ罹リ二年前迄テ肩  
ニ大潰瘍ヲ發シ九リ九週ノ間此レニ若シム産ルノ后子  
今年ニ至ル迄更ニ身体健康ニメ諸力増息シ大ニ長育セ  
リ然レ一夜啼叫啼泣甚シク産率播擲譫語發シ瞪ル目ヲ  
開テ現ルノ有ルカ如シ而テ傍人ヲ弁識セス昏迷メ身辺  
ヲ摸索シ醒覺スルニ及テ之ヲ問ニ絶テ起取スル処ナシ  
從來蛔蟲ノ下リシトアラサレシ今此ニ起因スル産率症  
タルト明シ此兒今瘡瘡ニ罹リ較然タル傍症ヲ見ワサ  
ス蚕顆粒稠密ニメ旁一道ノ汚物ヲ齧除スニキノ症トス  
故ニ吐劑及ヒ下劑ヲ用ニ之ニ由テ佳的ノ景況ヲ得タリ

但起脹十分ナラサルノニ癸病旁十一日ニ至瘡過半内陷  
ニ肉脹退キ脈著シク熱状ヲ見ハシ譫語妄語ス因テ莪那  
答戸梅毒梅毒ノ飲劑ヲ作り服ガシム竜出キリステ一此  
ヲ行ヒ效子死ヲ脱腸ニ點ス○十二日譫言尚止マズ時々  
大ニ啼叫シ大使夥ク通ス須臾醒覺スル間ハ石腹及ヒ小  
腹疼痛ニ困若ス熱減却セリ○十三日ニ至リ疼痛愈加ク  
屢譫言シ大間大啼喚ヲ發ス是ニ於テ魚滿埵兒油ノ乳劑  
ニ菲沃斯魚密且キスヲ加ヒ子一ハ産率ヲ鎮靜シ二ハ  
蛔虫ヲ代討ス夜ニ方テ阿芙蓉ヲ加ヒタル莪利私瘡兒ノ  
行ヒ莪菁送ヲ甚ク其啼泣然レ復タ啼泣スル一右膊及ヒ

危脚ヲ牽縮ス其状疼痛耐之忍ニカラサルカ如ク怪乎休  
 歇スルノ間モ四肢ヲ動揺スルヲ能ス又顔面ノ諸筋等急  
 ス而人諸症休息スル間ハ喘々譫語言語蹇蹇ス若ク強テ  
 鮮加醫列根言ニトスレハ大ニ困苦ス昨日ノ劑中ニ莪那ヲ加テ持長  
 綿襖那ヲ以テ版部ヲ蓋フテ再々其勝ト定  
 丑兒。鰓ニ效子泥ヲ貼ス然レ今日及フ迄絶テ言テ能ス尚  
 喘逆ノ体止セズ繼下妨クル処ナク小腹緊滿セズ之ヲ案  
 スルニ疼痛セズ全躬ノ瘡瘡乾枯ニ脈実ニメ微緊ヲ帶テ  
 呼吸蹇滯セズ大便連綿トメ自利ニ自汗ヲ泄テ大ニ右膊  
 全ク運動セズ腕腫ニ然レ微紅ヲ呈シ膿液ノ景況ヲ見ス  
 〇温湯ニ浴サシメ更ニ又羌活湯ヲ右肩ニ貼シ莪那次里

阿芙蓉製劑亦ヲ加テタル菜液ヲ持長ニ温浴ヲ行フノ間  
 足脚ニ黄色ノ大小泡ヲ登シ須臾間患者安靜ナリ〇十六  
 日諸症昨日ノ如ク前方ノ外又加呂女不麝香湯ヲ調和シ  
 一取毎ニ服サシメ醋ノ吉利私。是。蠅虫施ニ後浴法ヲ行フ  
 尋テ膿状ノ粘滑物ヲ下利ス是蠅虫ニ腐敗セシ者ニメ他  
 ナラス又取アリテ顔筋及左足搗搗シ又須臾ノ間甚タ大  
 叫喚ヲ放テ精神昏憤ス其胃ニ至リ眼彩差弁識アルカ如  
 ニ人喘逆狂躁スルヲ反テ日中ヨリモ甚シク蠅虫ノ所在  
 十瘡等ヲ登セシムルノ因明カ成ラサルカ故ニ一取毎ニ  
 一食ヒノ亞テ仁油ヲ服サシメ温浴法キリスルヲ持長

〇參見ヲ

三合電華讓阿芙蓉液十二滴ヲ用ヒ精神少ク醒寤ニ始メ  
テ呻吟小腹痛ノ若腦ヲ討フ翌日絶テ喘息スルナク夜  
ニ入テ又叫喚ス見青羔造膿スルニ由テ羔菜ヲ換レ氏患  
者少ク知覺スルナク然レ多ク *doan* 稟質喫ニ屢  
其仁ヲ吐出ス電出臭百晷油各ニ取テ一坂毎ニ服サレ  
ム然レ諸症程萬トメ變動セス蓋ニ吐割ハ其劇動ヲ以烟  
莖ニ記固セス症穿ヲ鎮靜スル身効アルヲ以テ之ヲ誠ニ  
ヒ力為先七百加格安那必吐酒石ニ合ニ服サレム尚テ  
吐ヲ得ス又喘若ニ用レ氏遂ニ吐スルナク大使ニ  
行ヲ得タリ○喘症前ノ如ク然レ能ク言語スルヲ得テ

曰身水中ニ墮テ改弱セシト為ト○十九日諸症淹滞ニ脈  
細疾トナリ見青羔痕悉ク皆乾燥右膊ノ浮腫増進ス亞鉛  
華ニ電出ヲ加テ一坂毎ニ服サレメ電出總量半匁亞鉛  
花野ヲ用ルニ至ル尚菲沃斯亞密瀨中ノキリヌラ行  
フ廿日ニ至テ諸症安穩ナレ氏腫ルナク得ス午取一二  
語ヲ出シ午後石羔ニ赤隆班ヲ察シ之ヲ醫スニ由テ即破  
潰メ其口ヨリ茶褐色ノ汚液ヲ漏ス一丸ニ号其近クニ力  
ヲス左肩モ亦此ヲ察ス亦速ニ破潰メ汚液ヲ洩ス一夥ク  
ニ此惡液ヲ兩口ヨリ十分ニ漏出シ此ニ由テ骨膜剝脫  
ノ肩胛ノ諸骨及ヒ鎖骨暴露シ其液腹下ノ粘液囊中ニ入

り其ヨリ脊骨ノ大成ル大腔隙ニ入ル○夜ニ方テ脈差  
安静ニメ能ク睡眠ス○サ一日播擗ヲ登シ其状恰癩癩ノ  
如ニメ些ノ弁識ナク喘逆全ク止三脈漸次ニ沈弱トナリ  
乃、死ニ瀕セリ○廿二日至終ニ播擗ヲ登メ斃ル  
扶歌蘭度備考 此ノ患者ノ解剖スルニ十二脂腸空腸ハ  
頗ル嫩衝ニ又而腸交接ノ部ニ條索五箇ヲ見ル其二箇ハ  
全体ヲ存シ三箇ハ已半腐敗ニ其状蛇家下ス処ノ粘膠線  
状ノ者ニ倍タリ自餘内蔵平常ノ如クニメ少モ瘡瘡ヲ登  
セシ蹤跡ナシ上膊骨頭ハ肩胛ヨリ離隔ニ膿汁肩胛内ニ  
透流ニ肩胛ノ筋膿ニ由テ消滅セリ○此瘡ニ登見セシ諸

患症及ヒ終リニ死ニ至リシ原因ハ正ニ此蛔虫成リ疑ヒ  
ナシ此ニ由テ言語スルヲ能ハス唯播擗譫言等ヲ登シ  
瘡ノ起脹ヲ防ク其毒轉移メ乃処ヲ刺戟ニ諸腸ニ嫩衝及  
寒脱疽ヲ登ルニ此等死ヲ致サシムルノ近因トスニ○  
其数多ク之ヲ既除シ尽スヲ能ハサルト其所在十二指腸  
ナルトニ由レリ是此腸ノ神至叢刺刺ヲ受ク氏ハ其近傍  
ノ諸腸ニ破及スルヲ甚キ力故ニ身体ノ諸運営ヲ感腹メ  
妨害ヲ為シ癩ナリ又兩肩ニ登セシ潰瘍ハ早ク已ニ膿  
液聚積シタレ氏是硬膜ヲ以テ固燒セル裏腹ニテ所在際キ  
力故ニ外部ニ其状態ヲ見ハサス患者弁識ナク尚且言語

スルノ能サレヨ以之ヲ告ルノヲ得ス荒暴也ニ甚シキニ  
至テ而始テ是ヲ曉知スルノヲ得是又患者ニメ不卒ニ  
胎ラシムルノ一端ナリ

第十

一女子年記四才非常ノ稠密瘧ニカ、ル然凡惡症ヲ見ハ  
サ、ルヲ以今日ニ至迄医ヲ招カス瘧病第七日現昨ニ至  
治ヲ予ニ請フ之レヲ診スルニ顔面及ヒ手ニ稠密瘧流ニ  
ニ殊ニ面部ニ甚夕且委拮梗或茶褐也ニメ紅暈呈セス皮  
層汚穢メ乾燥ニ知覺銳ナリ脈弦呼吸促迫ニメ乾咳ヲ兼  
子舌上粗糙ニメ白苔ヲ覆ヒ大使鞭小使油樣ナリ因テ更

銘花ニ取リ漏那ヲ加エタル後ヲ以一取毎ニ送下  
セシム翌日大使一二行ヲ得其他日ノ如ニメ瘧稍起脹ス  
然凡瘧膿セス○第九日現昨ニ至テ瘧空虛ニ或ハ水泡ノ  
如ク或ハ疥癬ノ如クニメ乾燥シ脈強屢水浮ニ四支顛振  
煩悶等ヲ發シ疼痛ニ若ク少ク患者平常ノ態ニ異ニメ益  
ク茶ヲ服メ臥ノナシ前法ノ外一取毎令電華讓阿芙蓉ニ  
漏ヲ用ヒ發那毫出ノキリスラ行ヒ兩膊ニ溫暖布  
ヲ貼ス○第十一日現昨ニ至テ些ニ佳候ヲ見エサメ絶  
テ瘧膿セス其瘧巴ニ黑色ニ變ニ面部兩手肉腫増進スル  
トナシ然凡彼是ノ瘧周圍ニ稍赤色ヲ生スル者有テ尚ヲ

昨日ノ法方ヲ持長セシトヲ命スレ凡兩親以テ効無シト  
メ之ヲ用ヒス其夜ニ至從来面部ニ些ノ腫脹アル者悉消  
散シ四肢厥冷ニ呼吸困難ニメ喘鳴ニ唾下困難精神昏冒  
メ遺尿メ自ラ覺エス因テ後ニナククヒツトリヨリ止  
竜齒精舎電阿芙蓉各四滴ヲ取葦那煎ニ混和シキリスル  
ルヲ行ヒ大葦那亞尔厄加ノ煎汁ヲ頓服セシメ水銀羔  
ヲ取テ股及腕下ニ摩擦ス翌朝ニ至テ極惡臭汁ヲ棄テ昏  
冒乃醒覺シ喘鳴減ス然レ尚呼吸煩悶メ声嘔ス四肢ノ瘡  
稍腫脹ノ微ク色ヲ呈ス時トメ膝腕少睡スレ凡搗搦咬牙  
症ナシ因テ水銀軟羔ヲ摩擦シ竜齒煎ヲ取リ床中ニ搽布

ス法方昨日ノ如シ○其背ニ當テ患者夾膝食ヲ欲ス声嘔  
故ニ復シ瘡尚ヲ充實セリ○癰瘍第十ニ日堤眩ニ至テ諸  
症ヨリ耐エクシテ數顆膿ニ移リ足脚ニ三箇ノ水泡ヲ癰  
メ切乙液ヲ含シ緊障統癰汁ニ稀他ニ行ヲ得タリ○法方  
昨日ニ由ル蓋シ此瘡悉ク膿壅スルヲ能ス終ニ瘡毒膊後  
スニキ症ナルヲ知ル故ニ預之ヲ防シ為ニ癰泡羔ニ箇  
ヲ作り一ハ膊ニ貼シニハ股肢ニ貼ス癰第十三日堤眩法方  
前由ル然レ諸液腐敗セシトヲ恐ルニ由テ一ブレスノ  
ノ飲料ニエリキシルヒツトリヲナリ十滴ヲ加テ用ニ  
一ヲ命ス然ニ病家之ヲ誤認メ飲料ノ子ル毎ニ一小至碗

二十滴ヲ加五六取間凡百滴ヲ用ニ是ニ於テ其夜大ニ思  
寒メ眩暈シ大小使失禁シ瘡毒也ヲ失フ因テ發那煎ニ葡  
萄酒一七ヲ加五服サシム且ツ瀨中薄奇ノキリスラ行  
フ身体即回復シ精神モ亦赤旺ス尔后赤惡症ヲ瘳スル  
ナシ○収醫速ニ全須ニ及ヒ恰モ黒皮ヲ以テ覆カ如シ其  
痂脱落メ鱗貝ヲ糝シ身体復是ニ膿液聚積ス是故ニ新鮮  
ノ氣ヲ迎引シ發那諸酸及ヒ下劑ヲ用ヒ見点后十六日ニ  
至テ熱即解ス食氣生シ安眠ス体中潰瘍劇キ部ハ八日ノ  
間連綿膿膿ス頰泉腫脹セルニ由テ五子ヲフスモ子ヲ一  
レ及委ニ下劑ヲ用テ消散シ終健康ニ復ス

第十一

一男子生テ僅カニ周才曾テ腺閉塞メ腹硬滿セリ今又惡  
症ヲ得其症曰ニ勞ラス其瘡些モ膿氣ナシ見后七日ニ至  
リ瘡瘡乾拓シ四五取冷声嘔抽等ノ症ヲ瘳ス因テ水銀  
ノ効ヲ試シト議ス乃水銀軟羔黎豆大ヲ取テ兩股ニ摩搽  
シ發那並鉛華ヲ腹サシメ子泥ヲ貼ス翌日之ヲ診スル  
ニ瘡顆脱落トメ亮矣ニ皮膚然テ紅也滑澤ナリ知覺増進  
ス搗製減退メ無カ如シ然レ安靜ナラス○水銀羔ヲ持重  
ニ大便セサルヲ以テ發那煎ニ漏那若戸林度少シ許ヲ加五  
漸次ニ之ヲ用ルテ二回ニメ惡臭ノ大便ヲ下ステ數行諸

症立他ニ変ニ其状驚駭スルニ〇四支復厥冷ニ産季播等  
ノ眼球旋轉ニ呼吸短促ス予計ニ此ノ如キ惡症ハ喪耗下  
利ノ為ス處ナリ速ニ遏息セスハアルニカウ入因テ舍  
電筆諒阿芙蓉液ヲ与ニ服サシム草ニメ下利即止ニ全蘇  
曲陽ニ精神亦活發ス翌日ニ至テ良膿ヲ穢スノ景況ヲ見  
ハス流テ胸内ノ患若退キ精神岳穩ナリ因テ滿那荅滿林  
度ニ阿芙蓉少許ヲ加工糸レ瓦復下利ヲ為ス一オクメ良  
効ヲ發シ毎日濃使ヲ利ニ全然トメ快服ヲ得タリ  
扶散蘭度備考ニ此處蓋シ水銀軟煎ノ効ニ由テ膿膿ヲ催  
進スルヤ且此中流行スル痘ハ灌膿ノ時期ニ方テ僅少ノ

下劑ト金氏大毒ヲ為スヤ又阿片ハ水銀ノ刺戟力ヲ鎮靜  
制伏スルノ効カアルヤ此試驗ニ由テ明シ  
後按水銀羔阿芙蓉ノ痘瘡ニ奇効ヲ奏スルト右ノニ症ニ  
於ルカ如シ然レ大症ニ適セサレハ其害モ亦甚シ故ニ治  
療ノ條ヲ參考シ其當否ヲ竅知メ而メ后子之ヲ用フニキ  
ニ夫レ水銀ノ諸物長育機ヲ消滅スルノ毒類アルヤ其小  
虫ヲ殺シ又是ヲ草木ノ根ニ置テハ則チ枯ルヲ以テ見ル  
可シ又阿芙蓉小兒ニ害ヲ致スヤ治療ノ條ニ攀ルカ如シ  
呼鳴治療ハ規則アルカ如ク亦無キカ如シ何ヲ以テ之ヲ  
言フ片ハ右之ニ案究理ヲ以テ之ヲ見レハ小兒ノ為ニ大

18  
5580

喜ヲ致スノ品ニメ殊ニ阿芙蓉ノ如ハ三歳以下ノ児ハ用  
フニカテサル。説アリ是又理ナキニ非ス唯其然リ而メ  
此徒駭ニ由レハ周歲ノ児ニ用テ奇茶ト称スル如キハ是  
其中ニ含蓄セル阿芙蓉ノ効力ニ由レリ善哉前修ノ説ニ  
曰徒駭ニ非レハ則沈ム徒駭ニアラサレハ即慄ルト豈是  
レ之ヲ謂乎

岩間姓

禮典 馮之

経験十一症終

