





瘍科口訣

瘡疽



對曰疽神內
附于代炒烏

正宗瘡疽門二
如頁名是瘡ハ
誤リナラン瘡ハ
如此ナレバ瘡ハ
不然陽瘡ニ非
レハ如名者ハナ
キナリ膿瘡
托消

○毒ノ深キハ燒鑊淺キハ灸也瘡ハ一症タリト虽惡候顯レタレハ
不治也粟粒ノヤウナル者力出んヲ待テ切ル也菜ハ始ヨリ托消也
口破リタリト毒ノ劇キ症ハ伯列散ヲ用也瘡狀順ナレハ始終
托消ヲ用燒鑊ハ一日二度二度程燒ケハ腐肉取レルナリ ⊕
如此切ヘシ上へ腐ルナレハトテ○此ヨリ上へハ切ヘカラス瘡疽大
渴發熱或泄瀉淋閉スル者ハ準繩竹葉黃芪湯也惡寒
增寒スルハ十補荊艾干姜此上ハ医王生脉也不食嘔吐ハ人多
理中湯多ハ御種也補中湯附子干姜至テ要スルニ惡症ニ
ニテフチガ此紫色ニナリテ卷込テクルハ十補神内鹿茸ヲ加疽
ノ微ハ不痛粟米ハ七壯年ノ人ニハ出キヌ者也瘡ハ背ヲモキ者也

ヨウヒニ色ツカヌ者也色ツケハ紫色ニナル也

○腦疽是モヤハリ痲ナリ疽ナリ治療痲疽ニ順フヘシ

○疔ハ十敗披針ニテ出血スヘシ膏ハ中黄面部ニ出ルハ惡症ナリ
其内眉ヨリ上部ハ出ルモ稍輕シ

○瓜藤疔十敗連壳犀角或

○火焰疔痲疽ヲ云ヘハ疽也口ノシレス者之其内堅ク凝テキテ

居ルヲ乱刺シテ青蛇ヲ付ヘシ阴所ニテキル女之烟ノヤウニ紫
黒ナルナリ

○紅糸疔針ノ如ク赤筋ヲ引◎○。右葉同上破伯湿ニ紅キス

シノ引アリ疔ノ治療ニテ宜シ總テ疔ニハ真カ有ナリ

○疔ノ治療宜シク出血シ膿アラハ能クシホリ出スヘシ

○脱疽緩症急症アリ黒腐ニナリテボツトカケル也指ヲ薄也

十補加乳没
破敵

弓級養榮海
藻湯益氣養
榮加芩枯中

婦脾湯散腫
潰堅湯梅瘰
二葛根木烏
消毒丸

ニナリテ針ヲスルト水ナト出ル女ナリ此ハ緩症之急症ハ初痛
出スマ否ヤ指末黒クナルニ此ハ阳症故ニ切斷スルニ譬ハ切ナレ
ハ生肉迄カケテ切之緩症十補加鹿茸千金犀角湯只鷄左
ヲ用緩症ハ手ヲ下サルニ瘰癧瘰癧ハ淺クシテ救ウシ真ノ瘰
ハ小ナル時アリ夏枯中煎ハ散ラヌ女之真ノ瘰ニ用エ梅瘰膿
出ル真ノ瘰ハ出レ色カ白キ之馬刀瘰モ芩枯中煎ヲ用テ消散
サセル也真瘰モ治ル女之真瘰凝リ強キハ芩二陳一段凝ノ弱
キハ柵木白豆湯散腫潰堅湯海藻湯二丁香丸合方也膿后
推ラ見スハ芎歸養榮湯益氣養榮湯梅瘰ニテ骨痛ヲナ
スハ土骨皮湯之葛根本烏柵木白豆湯ハ奇方故ニ兩方ニ
用大解端的消毒ヲ用フ真瘰腐リヌケテカラ毒ノ深クア
ル女マ、甘汞丸二分モ用ル夕子ノ症アリ能ク見別ツヘシ瘰

上ニ明灸スヘシ

○鬚眉疽至テ惡症之此モ痲ノ通りニ治療スヘシ髮ヲワリテ補托スルカヨシ頭先ハ灸ノデキタ共之心得テ灸治スヘシ

龜巢丸五宝丹
ヲ用ルニ益茶
断スヘシ

○咽喉結毒喉癰湯鼻へ向テ腐リタルハ加辛夷腐ノトレ兼スル所ハ五宝丹ヲ用ル之毒ヲ推付ル者之シマリヲ能スル意アリ咽ノ上ニ毒付タルハ喉癰湯毒ノ下ニ付タルニハ咽疳ケ毒

○纏喉凡喉痺之此ハ四方腫ルナリ重キハ下マテ腫ル共之針ノ馱凡加石ヲ用膿潰前右ニ馱凡湯ヲ用ユナリ

急喉凡トハ腫ズニ結喉硬クナル共ナリ馱凡加石金鎖匙宜シク確砂少シ交テ吹クヤ商ノ疔ニ灸スルコトアリ

○單喉凡ハ片方凡ノ腫ル之両方ハ纏喉凡也馱凡加石

○單鴛凡片方ニ出未ル之乳鴛凡ハ両方ニ出未ルニツ共ニ贅肉

ナリ膿ハナキ共之切テ取之出血スル共之金鎖匙ヲ用初起肩ニ凝共馱凡加石清咽利膈

○喉痲至テ六ヶ敷共之咽会壓ノ傍ニ出未ル之準繩ニ猛疽ト云フ硬ク凝テ及肉スル者ナリ何レ不治之老人ニテキル共之

清咽利膈散凡針メ金鎖匙ヲ付ル及肉シツレハ切テセツトシラ付ルナリ

○附牙痲ハ親シラズノ所へ出未ル共ナリ及肉シテ口外へ出ル共之初起赤クコリテクルナリ其時ハ血ヲトルヘシ加味清胃散兎屎反肉ニハセツトシラ付腐ラス之初起突出スルヲ利剪ヲ以テ切断スト云々未誠及肉スレハ不治ノ症ナリ

○上齧痲ハ初起上齧腫ル之段々深ク腐リ込ニ及肉スル之不食自汗盜汗潮熱スル之清胃散犀角不治ナリ

○上齶漏ト云ハ上齶瘻ノ腐リヌケタルヲ云フナリ

○骨槽凡齒ノ根ヨリ生スル其ノ齒蒸所ヨリ来ル其ノ口ノ開カヌ
カ骨槽凡ノ微ニ膿ニナリテ腐ル之惡シキ齒抜カサレハ治効ナシ
先清阳散火ニテ胃熱ヲ解シテ后ニ齒ヲヌクナリ輕キハ指三ノ
口ヲ開ク又ハ力カラ以開クコトモアリ齒ヲ抜ト齒ニ腐骨カワク也
齒ヲ抜タ跡切口ノフチヲ取テ燒燂ヲアテルナリ先生ハ艾灸ヲス
ル燒燂ヲ當ルモ良ナリ何レ骨ニ腐リ入ルト知んば燒ナリ

○牙槽凡ハ上齶ニ出未ルヲ云ナリ外ニ腐潰スル症ハ外ニ抜ナリ尤
腐骨アレハ腐骨ヲ抜去ルナリ毒ノ強キハ外腮ノ骨追ツク其ナリ
○牙槽凡ハ觀骨追付症モアル之痼疾ナレハ桂朮烏端の消毒ノ
兼用

○齒漏宜露凡ト毒ハ一之宜露凡ノ様ニ散漫ハセヌ之齶骨ニ抜

ル其ノ譬言ハ齒齶流注ノ様ナル其ナリ清胃散后ハ膿ハセク出テ
軟肉ニナル之エケビシヤコトヲ燒耐ニテトキスボイトニテ洗フ之此方
ハ先生家ノ方ニ非ス

○小兒走馬疳初起一瘡ヲ生シ紫黑ニナリテ腐ル之上アコ腐
リ半面モ腐ル之清胃散克犀不治ナリ急症ナレハ一日ニ死ス緩
症ナレハ十日ニメ死スルナリ金鎖七白竜散兩蛙ノ黑燒余説ク
大人ニモアル之此名多クハ齒疔ナリ

○舌疽トハ医宗金鑑云初起ハ舌中へムケテ棘クナル之其ハ漸々
腫レテ潰レ一タヒハ膿少出ルナリ瘡口開ラキ遂ニ反肉ヲ生ス灸
法腐肉ノ上ニ椿ノ葉ヲ敷テ其上ヲ燒燂ニテ燒ナリ又ハ昆布ヲ
敷之蟾酥ヲ水ニテトキテ燒燂ヲ當タ跡ハ付ル之竹筴黃連湯
或準繩ノ甘露欠反肉ノ所ヲセツトシテ腐ラヌコト有ナリ口ウサ

ニテ洗ヒ苦蕒散ヲヌルニ甘汞丸ヲ用初起塊ヲ結フ時正中針
ニテ刺之凝血消散スル共間々アリ一切金粉散ヲ以薰ス多クハ
不治也準繩ノ牛黃散ヲ用テ可ク竹葉ニテ服スル也

○梅毒舌疽結毒癰疔之類多反花セスニ腐リ込ク初メ
腐リ込テ台ニ及肉スルニ治洗薰付菜上ニ同シ異ナルトナレ其
肉梅毒ノ薰茶ヲ用ルモアリ異ナルトハ舌コハラス臭気多
ク或ハ真ノ舌疽ホト脱疔モスクナキク咽疔毒或五宝丹甘
汞消毒端のヲ用テアリ舌痛間アリ切取ヘシ肉痛ナリ治
死各異血勝ヲ雞卵ニ煉リ付ル或ハ蟾酥ヲ塗ナリ出血多
シ初心ノ者ハ手ヲ下スヘカラス

○口痔无定所切去リ金鎖七

○重舌切去リ正宗黃連深心湯金鎖七

本ヨリ切ナリ

反肉ハセヌ共又清熱欠モ用ユルナリ

○ホ舌ハ舌厚クナリ痺レ強ル也尤言語ワカラス此舌下ニ青紫
絡アリ針ヲ指ヌクニ竹茹黃連湯ニ宜シ

○疼泡初起舌下へ腫ル消長シテアコノ下へ及フナリ舌下ニア
ル時ハ舌下ニテ拔舌下ヲ拔テモ又タマレ故ニ頤下ノ舌近トウス
也經ヲサスナリ千金流気欠或托消

○吻瘡爪寒ニ襲ワレテ血モ枯燥スルニ加味逍遙散荊芥地骨
皮膏ハ中黃ナリ

○滯頤通心欠阿仙茶末ヲ付ル或妙貼散ヲトカズニ敷ニ此症遺
毒アラハ甘汞丸ヲ兼用

○蘭唇多ク上口ヒルノ高ナル共ニ出血多キ故ニ切ラヌナリ青蛇ヲ
貼シ黃連ケ毒口中ニ血袋ノ様ナ者出未ルモアリ漫リニ針スヘ

カラス血出テ止ラヌ共ニ考ルニ糸ニテクハリテ取ナリ

○時毒多ク首ヘクルヲ云 蝦蟆瘡時毒ワケテ有レ氏実ハ一之時毒モ体ノ弱キヨリ起ルコトアリ 此モ紫石ヲ推ス劇キ症ハ耳面ウツキテ便秘ス彼ノ頭瘡ノ如クアタマヘクル共ハ芎藭散ヨシ初ハ紫石ニテ推ス膿ニナレハ伯州散ヲカケル之頭瘡ニ紫石ナリ時毒両方ヘクル共アリ劇キ症ハ首ヨリ起テ肩腋下迄赤クナリテ未ル惡クスルト結毒ニ疑似スルアリ矢張紫石ヲ推ス之針シタル所ハ左突鉗之矢張流注ノ治療ニテヨシ

○瘰癧痛瘰癧ハタル意痛ハ止ムルト云義也

○肉瘰癧發所不定

○血瘰癧外治スルコトキス自潰スル様ナル時ハ活命丹ヲ用先生家ニテハ化毒丸ヲ用コトアリ血瘰癧動脈アリ瘰癧トアレ氏餘リフク

スル者ハ見ヌナリ堅ク失榮ノ如ク反花スル其内ニ弊ル之血瘰癧ヨリハ緩テ者運轉アル之血瘰癧ハ多ク首筋腋上下部へ出未ル者ナリ予サワリ堅ク皮色不変メ發レ所ニヨリテ動氣アルコトモアリ血瘰癧トノ別ハ大略如是

○氣瘰癧多ク咽ニ出未ル者之然レ咽ヨリ耳下アタリ迄半面ニ及フコトアリ是ハ謹テ不可針誤テ針スレハ出血不止者之急症ハ半面へ及ヒ紫黑色アリ又小サクナリ大キクナツタリスル之氣瘰癧モ膿ニナラス者アリ初起緩症ニモ急症ニモ色不変アリ初起十全湯消痰散海藻玉壺湯急症皮色変メヨリ仙方活命丹也針ハ出未ル者之紫黑色ニナレハ痛モアリ寒熱モアリ膿ニナラス自潰セヌ者ナリ

○肉瘰癧ハ硬クメアルカ肉瘰癧之真ノ肉瘰癧ニ膜ハナシ一種皮ト離レテア

ル者アリ一種又中ノ毒ト皮トノ思ノナキ有トコカラ取りテヨキ
ヤラ知レス運轉スルモアリセサルモアリ尽クシツクリト堅キア
リ腐リテ反肉スルモ有治后水ノ出ル者ナリ軟肉痛ト云アリ癩
ノ皮ノビヲノカ軟肉痛ト云ナリ運轉セサレ地界ノ別レタルアリ其
皮ノ另レテ有ト元ノ微ハ手ノ甲ヲナデルカ如シ

○血痛ハドコニ出未テモ動氣アリ運轉スル之夫故ニ治療シヤスキ様
ナレハ初心ノ中ハ出未ヌ者之切斷スルヨリハ灸ニテ腐ラス之然レハ
運轉セヌハ手ハサセヌ之脉尺部カ浮ニナル者之血痛ノ重レテアル
ハ下ヨリモこ上テク、リテ一鉄切ツテハ縫フナリ血痛后ノ疔桃ノ
如大ニ黒赤ヲ帯テアカアサノ如キ色之ブツ、ト高クナリ毛
孔ヨリ血カ漏出ル之條ノ刺シ様三角針へ條ヲ添へテ針ト刺
違ニスル之其上へ破敵ヲハル之初起ノ疔ト后ノ赤クナリテクル

一鉄毎ニ縫フ

症トヲ能ク疔ヲ介另シ氣ヲ付ヘシ

○粉瘤頭眉尾ニ能ク発ス治療初ノ披針ヲサシテ破敵縫ヲ
刺テ腐スコアリ又一寸ノ痛ナレハ五介ロヲアケル一種膜ヲコロ
リト出シタル者アリ殊ニヨルト肉瘤ト惑フコモアリ粉瘤ハ運
轉スル者也堅キ者アリ粉瘤ニモ中ニコトクト重テアルモアリ粉
瘤后ニ膿ニナル者アリ痛后腐リテクレハ托消ナリ粉瘤ハ早ク
治スル之小兒ノ耳ノキハニ出ルハ粉瘤ナリ

○脂瘤堅キ中ニ軟ナル所アル中ノ物ウスクナリテ后ニ腐潰スルア
リ先生ハ脂瘤ハ筋瘤ノ中ニト虽筋瘤ハ筋ヨリ来ルナリ俗ニ
云疝気筋ナリ当飯建中湯此ハ手ヲ下スヘカラス又一種針ノ
腫ルモアリ其上ハ中黄ヲ貼スヘシ

○髮痛此ハ粉瘤ナリ髮ノハル所ニ出未テモヲ包ミ込ニ夫故ニ

痛ノ上髪ハ生セヌ者之治痛粉痛ニホシ

○骨痛ハ骨ノ枝ノ様ナル者カ下ヨリ出来ンナリ一種一面ニ骨カ高クナリテクン者アリ此敗液ヲ抜テ上ヨリ木帛ヲカケルナリ

○石痛此ノ石痛之因ハ石淋ノ出来ト同理之另ニ石カ外ヨリ入ルニ非ス粉痛ノ堅キ様ナル者之運轉モスル之發所不定多クハ骨ノアム所へ出ルナリ又運轉セヌ者アリ

○失榮地畧ヲ另タス石ノ様ニ堅キ者血癭ニハ疼ナシ此ハ痛アル也后ニハ紫黑色ニナリテ死スル之流榮散堅湯天水丸ヲ用ルヲアリ及花スル時ハ脉弦救ニナリテ日晡潮熱ヲ發スル之

○虫痛粉痛ノ腐リタルニ虫ノ出来タル之

○疼痛ハ即粉痛ノナリ

○肺癰ハ排膿散ノ合方桔更白散ニテ吐サシメル之消毒ヲカケ

ルヲアリ其内脱症カ出ルハ正宗ノ排膿散人多補肺湯準繩ノ雄黃散ヲ蜜煉ニノ兼服スル之

○肺痿ハ吐血スル之養肺寧肺清肺湯位用外臺千金アツリノ方之

○流注ハ痰カ在テ流注スルヲ云フ出所不定阳症阴症癰疽ノ另ト同レテ之茶ハ越婢勢ノ強キ者ハ紫田ニテ下ス伯列散ヲ用之管カ付膿ニナラヌハ托消加及鼻勢ナキ者ハ神内ヲ用順ニ行ケハ其促テヨシ托消ヲ用テタル時ニホニナルナリ十補ニ附子干姜廣東ヲ用ユル粘膿ニナル之順ニナル所ヲ軟肉ニツカヘテ出ヌヲアリ時ニ青蛇ヲ刺之其紐ノ入レ様ハ奥ヲ左突口ヲ青蛇然レ氏奥ニ軟肉アレハ奥迄青蛇ヲ付夫ハ久クハ付ラレサル之又其軟肉ノ取レル徴ハ鮮血カ出ルナリ軟肉ノ出来ル時ハ

七八分モ愈カ、リタル時分ニ血カ膿ニ成者ナレカ其血ノ廻リ悪キ故ニ水ニナル夫故ニ多附ヲ用テ補之浮萍湯ノ目的ハ凝血強ク或紫黑色ニナル夫テモ管サヘ付カ子ハ消散スルニ凝血ノ強キ程能散スルニ

○浮萍煎ノ効勝レタルト云ヘカラス流注附骨疽穿踝疽破骨濕一切消散セスト云フナシ其目的ハ腫物凝血ノ強キ程ヨク應スルニ少シニテモ膿氣アリテハ消散セズナリ腫物紫黑色ニメ是ヲ推シ見ルニ堅硬ナルハ是浮萍煎ヲ用ル場合一人破骨濕ニテ踝骨内外へ腫レ色紅紫ナリシニ浮萍煎ヲ用ヒ内ニ越婢加朮附ヲ服サシメシニ速ニ全快セリ大凡如是症ニ毎度用テ一度モ効ヲ奏セサルトナシ又人ノ蒸劑ハ是ニ患アリテ用レハ彼轉シ移ルトアリ此劑ハ不然ノ効アリ

敗血流注

○此症ハ傷産ノミ限ラズ本産ニテモ月経ニテモ一切血介ニカ、リシトヨリ来ルハ廣キナリ此症目的ハ多ク股ニ生メ色紫ナリ又能患所ヲ轉ス朝ニ左股ニ生メ夕ニ右ノ股ニ移ル是ナリ他症ト自ラ異ナリトス然シテ疼痛アリ敗液ニハ痛ナシ膏ハ中黄ヲ貼シ煎劑ハ通経道寸滯湯ナリ膿潰メモ神内托消ハ不用ハ物湯ナト宜キニ膿ニテラハ針スヘシ針メ右實戰ヲ登スルトアリ是先生家所謂血不和ヨリ来ルニ此時ハ十補加干附ヲ与フヘシ

敗液

○初起患者若痛ヲ覺ヘス麻痺スルヲ覺ユルニ皮色不変ムツクリト地一面ニ腫上リフツクシタル者又ヨク推シ見レハ底ニ疑リアルト間アリ不痛ト虽強ク推ハ痛ムナリ其ブツ

此症如人限ラズ男子モ或ハ打撲ナトニテ便秘スルアリ捨置ハ腸癰ノ如クニナル劑ハ通経道寸滯湯
自潰后十補附
炒姜一担人足
腫滿ノ紫黒
ノ斑ヲ奈メ痛
ツヨシ越婢氣
没浮萍湯ヲ

用テ愈々又
外ニ如是ノ治
効教人ヲ得タ
リ神内膏ハ仙
人

乳腫葛根加
石羔ハ中黃
外吹橋葉散
神効瓜呂托
消后呂橋皮
葛根加桔石
觀音救苦加
石

くシタル時ハ未夕水ナリ一年モシテ消スルアリ消スト小
必ス生ス生スレハ又所ヲ不変メ来ル此症ハ謹テ針スル勿レ
假令膿ニナリタリ氏針セスメ自潰ヲマツ最初神内ヲ自若ト
シテ用テ消散セシテアリ自潰后ハ雞左維随分洩ク挿ヘシ
下利自汗盜汗乾吧咳嗽逆ハ皆脫症状之可心得

乳癰

○此症ヤハリ癰背ノ如シ堅クメ毛孔ヨリチヨボクト露ノ如ク膿
出ルニサレ氏眞ノ乳癰ト云ハ至テ稀ナリ準繩ニ曰小兒乳哺
スル故其小兒ノ胃熱ニヨリテ乳孔壅塞シ内鬱閉凝結メ
癰スト是吹乳ナリ初ニハ葛根加桔石腐来レハ托消ヲ投ス
又堅キ凝ナク一概ニ凝来ルニハ前瓜呂橋皮湯此症ニテ腐リ
来ルハ后瓜呂橋湯可ク又一統毒猛烈ナル症アリ此ハ牛房

子湯宜シ是ニテ散スレハヨシ腐レハ托消ヲ与フヘシ扱外術ハ癰背
ノ如ク切リテ不可ク膿管ツケハ能ク探リ随分下ノ方膿ノサ
バゲヨキ所ヲ針スヘシ是專要ク流注杯ハ違ヒ初ニ口ヲ大キク
開クヘシ平テ維ヲ破敵ニナシ刺スヘシ灸スルテ餘リ无ナリ然
レ氏至テ強ケレハ艾灸スルトモアリ堰菜ハ楚歌散金黃散宜シ
膿管ハヨクく心ヲ用テサスヘシ若誤治スレハ乳漏トナル之乳
漏トナレハ必脫状ヲ見ハス共之何レ補劑ヲ用ユヘシ小兒ノ嘔
乳ヨリメ来ル所ノ癰ニ大ナルハ死者是吹乳ナリ橋葉散ヲ
服サシメ紫雲ヲ貼スルナリ

乳岩

○初起乳岩ノ徵ハ其岩ノ出来タル方左ノ方ナレハ左ノ脉必澁共
不然ハ弦ナリ澁ル方ハ多ハ腎症ヲ癰シ弦ナルハ勢アリテ自潰

調榮湯后ニ
膿トナレハ十
全大補

セントスル又肩背凝ル者之是又岩ノア方之服茶ハ家方ノ
仙方散聚湯加夏枯中蒲公英ニ消岩散一日ニ四目宛夏右
中甘中ノ煎汁ニテ送下叔術ヲ施テ右ハ金瘡ノ治例ニ随フヘ
愈テ右ヨクク養生サスヘシ入湯ノ節ハヨクク瘡根ヲ摩ス
ヘシ又腋下ニ生スルノアリ腋下ハ乳房ト違ヒ尽ク取ツクサレ
ス六ヶ敷ナリ一人自潰メ大サ大腕ノ如クアリシヲ切り抜核ヲ
取リテ跡ヲ縫シニ皮足ラスメヨラサリシ程ニアリシモ全愈セリ

乳癰

乳上ニ出未ルニホス乳ノ中ニ出未テ乳カ延ナリ
至テ軟ナリユニ乳エイト名ツクルナリ

○乳岩ノ如ニメ軟ナリ一人癰ナリシヲ八寸許リ切開キ手ヲ入レテ
探リ出セシニ故ヘナク皮ムケテ出タリ其跡ヲ縫二十有三日ニメ
愈テ帰国セリト治法乳岩ニホシ

乳核

○乳中ニ核ヲ生スルニ乳岩トノ辨ハ脉モ淡ラス肩モ凝ラス格
別大ニナラヌナリ又岩ハ時々痛ムアリ又推セハ腋下カ乳房
カ何ヘカ引張り痛シ又底ニ附タルアリテ按シ見ルニ底ヲ離
レサルカ如シ核ハ時々ノ痛ナク腋下肩背ヘ引張痛ムナ
ク底ニ附クナシ服茶ハ清肝解毒湯ニ神功瓜呂散一日ニ三
目ノアマリ自潰セヌ者之若シ自潰スレハ切ヌキ取テ縫ハ宜
キニ自潰后モ岩ハ臭気ツヨク出血スルニ核ハ臭気少キナリ出
血モセサル人又余ニ障リハ死者之夫ナリニテ服茶セシメテ宜
シ

乳癰

○形状瘰癧ニホシ餘リ自潰セス多クハ潰散セルニ清肝ケ
爵加石羔笈枯中ヲ与フベシ

橘葉散膏ハ
紫雲

乳癰

乳ノフチニツクトシタルカカ出ホルナリ
痒キ共ニカケハ水ノ出ル者ナリ

○是ハ小児ノ乳癰トハ違フナリ橘葉散ヲ服シ紫雲ヲ貼ス

附骨疽

○流注ヨリニ統堅キ共ニ流注ハ色ノ変スルナリ有附骨疽ハ色ノ
付クコナシ又骨膜ヨリ生スル者故至テ深キ共ニ流注ハ外襲ヨ
リ来リブワクシタル共ニ扱膝頭杯ニ生スレハ其所ヨリ下ノ方
必肉脱スル共ニ生メヨリ膿潰スルニ至ル迄大約一月半カ二月
計リナリ扱針スルトキハ先赤小豆色ノ血出而後膿出ツ是骨
膜ヨリ生スル故ニ流注ハ先ツ膿出而後出血スナリ是外襲ノ
故ナリ何レ共疾ハ骨ヨリ生スル故ソレタケ表肉ハ死セシモ同
前ニ生スル場所所定ル所ナシ煎劑ハ補内宜シ針シテモ暫ラク
前方ヲ用后大防風ヲ与フ桂木附ヲ与フル場合ハ患处凸凹結

一人薄紫色ニ
アリコト見タリ
是ヲコロンメステ
ロラアケ骨接ニ
テ取ラントセシニ
思フ様ニトシテ故
ニカキトリ大防
風桂木鳥浮萍
湯烏頭陽甘
汞丸消毒丸

毒状ノ如クナリニ用フ或ハ烏骨鷄殼ヲ焼テ白湯送下

多骨疽

○是附骨疽ト同症ニ但シ腐骨出ルヲ以テ多骨疽トス扱此ノ腐
骨ヲ探ルニハ探リノ当リ合ニテ知ルニ腐骨ハカチリト云様ナ
音スルナリ生骨ニテハ膜アル故音ナキニ其合尚口傳アリ外術
ハ乳岩杯ノ如ク切リテハ患シ、ロヨリコロンメスヲ入レ中ヨリメ引切
ニスルナリ表ハ切ラヌ様ニシテ中ヲ廣ク切ルナリ然メ骨抜ヲ以テ腐
骨ヲ抜キ取ルニ兎角上愈セヌ様專一ニ又肉ノ上リ兼ルニハ鷄
肉ヲ味嚼漬テ食セシムベシ烏骨鷄卵ヲ食セシムルナリ

鶴膝風

○痛風癰節風霍膝風ハ異境同病ニ其輕重ニ因テ各異ナリナリ
痛風ハ一身走痛シテ定ル所ナキニ越ホ附ヲ与フ牽丑散ニテ二三

歷節風手金府
子加爵金牽丑

散桂芍知加炒
烏朮木烏雲母
煎茶丸烏頭
膝遊凡霍膝凡
ノ初起ナリ千金
所已ゆナリ犀角
ハ統痛ノ強キ
所ニ

日下スヘシ瘧節凡ハ其痛ニ節ニ限ル之骨ニ付テ痛ム故早ク患
所ヲ轉セス畢竟痛凡ハ瘧節凡ノ初起ナリ瘧節凡ニテモ霍
膝凡ニテモ敗液タマルコアリ瘧節凡ニ移ル時ハコンモリト腫氣ア
ル之桂芍某知母湯ニ宜シ敗液トコウリ深地ニ至テハ千金犀角
湯一統痛強キニ防已湯踝骨ノ痛ニ強キニ至テハ桂朮附ニ角石
宜シ痛凡ヨリ霍膝凡ニ移リ膝頭ニ痛ツキタルニハ烏頭湯ニ消
毒一分痼疾ニナリテハ烏頭湯ハ効ナシ
一人以症ニテアリシ桂支芍某知母湯ノ附子ヲ烏頭ニ代用セシニ
夥シク疹ヲ發セシ故ニ浮萍加大黃ヲ投ルニ忽チ痛消シ液散
ス后又桂支芍某知母湯ヲ与テ愈タリ又一人膝凡ニテ犀角
ヲ用シニ色付シ故紫田ニ分カケシカハ其色又又ケタリ

腸癰

○大腸ニ付ク小腸ニハ付ズ大腸ニ患血溜メナル初起小塊出未テ塊
ノ根堅マラス散漫シ腹ニ微滿アリ小便頻數ヲナセハ少シ痛ム兔
角疝毒ト見違フコアリ出未セシ方足ツルコアリ腸メクルニ付
サレコムコアリ外ニ拘変ナシ何レ大便秘ス初起脈緊々ナル内
ハ膿ナシ洪救ニナレハ膿アリ膿アレハ初メヨリ大牡加薏苡杖此ヲ
用ユル内ニ消散セサレハ便膿血トナル伯列散ヲ兼膿下レハ正宗ノ
牡丹皮散ヲ兼^用又初起凝血ナレハ必消散スル之血下リ消散セ
サルハ病ノ見誤ナリ下レハ愈ルナリ腐強キハ外ヘモ潰ルニ又内ヘ
抜ズ外ヘ潰ル是ハ難症ナリ十補加附子脱スレハ多ク死ス任中
故メイチヤラ忌ム口ヘ左突先鋒又腸外ノ腸痲アリ此症ハ大牡ニ
テ下ラズ外ヘ漫腫強シ遂ニ外ヘムケ管ツク之此症多ハ臍ヘ不潰
必臍ノ両方カ又下ナリ附子粳米ノ目的アタリ之管ツケハ刺ス

一レ疰ハ淡クサスシ又此疰ハ運轉少シ腸内ノ腸疰ハ運轉アリ大
底塊ヌケテモ思フ様ニ愈ス共ニヤハリ疰ハアサクサシ能ラシ出ス
牝消ニ左突先鋒準繩ニ腸外毛膜ニ生スト云ヘリ故ニ此腸外ノ説
之ニ本ツク且腸内ノ疰ハ外へ潰ルキハ膈へ潰ユ腸外ノ疰ハ膈傍
へ潰ユ且腸疰ニ生スル時ハ外へ出ル理ナシ此疰産后ニ多シ或ハ
産后敗血流注ノ変疰ニ又疰ノ疰ト另ナルハ疰ハ塊動所ヲ轉
ス腸疰ハ移ラズ只サシ上下スルヲアリ

臟毒

○初起見介難キ者ノ肛門ノ内張りキリノ痛裡急后重ノキニ
アリ十日モ七日モ大便難夫ヨリ水交リノ血下ルノ内ニテ腐ル故ニ
遂ニ膿ニナルナリ大便不出ノ時痢疾ニ疑似スル者ノ脉緊臭氣
アルト痛ト發熱惡寒徃来ヲ目的トス初起大牡膿出レハ大牡

正宗黃連ケ
毒

ハ用ラレズ黃連除湿湯ヲ与フヘシ急疰ハ四十日許ニ脱ス老人ハ三
十日位ニ死スル女アリ壯年ナル女ハ二月モ三月モ持コタヘルナリ
腐ラサル爺大牡ニテ消散スルハ疰ニ指ヲ入テ探リ見レハ蝕ノ何
レモヲルハ尤不治ナリ洗菜スヘシ菜方口值又小肢微満シ小便
淋瀝セハ男女ニ限ラズ大牡加薏苡是ハ濕ノ為ニ直腸へ流注ス
ルキニナリ膿至テ臭ク脱スレハ旁状ニナリテ死ス以時医赤石
脂ヲ用ル諸腫物膿ニナルハ脉ハ洪教ナル女也

痔漏

○初起ニツアリ疣疰アリ漏ニナルアリ疣疰ヲ切レハ下ニ孔アリイ
ロウテ見レハ根ヨリ肛門ノ中へ指程ノ管アリ是不潰前ノ牝之
是実疰ノ時ニ流注ノ如ク漫腫スルヲ有リ項キ丸ノ痛堪ヘ
忍フヘカラス遂ニ管有テ未ルニ管有ハ針スヘシ其臭氣言難シ

人多養榮
兼梅毒者
良附端的丸

此症多ク虚人ニ在リ扱テ堅腫ニテモ痔漏ト見タラハ是非ニ
消散ハセヌ者之此時托消膿出テヨリハ托消アシ、人榮ニ宜
シ此症探リ通セハ肛門へ通ス何レ直ニ療治セヌカヨシ早マツ
テ糸カケヌカヨシ兔角紐ヲ刺シ痲ヲ実ニ補劑ヲ用ヒ込テヨ
治療スヘシ実ノヨリ本管ヲヨク探リ拔毒ヲ付刺置テ二日
跡ハ破歟紐ヲ三四日位刺置ハ孔大キクナリ本管腐爛ス然メ
后探ラ通シ糸ヲカケ療治スルニ枝管ヲ療スルハ本管ヲ療メ
ヨリ枝管ヲ療スルニ枝管ニハ拔ナシ管ナキノ故ニ本管へ拔ラ
抑ハ管ヲ腐ラサンカ為ニ扱直腸へ落ス故拔ラ指ス様ニ思フ
者アリ穴勝サルニテモナシ又管ノニツアルモアリ何レ管アレハ本
管ニ此因ハ湿氣ニ浸サレニ重皮ノ間へ湿氣ヲウケテ生スルニ
探リ様口使又一種如人阴門へ流注スルアリ此症梅氣ヲ兼

レ者ニ多シ是ハ夫ナリニテ置痔ヲ治スベシ然レハ阴門ハ治ス
ルニ阴門へムケ種レ来ルアリ腫アレハ外ヨリ針セス内ヨリ針ス
ルニ紐ハ浅ク穴塞カヌ為ニ如スレハ腫ハ消スルニ又時々腫ル
アリ腫ル度毎ニ針メ抜ヘシ此症ハ端的ヲ用フ又往來寒熱盜汗
扱アリテ脱状スル人ハ痲ノフチ巻込底ニ軟肉出未テ内ヨリ上
テス上皮紫色ニナリ此ニ鶏肉味噌汁杯用ユ又キラヌサキ実
スレハフタシタ様ニナリ実セサレハ治療ナラス死ニ至ルナリ

腸痔

○俗ニ云脱肛痔之形チ腸ニ似タル故ニ腸痔ト名ク時々脱血スル
トアリ此ニハ四物ニ地榆面青ナレ氏此症ハ旁ニ落ル氣遺ナシ治
療施スヘシ又痔毒ト云物アリ至テ堅シ腫ル、中ニアリ此痔毒
ノ為ニ腫ルルニ此痔毒ヲ取ラ子ハナラヌ又又出血シ運倒シテ面

加味ケ毒
調和煎

青クナルアリ出血奥ヨリスル之紙ニテセンヲコシテイ白雲ニ決勝
ヲ付押込脱肛木帛ヲ施スヘシ又灌水シテ止ルアリ又怒ラシテ
止ルアリ又師家ノ秘薬ニカナノヲルヲ握ラシメ或ハ腑ニツク扱察
ル一時ニナスヘカラス小便閉スル共ナリ閉スレハカテイトルニテ
通シサスヘシ大抵三度位ニ捺ルヘシ実シタル者ハ加味ケ毒
湯腫ヒカヌ共ハ調和煎ヲ用ント思フナラハ條ヲ刺スヘシ大キク
ノ急ニ腐ラスニ蜜陀條ヲ用

疣痔

○糸ヲカケ切去ルベシコトニヨレハ内ニ漏孔有ル共ニ能ク意ヲ用ユ
ヘシ

虫痔

○肛門中ニ湿熱アル故ニ虫生スルナリ多ク小兒ニ有リ予潜ニ思

○服ニ本
作

ヘラク是全ク湿熱ニアラス肢氣ノ循リ悪クシテ肢中ノ虫出
ナラント金匱ノ升广鼈甲湯ヲ与ヘ又黄芩スヘシ

脉痔

○血痔牡痔酒痔皆同シテ肛門中破裂シテ出血スル加味解
毒ニ白雲蝸牛油痔油ニ

癥痔

○鷄冠痔反花痔皆梅痔ニ大解ニ輕キハ中黄重キハ青蛇ニ
蓮花痔ハ痔漏ノ誤ナリ竜門ヲカケテ下シテヨシ頑肉ハ切
取ヘシ

眼痔

○即眼胞菌毒ニ初出血シテ消散スルコト有リ膿潰スレハ内ヨ
リ針スルナリ外ヨリスヘカラス細キ針ヲ入ルナリ粉痛ト見

誤ルアリ

透腸疔

○痘疹后ニヨク発ス又瘡后ニ発スルハ肛門四辺へ発シ痛シ肢
暴満シテ痛ヲナス痔漏ニ見誤ルアリ一ニ透腸ト云疔治
ニ順フヘシ命ニカルナシ

耳痔

鼻痔辛夷清
凉欠消塊丸

○耳痔ハ目ニ見ユル程ナラハ切り取テヨシ糸ヲカケテ紮リ落ス
ヘシ

妬精瘡

○初起ツツクシタル者之時々出テ時々引込者之竜且泻肝湯膏
ハ中黄

膿便毒

新及加及鼻
大解毒

○初起凝アツテ早ク腫未ル十日或十四五日ニメ腐ル者一文字ニ
切ヘシ

腐肉便毒

○初起堅ク根脚深ク内充満セシ時ハ上皮ヲハくスルニ色茶黒
針スレハ凝血ニテ膿ナシ上皮ヲ缺ニテ切り破歛ニ三日貼シ條ヲ
サス愈サレハハ沸ヲ用テ腐肉ヲ取ル三角針ヲサシ其口へ蜜陀
條ヲ三本程サシ三四日置ハ腐ルニ腐リシトテ強テ取ヘカラス
自然ニ取ルナリ后破歛

囊癰

○此疔疔ニ給ル、疔アリ考ヘシ初起囊ニ腫アリテ痛ナリ湿熱凝
滯ノ阴囊ニ流注ス是ハ内托ニ伯列散ヲカケヘシ膿アレハ針ノ左
突先鋒扱毒多ク畢丸ニ付者之又小版ヘサシコム疔ニ給ルアリ

囊腫レアリテ色付タルハ退疔湯ヲ用以此疔腐リアレハ腐茶ヲ
刺ス必ス畢九ヘアタラヌ様ニスヘシ反肉スル者之以此疔ニテモ小脛ヘ
サシコムアリ疔疔ノ如ク餘疔ナキ故知レルナリ清肝滲濕湯ニ
亘シ格另六ヶ敷者ニ非ス免角畢九ニ氣ヲ付ヘシ

懸癧

○会阴ニ生ス其形癩ノ如シ初起甚強シ此疔ノイチマヲ指テヨ
シ初ノ凝ノ強キ間ヲ大牡ニテ消散スルアリ淋漏ノ初起ト見
誤ルコトアリ膿后ハ托消ヲ与フ

淋漏

○淋漏ハ滯テ漏トナル之癧スル所懸癧ト同シ因テ問テ療治
スヘシ初起凝血ヲ大牡加葦苳布杖実疔ノ内ハ潰テモ大
牡ヨシ切テ愈スカ治之候中々急ニ愈ルモノニ非ス切縫ニ小塊ヲ

大牡加葦苳
猪令加味
滋阴散小解
毒

結ヒアリ一概スヘカウス痔漏ト同シク蛤粉ヲ遣フ收レテヨリ
十補

石淋

○阴茎ニモ有リ会阴ニモアリ何レモ切斷メ石ヲ出シ尿管道一鶴ノ
尿管ヲサシ愈テヨリ抜之切斷ノ法ハ下ノ方ヲ切リ二針三針子リ
クリ糸ニテ縫之其跡ヲシカト巻キ置ナリ

腎癧

○初起阳状ノ癧ハ癧背トカロウス粟粒ノ如シ術処刺癧背同
シ其内腎癧ハ腐深カウス癧背ノ治術ヲ輕クスルナリ腎癧
ハ銳疔ナリ正宗ノ下馬癧坐馬癧ト左右ニ因テ名アレヒ畢竟同
物ニ一種又腎疔トアリ一概ニ癧ト限ルトナシ疔モアルナリ疔ハ
疔ノ治ニ順ベシ

眼疽

○眼疽ハ床スレナリ皆共血氣壯ナル者ニナシ長病后轉側スルニ能ワス骨立血氣廻ラズ故ニ生スルニ后ニハ黑腐ニナル毒ハナケレ氏コトノ外腐ルナリ此症ヲ患ル者ニ全快スル者ナシ初起ハ中黄ヲ貼シ置ハ血氣メクリテ愈ルコトニアリ黑腐ニナリテハ愈ルコトナシ

楊梅瘡

○楊梅瘡綿花瘡砂仁瘡皆同シ初ヨリ下疳ヲヤシ患テ直ニハツト瘡タルハ大解ニ加土骨皮竜門ニテ下シテ宜シ又使毒ヒイテ骨痛ヲ瘡シ夫ヨリ楊梅瘡ヲ瘡スルハ細カキ共ニ是砂仁瘡ニ是瘡ヲ瘡セントノ不瘡故ニ骨痛ヲナスニ土骨皮加遺良ヲ用ユ是ニテモ不愈ハ十神湯ニ榭木遺良兼用ニ蛇散日ニ三度或ニ夜酒ニテ

瘡是ニテ瘡シクハ十神湯ヲ止ノ骨痛ノ治フナムニ毒アリハ土骨加遺良腰以下ナレハ赤竜湯又肩背回リ患シキニハ葛根加木附ニ此症ニ消毒化毒ノ症ナシ端的ハ始終用ヘシ扱大ニツホクト瘡シタルハ師家ニテ薰茶ヲ用ユ氏餘リヨカラヌ様ニ思ハルニ三蛇散之方 烏蛇 白蛇 反鼻 右三味ホ分酒ニテ送下此茶ヨク瘡スルニ

結毒

○梅毒痼疾ニヨリ瘡ス所在不定見症不定腫アリ不腫アリ種々之瘡疾ノ如キ有リ多ク口眼喎斜手足不仁骨腫スルアリ是レ骨ニ附ク故ニ此症ノ徵ナリ至テ痛強キ共ニ桂木附ニ消毒一統痛強ク毒深キ共ハ桂木附ニ化毒三分又毒膝頭ニツキ霍膝状ニナルアリ化毒ヲ可与若シ不応ハ天水丸一日ニ四分五分クニ天水丸ハ長服出

未サレナリ 瞑眩スル故ニ膝頭ニヨリシ疔是ニテ急ニ治スル妙ニ
俟瞑眩至テ甚シ耳ノ聾ニナルモ皆結毒ニ是ニ桂苓朮附
ニ消毒黄鐘可ニ上部ニ未ルハ必心下悸スルヲアリ故ニ苓ヲ用
ルナリ輕疔ハ治スル凡重疔ハムカシキニ多分薑朮ヲ用ユルニ或ハ
洗菜石驗ヲトキスボイトニテ洗ニ此疔ニ頭痛強キアリ頭痛
強キヨリ耳聾ニ至ルアリ大三五七散宜シ是又長ク用ヒ難シ
又一種腫瘡ノ如ク是ヲカキ破リテ生スルアリ又漫腫シテ流注ノ
如ク至テ堅ク所在不定不腐ニ桂朮附消毒針シ膿出テ
愈ルモアリ不愈モアリ不愈メ漏ニナリ切斷メ愈スモアリ扱結
毒モ阴囊流注メアチコチクリク畢丸出ルアリ活方ハ切テ
破敵或ハ腐リ取兼ルハ扱毒又一種虚状ニナリ骨痛スル者ア
リ是ニ六玄直散杉葉鷄肉丸ヲ与フ是脱疔ナリ劇劑ハ用ヒ

テレス骨痛愈后ハ奇良附ヲ用

結毒痔漏 此門煩重也

○梅ヲ兼テ未リシ痔漏アリ愈カケテモ愈兼ル者是ニ奇建方仙
遺量ニ必劇劑不可用其上テ五宝丹ヲ可用早キハ惡シ咽喉
結毒ハ腐肉取レタラハ用テヨシ必早キハ誤ルニ鼻梁骨ハ付ク
結毒ハ辛夷清涼欠ニ消毒化毒又結毒脈ニ付テアリ羸瘦シ
テ死スルアリ或ハ潰ルアリ此疔ニ桂朮附ニ化毒ヲ用ユ至テ稀ナル
疔ナリ脈ニ付タルハ外不痛凝リタル所斗リ痛ムニ時々サククト
痛ム何レ難疔ニ一種失榮状ニ瘡スルアリ此亦難治ニ失榮ノ緩
疔ノ如クナリ針セスメ自潰ヲマワ多クハ不治ニ其外救多アリ
ト虽筆ニ尽シ難シ

婦人陰瘡

去骨加遺良大
解毒龜且浮端
的丸

○男子下疳ニ同シ併シ下疳裡ノ毒ニハナキ者之腐リカケルト云フ
一ハ餘リナキ者之大解中黃后衝治方男子ニ同シ

陰痔

○初起赤ク后紫色ニナリ痛強ク交合出来サル之假令小サクテ
モ痛ムニ大ナルハ糸ニテ紮リ取テヨシ然シ出血多シ可心得又
一種臭氣強キアリ蛇床子湯ニテ洗フヘシ入湯杯ノ追コメハ口
中必臭シ或ハ滯下毒ニテ臭キアリ

傷寒發頤 即時毒也

○伯寒后亦虚后ニ發スル者アリ初起柴胡加石膿ニナレハ内托
此疔痛ニ強キアリ又頭瘟モ同物ナリ然レ氏頭大ニブクト腫
ル也

痢后凡

桂支芍某知
母湯大玄

○痢疾后ニ浮腫シテ手足杯ニ生ス膿ヲナセハ内托ヨシ初起ハ
準繩ノ伏令湯多ク是ニテ治ス

痼瘖

○手ノ握リヅメ足ノ踏ツメニ出来ル者之色ツカスニ痛アリ頭ハ高
クナラヌ者之越婢烏頭湯膿潰シタルハ托消時毒ノ瘻之

瘰癧

○正宗ニ定所分タズト云ヘリ多クハ十指ニ生ル者之始ニハ急症ハ
肉中ニ赤ク色付テフウワリトフクレまり痛アリ小ナル者ハ小豆
或粟粒位ニ一小ナルハ梅子位ナリ多クハ始赤クテ后黒クナル
者之其内ニ筋骨潰爛スル者之劇症ハ湯シ且詛語アリ初
起ニ見付タラハ切テ腐肉ヲ取ヘシ腐肉出子ハ切口ニ痂ノ如ク
灸スヘシ腐トルレハ灸スヘカラス某ハ五物大黃湯腐肉取レテカ

ノ痛ノ強ヨキ者アリ此ハ凝血強キ故ノ正宗乳香止痛散郭
氏定痛托裡散

甲疽

俗ニ云ツマバラミ又ツマ、ロリトモ云多ク爪ノ間カラ反肉スル其ノ
爪ヲトリテ青蛇ヲ貼之疔瘡門櫻茹湯五物大黃湯準繩ニ
ハ甘甲疽ノ一ニメアリ甲疽ナシ代指ト同シ之指頭ニ五本ナカ
ラ瘡スル其アリ敦疽ト云治法甲疽ト同シ

僵螂蛙

○モトブトノ銜杯ノサレ様思シキ時ハ漏ノ如クニナル其ナリ治法初起
十敗ヲ用ユヘシ又手ノ節々ニ瘡スルアリ病齒氏又疔節トモシ
病蛇疔トモス僵螂蛙ハ指ノ横ハラニ出来ル之又指ノ面ヘデキテ
節ヲ隔テ出来ルヲ疔ト云

○天蛇毒準繩ニ天蛇頭ト云指頭ニ出来ル者ナリ初起痛甚
シキハ針スヘシ治ハ五物大黃潰スレハ托消之

○合谷毒正宗ニ疔ノ變トアリ矢張疔ノ準繩ニ虎口疔トアリ紅
糸ヲ引其ノ初起十敗糸ヲ引様ニナレハ疔瘡門ノ黃連ケ毒
湯ナリ

○日蝕瘡指ノ頭腫テ水泡スル者之中ニ血交リノ水出ル之毛綿
糸ニ墨ヲ付テ引通スヘシ肉ヘ入ヌ様ニサスヘシ痛忽チ止ム之
此ハ墨ヲ水泡中ニ残ス為之此ハ大腐リノセヌ為之中黃ニ五
物大黃湯之

小腹癭

○正宗ニハ暈アリテ疽ノ様ニ云テアレ氏多ハ阻状ナル其ノ粟粒ヲ
瘡メ后ニナル之此ハ腸ニ近キ疔ニ上皮膚淺ク切ルヘシ神内十補

代指病五物
大黃

く灸ハ火急ニスヘカラス臍一寸上ニ灸スル者アリ中脘疽衝疽ト云正宗ニ臍下ニ灸スルヲ腋痲トアリ矢強小腋痲ニ

鶴口疽

○尾底骨ノ上ニ灸スル其ノ初起ハ痛テモ出来タル様ニアレハ陰状ナル其ノ痛モウキ者ニ然レハ深ク腐ルモノノ見カケハ小サクモ痲疽ノ治方ニスヘシ多ク肉ノ薄キ所ニテキル其ノ灸スヘシ若年ノ者ハ生ク老人ハ死ス正宗ニ漏ニナルト云ヘハ此ハ痔漏ノ誤ニ治方托消神内千金内托或十補欠

竜泉疽虎鬚毒竜泉疽ハ人中ニ出来虎鬚毒ハヲトガヒニ灸ス正宗ニ疽トアル矢張疔ノ治方前ノ如シ

石榴疽

○ヒレ、リ一寸ニ灸スルヲ云肘后灸トハ另ニ肘后灸ハ堅ク凝テ

指先キ迄腫来ルニ其ハ至テ陰状ナル其ノ此ハ疽ナリ石榴疽ハ初赤后黄色ニナルニ次者ニ大ニナリ来ル其ノ正宗ニ灸スヘシトアレハ灸ノ疔ナキ其ノ故ニ針ノ中黄ヲ付ヘシ

穿踝疽

○足ノソトベラヨリ灸スル者ノ骨膜ヨリ灸スル者故骨ヲツキトウス者ニヤハリ腐骨疽ニ初紫黒色ニナル者ニ浮萍煎ニテムスヘシ初起越婢加朮附ニ紫丸又消散セス久クスルト盜汗出テ勞状ニナル其ノ維ヲ淺ク指ヘシ汗出レハ桂支加黄氏○大广風補天丸脱疽ノ様ニ痛ニ強ク黒腐ニナル時ハ朮乃伊ヲ一味丸某ニシテニ三分宛用鷲掌凡ハ八道荊艾地骨也○反花瘡正宗ニハ一種ノ腫物ノ様ニ云テアレハ諸腫物皆反花スル者ニ其内肉痛結毒血瘰杯反花シマスキニ脱血シタル

痘ハ時ニ望テ服薬スヘシ初心ノ内ニアマリカヲスルトク用ユレハ
出血多シ瓜ニテコソケ取ヘシ又竹筴鉄筴ニテコソケレハ生肉
ヨク引ル者ナリ

○腋痂ハ腋下ノ痂ナリフハツキタル者モアリ然ラサルモアリ針メ
后托消之廣ク切ルニ及ハス

○股痂腋下ノ下へ出来ルニ此ハ阴状ナル者之羸瘦メ勞状ノ
様ニナリテ死スルニ輕視スヘカラス紐ヲ深ク指スヘカラス痛強
ク針メ膿ノテヌ者アリ

○鼻痔ハ鼻タケ之初起赤キヒラクスル者アリ此ハ瓜蒂ノ末
ヲ吹ハ流レテシマウアリ或ハ硝砂ヲ吹ヘシ不流大ニナレハ切
断スヘシ切口ヨリ又出来ヌ様ニ硝砂ヲ吹ヘシ辛夷清凉欠
ヲ用ユ

○癩凡一種アヒナマズト云アリ黑煙硝ヲホニメ酢ニテ朝ニ付
午后湯ニテ洗フ二日目ニハ治スルニ黑癩モ治法同シ黒
色ナリ正宗蜜陀散午黄散丸散方ニモ出テアリヨク忘
スルニ

○白駁凡癩ノ一種ナリ

○腦漏真頭痛ノスル共其後ニ癩スル共之梅毒ヨリ来ル
鼻淵腦漏ハ凡熱ヨリ来ル辛夷清凉欠黄鐘散梅氣ノ
有元氏ニ消毒ヲ加用腦漏ハ羸瘦スル共之鼻淵ハ輕キ
症腦漏ニ四花ノ灸ノヨクキク共之梅氣ノアル人鼻ヨリ膿
出ルアリ柴石加辛夷

○破伯凡剝症ニ打撲損伯ヨリ凡氣囊入テ此症ヲスル
ナリ寒慄振慄項背強リ舌強リ脉濡瘡口乾燥スルカ

此症ノ徴ナリ此症ニナレハ口禁シ角弓及張スルノ角弓ノ症
ハ先ツ某ヨリ肢鼓ヲカクベシ其后振慄寒熱ノ強キハ當飯
四逆虎杖无患子肩背ノ強ハリ舌ノ強リ劇キハ葛根湯虎
杖无患子或ハテリマアカサフヲ用一種痲口ヨリ湿気敵
入テ腫痛ヲナス症アリ越婢加朮附ニ中黄ヲ貼スヘシ準繩
曰痲口ヨリ凡入テ破伯凡トナリ湿入テ破伯湿トナルトアリ
破伯凡ノ症ニ自汗ノ出ルハ難症ナリ師家ニ云流注ト破
伯湿ト其形相似其因ハ流注ハ破伯ヨリ他所へ流注スナ
リ破伯湿ハ其場ニテ腫ルナリ

○ 跌撲気絶シタルハ合谷へ針シ清風ノ活ヲ入ヘシ若高野ヨ
リ落テ阴囊ヲ打テロノ割カザル共アリ此ハ口中万カニテア
ケテ回生散ヲ飲マスベシ骨ノ折タル野ハヨク引延シ法ノ

如ク楊柏散ヲ雞卵酢デ煉付ベシ其上ヲ卷木綿メアラント
ニテ蒸スベシ一通ノ症ハ和經湯ヲ用ユ又腰背ヲ打テ便秘ス
ル症ハ大成湯ヲ用肢ニ瘀血ノ凝ノアル人ハ菴仁養氣ヲ用夫ラス
テヲケハ腸癒ニナル共ニ凝血シタル共ハ針メ血ヲ取ルヘシ其跡へ
楊柏散或妙貼散ヲ付ルニ一種腰杯打テ一年モ半年モ経テ
痛ム症アリ此ハ敗血ニ打撲門導滯湯ヲ用

○ 杖瘡ハ杖テウタレタルヲ云ニ凝血シタル野ハブランドニテ蒸スヘシ
ヒトキ症ニ至テハ腐リ抜ルコトアリ三黄粘痛湯ヲ用ユルニ
○ 湯滌火伯ニ症トモニサシノ野ハ大赤ニ惣身モ焼タル人ハ馬
油ヲ塗ベシ柿ノ殼杯用ユル人モアリ是ハ惡シ、都テ洗某ハ惡
シ愈ロヨク屈ニ付故ニ屈伸サストアテホスルコトヲ能心得ベ
シ又内攻スル症アリ先ツ四順清涼欠テ推スヘシ大ニ迫リ強ケ

レハサフラン童使ニテ用ヒテリアカラモ用ユルアリ

○痞癖ハ后世ニ云積聚瘀之所在不定服下ヘモ臍脇ヘモ来ん
外ヘ腐リ拔ん共ニ非ス其塊ヲ推ハ少痛アリ運轉スん共之
上ヘサシコムトアリ腋痲ニマキル様ニ思ハルレ氏小肢ヘハ餘リコ
ヌ共之三四年モメカラ膿ヲ催ストアリ血塊トヨク紡ル共之
血塊ハ不痛カ目當之血塊ヨリハ浅キ者之膿潰ノ外ヘ腐リ
拔レハ是死スル共之現言ニ大牡ヲ用テアルカ此ハ誤リナリハ物
湯ヲ用ユヘシ此症ハ男女ニハカキヲヌ者之多ク此症ハ左足ノ
方ニアレハ左足ナヘルトアリ足ナヘレハ桂木附ノ症ノ様ニ思ワレト
矢張腋ニ目ヲ付テ阿魏加皮散ヲ用経閉杯スル症ニハ抵
当湯或ハ九ヲ用ルトアリ消塊ニテ下ストアリ経閉ハ扁杖
心附劑ヲ用ヘカラス

○牙縫出血卒ニハグキヨリ出血スルトアリ血勝ヲ付ヲサユヘシ齒痛

ム症ハ清胃渾火湯三黄加芒硝ヲ用或ハ傳血散ヲ用トアリ

○血箭ハ毛孔ヨリ出血スルヲ云ヘ凡毛孔ニ限ラス出ル共之或ハ灸

瘡ヨリ出ルハ細ク糸ノ様ニ出ル共之多ク出血セハ八物湯三黄

加芒硝餘リ出过レハ死ス

○血痣所在不定多ク面部ニ發スルニ少シ赤クイテゴノ様ニテキ

ル頭ナドニ出赤テ髪ソリテソリ切レトアリ此ハ能及花スルトアリ

糸ニテレルヘシ

○鷲掌凡手足ノ皮ノ潤ヒナクナリテ皮ノムケル症アリ无名異白

雲付ヘシ八道加荆々地骨皮○丹凡枯凡五倍子茶是ハタハ

ラシテ愈ス為ナリ又大枫子ノ皮ニテフスヘルトアリ其跡テ桐油

ヲスリコムニ毎日スヘシ急ニハナヲラヌ共之長ク養生スレハ是非治

スル皮ノ厚キ人ハコロシメスニテ皮ヲトルベシ

○腎囊凡ハ猪苓接骨木湯ノ合方梅毒ノ有ル人ハ大解ニ付某
土大黄膏蛇床散テ洗フアリ枯化ヲ加フ

○痲癬癩瘡ハ始十敗加大黄出カヌル者ニ三蛇散ニテハリヲ付

ル或ハ鼠肉ヲ用ヒバツト出タル所テハ從革ケ毒カセロニナ

リタラハ湯へ入ルベシ早クイタソウト思ヘハ付某ヲナスベシ惟

シ股腋下阴所ヲサクベシ

付某方 巴豆 大黄 大枫子 黑胡广 各五枚

右之末ヲ酒ニテ煉リ付ヘシ又一種内攻ノ症アリ此ハ山腋赤

小豆湯ヲ用此某ハ劇症ニキク之緩症ハ三十日モボツクト

内攻スル症アリ此症ハ仙遺量ヲ用内攻呼吸息迫ノ症沽洗

丹テ下ノヌクヘシ此某ハ沽洗丹ヨリ衝心ノツヨキニ用急症ハ壺

九五七分ヨリ一日適用之右症ユルミタレハ仙遺量ヲ用ユヘシ

○臍瘡俗ニハキグサ雁来瘡ト云初起カイルイノ春秋ニ出来

ル之重症ハ時ニカハラス出来ル之荆敗ニ雁来紅ヲ加フ当飯

粘痛湯楊梅荊苈湯浮萍加大黄出血シテエケヒシヤコシラ

付テ上皮ヲムクベシ其上へ中黄ヲ付ヘシナレバ中黄ハ早キニ

破敵ヲ付ヘシ二三篇モエケヒシヤヲ貼シムク又此方ニテ治セ

サレハ梔子ノ末ニテ洗フヘシ劇症ハ竜門ニテ下スベシ

○血凡瘡血ホロセ一身中へ細カクバツト登スル其色ハ赤キ者

ニ痒ニ有ニカケハ黄水出ルニ正宗ノ消風散平血欠防通可

ナリ

○頑癬セニガサナリ

○膿窠瘡手足扁身ニ生ス痒ミアリカケハ黄水カ出ル其水臭

氣アリ小兒遺毒ニ能アル者ナリ血凡瘡ノ様ニ赤ムハナキ者ナリ
ヲヨツト見レハ疥癬ノ様ナ共之早ク治セヌ共之消凡散浮萍
加大黄小兒ナレハ大連光欠

○凍凡ハシモマケニ当故建中出血メ中黄烏頭煎或ハ粘子カラ
ニテ洗フアリ悪クスルト脱疽ノ色ノ様ニ腐ルモノアリ桂木烏ラ
用エ

○火丹凡熱ニ浸サレテ肌膚ニ発シ色赤ク雲片ノ如クウロツラ粟
粒ノ様ニ痒クメ痛アリイラノスルニ発熱増寒シ甚ハ振慄ス
ルニ十敗或黄連犀角加中黄ヲ貼スヘシ初心ノ内ニ漆瘡ト見
誤ルコアリ此疔出所不定トアレ氏多ハ胸乳ノ間ヘテキルニ一種
腰ノ辺ヘ発熱スルアリ此ハ正宗ノ纏腰火丹或ハ對口疽準繩
火帶瘡ト云共疔ハ丹毒ナリ纏腰火丹ハ輕キ者ニ赤ミセアリ

テ水泡ヲ登スルコアリ推テ不痛及テ衣ル者杯サワリテ痛ム
者ニ水泡ヲツブシテ中黄ヲ付ヘシ荊敗ヲ用準繩ニ赤遊凡
白遊凡ト云コアリ正宗ニ乾湿火丹トアリ乾火丹ハ熱多ク湿
火丹ハ熱少シ白膿ノ出未ル者ニ乾火丹ハ膿カ黄ニナルニ白遊凡ハ
湿火丹赤遊凡ハ乾火丹之治方稍同ニ
○天泡ハ水泡ノツブレタル様ナ者ニ水泡ノフチハ赤シ夏中多キ共ナ
○熱氣皮膚層ノ内ニカクシテ出ルコヲ得ス夫故ニ出未ルニ大ナル共
ハ大灸跡程アルニ清解中黄凉劑ヲ用ヘシ余ハ凉膈散正宗
ノ解毒浮心ヲ用ユヘシ

○肺凡ハ面部ニ出未ル者ニ顔ノフケノ様ナル共ニ清解
○粉刺ハニキビナリ
○酒查鼻始出血メ上皮ノ黒キ所ヲ付茶ヲツケテムクヘシ妙貼
三黄色子

散ヲ貼ス防通黄連色子大黄湯

○雀班ソバカスナリ

○油凡ハ表氣ノ循リ悪シクナルニ多クハゲテモ直ニハ入ヤスキナリ
久シキ者ハ不治海艾湯ニテ洗フベシヤクハシニナリタル者ハ不治

ナリ

○白屑凡フケノ一種頭ノ地カ赤クナリテフケノ出ル者アリ防通

黄鐘ヲ用

○耳病停耳ハミダレノノ蔓荊子散ヲ用テ耶子油ヲ流シコ

ムシ

○脱疽切断后骨痛症ホ乃伊ヲ用ヒハ忽チ痛止ム蚯蚓油ヲ用

コアリ

○齒唇血ノ出ル女ハ黄連ケ毒

○瀋唇小兒疳后遺毒ノ后ニ登スル女ニ此症ハ口ヒルフクレ爛レテ白

膿出ル女ニ突腫スル女ナレバ齒唇ノ様ニ人中ノ所ハ出未ヌ女

ナリ齒唇ハ痛ミ強キ女ナリ中黄ヲ貼ス

○槽牙凡此ハ齒ノ根ニ腫物出来テ焼ル様ニ痛ム者ニ

○紫焰疔紫黑色ニナリテ黒ク腐ル女ニ至テ劇症ニ另ニ疔タ

ル徴ナシ其内ニニツニツ小泡ヲ登シテクル者ニ其内火焰疔ハ色

紅イ計リ也

○漆瘡面部ヨリ四支迄バラクト出来寒熱振フコアリ湯モアリ

此ニ先荊敗ヲ用ユヘシ多蘘欠ニ紫蘘加倍シ用コアリ必愈

某ナト用ユヘカラス洗某ハ荊艾湯蛇床子煎湯灰芒硝ヲ用ユ

ヘシ内攻シタルハ化粧ケ毒或越婢湯ヲ用又ハ藍葉ヲ加フ也

方方彙登班門ニアリコトニヨルト所ニヨリテ瘡ヲタニナルアリ
其時ハ紫雲ヲ用ユ

○瘡癩フツハアセホ瘡ハ子ブトナリ正宗ニアセホノコニメ有此説誤
リニ茶ハ浮萍湯或ハ天山粉西瓜汁ヲ付ヘシ

膿氣ヲ催スヲ
托消

○疥癬天地不正ノ氣ヨリ来ルトアルカ飽食ノ脾胃ヲ伯リ食熱
ノ為ニ発スル共ニ或ハ耳下ヘモ及フ共ナリ初起甚熱ヲヨキ共ニ

○驚搐シタリスルコアリ某ハ十敗或ハ紫石ヲ用俟共ニ驅凡加石
ニスクレタル方ハ先ニソトハ中黄ヲ付ヘシ膿ニナリタレハ先鋒ヲ

○張内托スヘシ多クハ驅凡加石ニテ消散スル共ニ初起強ケレハ紫
田ニテ下スコアリ

○濕腫破伯濕之破伯濕ニテケク漫腫ノ所々へ流注スル共ナリ
○此症ハ畢竟破伯濕流注ノ小サキノト思フヘシ

○咬伯ハ人ニカマレタルハヒトク熱ノ強キアリ此ハ人ノ劇メ咬子ハ痛

共ニテハナレ指ナトカマレテ脱疽状ニナリテ黒腐ニナリ痛共ア
リ出血スレハ血勝縛血散痛強キニハバルサンヲ用ユヘシ大根汁

ヲ以テ洗テモヨシ十敗或ハ烏頭湯若又毒上ヘアカリテ手ヲ甲
辺ヘモ赤クナリ来ル者アリ能診メ破血ノ毒勢ヲクジクヘシ后

膏ハ中黄腐レハ破敵此症及肉シ易キ共ニ治方及瘡ト同
同シ

○蝮蛇伯先瘡口ノ四辺ヲ乱刺シ雞冠中黄ヲ貼スルニ豕柘散
ニテ圍ムヘシ内烏頭湯腫ヲヨキハ越婢毒輕ハ十敗反蛇散ヲ日

ニニ葉ヲ兼用或此症毒強クトモ淺クトモ紫田ヲ用ヘシ何
介ニモ出血ヲ多クスヘシ

○鼠毒十敗茅根ヲ加ヘ用瘡口ハ雄黄中黄一方ニ廣香ヲ

服ニタリ痲口へ付タリスルコトアリ或ハ紫田ニテ下スヘシ兔角内
攻セヌ様ニスヘシ片ニ青鷲ヲ焼キ食セシムヘシ

○凡犬伯劇シキ共ハ毒気心ニ迫リ肢滿寒熱スル共アリ此症ニ
黄連ケ毒湯木幣子多ク加フヘシ頭眩シテ狂ノ如クナルコトアリ
サスレハ毒ノ抜ルコトアルナリ多クハ荆敗加雄黄紫田ニテ下ス瘡
口ニ人糞ヲ付テ艾灸スヘシ此ハ糞ヲ焼込為之其糞ヲトリテ
破敵鷄冠雄黄撰用スヘシ一奇方防通ニ雄黄ヲ加テ用ヒ
日々ニ紫田ヲ以テ下スヘシ三四日ヲ経テ黑豆ヲ食セシメナマクサ
キハ毒ノ抜タル之毒不尽時ハ腥トハ不云之毒尽レハ瘡口ウルヲウ
テクルコト脈ハ弦救ナル共ナリ

○婦人面生鰐黑斑ハソバカス之雀班ト曰シ癩シ様カ疥瘡ニ似タ
ル共ナレト疥癬ナレハ指ニ癩スル共之鈕叩凡ハ指ノ股ニ癩セス多

ハ頸首項背ニ延漫スル者ナリ此症ヲ以テ另ツヘシ此搔痒甚シ
クカケバ爛レテハゴロシ治方ハ疥癬ノ如クナレトセク異ナリ消
凡散浮萍加大黄或銀荆土大黄膏ヲ貼ス或荅腦散或疥
癬ノ湯某モヨシ

○枯筋箭初起粉刺ノ如シメ四面赤暈アリ多胎乳ノ間ニ出
共之日久ノ潰乱ス其後ウラノメノ如ク色赤クヒカリ頑肉次第
ニ長大ニナルナリ某荆敗薏苡一味ヲ服セシムヘシ不治者深ク
其頑肉ノ根ヲ切斷スルコト切斷后ハ青蛇ヲ付随介生肉ヘカケ
テ不取ハ再癩シ安シ此方毒甚共ハ胸下項背或腰ナトニ
散漫スル者之治曰シ

○婦人脚了作痒男女ニ限ラス旅行スル人ニ多ク出ルコト俗ニ云
フイキレ之初起指ノ又ニ出来テ痒ク搔ハ爛テ汁ヲ出ス甚愈

唯キ者之膏ハ白雲正宗ノ枯荅散杯付ヘシ世人旅行スルニウ
ノメ確黄ヲ懐中スレハ此患ナキ者之

○手足破裂俗ニ云アカキレナリ此症多ク春冬ニアリ此ハ寒氣
ニ浸サレ表ノ血氣枯燥スル故之鷲掌凡ノ如ク赤ク筋キレテ痛
者之紫雲或白雲猪油ヲ焼込モヨシ服茶当建或加味逍
遙荊艾地骨皮

○眼丹初起目カシラ目ブチニ生ス小女大豆大者ハ梅子位ナル者
ナリ先鋒ヲ貼シ荊敗或櫻茹湯膿氣アラハ早く浅クサスヘシ
然ラサレハ漏ニナリテ久ク愈サルモノ之若シ潰テ漏ニ成タル共ア
ラハ铍ヲ浅クサシヨクク膿ヲ推テ葛根木烏ニ端的兼用スヘシ
○体氣ハ腋臭之銅ノ鍋ニテ酢ヲヨク沸シ腋下ヲ七日間洗ヘシ毛
アル共ハ毛ヲ去ルヘシ八日目ヨリ又七日間海胤一味能蒸テ滓ヲ

去リ右ノ煎汁七日間腋下ニ塗即七日メニ紫田四五弁ニテ手
強ク下スヘシ又八日ヨリ蜜陀僧白且枯凡輕粉各ホ介ヲ細
末トシ酢ニテトキ腋下ニ塗ルヲ七日或十日ニ至ル此方凡七四五
日隙トルト蚕百発百中ノ神方ナリ他ニ奇方多シト虽此方ニ
勝レル効ナシ

○白朮瘡ハ白雲之小兒ニ多シ白雲散ヲ桃油ニテ付ルヲ妙ナリ
内某清解ニテヨシ劇シキ共ハ竜門ニテ下スヘシ

○奶癬小兒頭上ニ一面ニコヌカノ如ク出ル之甚痒ク擦ハ汁出テ愈
カクキ共之連克欠端的丸膏ハ中黄紫雲ヲ貼ス此矢張遺
毒ナリ

○蟾拱頭一名腦猪準繩ニ軟癩ト云俗ニハス子ナツブシ或ハカシ
ラハケト云皆一之小兒ニ胎毒ニテ頭上ニ生メ多ク膿ニナル共之

膿ヲ催セハスグニ赤クナリヒカリ出ル共ナリ針ノ破敵ヲ貼シ
先鋒ヲ蓋ス内菜托消ヲ用ル此症夏月ニ多シ膿潰后尤突
蛇退皮未子リ合セ貼スレハ瘡痕出未ヌト云シ

○小兒遺毒爛斑此胎毒之此症ヲ見ハスト虽多ク肛門阴囊腋
下眼目頭上杯ニ瘡ヲ発シ爛レル共ニ某ハ大鮮端的或連壳
欠甘汞丸紫田竜門ニテ時々下スヘシ諸症多ク治方多シト
虽筆紙ニ不及故ニ略ス

○蟻蛇串初起肛門ノ四辺ニ生ス痔漏ニ紛レ易キ共ニ痔漏ハ
本管アリ蟻蛇串ハ本管ナクメ唯四辺ヘケラ虫ノクヅリタル
如ク四辺ニ漏ヲナス故ニ漏蛇串ト云葛木鳥端のヲ用ヘシ若
シ脱症ヲ見ハス共ハ十補八物杯ヨシ各切斷シ破敵ヲ貼ス治
方結毒ノ如シ病源口論ニ九漏ノ名アリ準繩ニ久シテ漏瘡

ノ諸漏ノ名アリサレ氏流注腐骨疽其他諸瘡久シク愈ヘス或
ハ誤治メ漏ヲナセリ病名ノ九漏杯ト云テアレ氏形ヲ以テ名ツク

○小兒痘瘡凡痘后ニ湯杯ヘ早ク付ント凡邪ヲ受ル故際瘡ノ如ク
惣身細カキ共出ルニ連壳欠淳萍湯時々紫田ニテ下スヘシ
或荊芥湯ニテ洗モヨシ各另恐ヘキ症ニテハナシ

○小兒赤遊丹此ハ三四歳ノ小兒ニ限ルト云ヘリ身ヘ赤班ヲ発
シ呼吸臭迫シ或驚馬搐ス治ヲ速ニセザレハ衝メ此スルニ委
中尺沢ニテ血ヲトル毒ノ所在ヲ見定メテ刺絡スヘシ方ハ犀
角消毒欠或黃連ケ毒湯加犀角便秘スル共ハ紫田ア
ルイハ調胃氣下スコアリ外臺ノ紫雪撰用スヘシ此症
ヲ大人ニ發スルコヲ見タリ然レ氏右人ノ説ナレハ先從テ矢張
丹毒ナリトメ治セリ此症多痘疽附骨大流注ホ治療中

七八日ヲ过テ多ク発スルヲアリ升广葛根加犀角或ハ黄
連ケ毒湯準繩火丹門ニ小兒歟ヲ得ル時ハ尤急ナリト云リ
正宗ニハ赤遊丹ハ小兒ニ限ルト云テアレモ歟ハ小兒ニハ限ラサル
之活物ニテ能診メ見レハ小兒赤遊丹ハ大人火丹毒ノ劇症ト
同シ初起赤斑ヲ発シ形チ雲片ノ如シ此症凝血甚メ后チ黒
腐ニナル歟アリ是ハ不治ナリ

○痘瘡落茄ノ后餘毒聚リテ所在ヲ不定発スルナリ痘ハ骨
ヨリ生スト云ヘリ故ニ腐リ深クメ多ク骨ニ付テ附骨ニモナル
ヲアリト見ハ早く刺スヘシ針メ鶏卵左突維ニメ内十補ヲ用エ
扱發所不定ト云凡多クハ手足ニアリ此症長ク愈サル歟ニ必ス
治ヲ強スヘカラス

○痘疔歟ハ痘中ニ粟粒ノ如ク色紫黒ニメ痛甚ク焮熱シ漫腫

ハセサル之疔ノ治方ニ從フヘシ凝血強シト見ハ破血ニテ青蛇ヲ貼
スヘシ

○黄水瘡ハ俗ニ云水瘡ナリ頭面頤頰骨へ出テ黄水ヲ流シ粟
粒ノ如クブツクト一面ニハビコル歟ニ紫雲清解清上防风湯蛤
粉散ヲ付ルモヨシ

○大人口破舌上及唇ニ小瘡ヲ生ス乾燥メ破裂ス歟レ治法口中
門小兒粉瘡ト治法同シ

○奥田螺足ノクロビラノ上ヘヲリカ、ミノ所ニ生メ初起白ク腫テ痒
シ甚クシ破テ脂水ヲ流ス甚臭シ蛇床子煎ニテ洗ヘシ妙貼
散ヲ付ルモヨシ内十敗臭水多ク出ル歟ハ端的ヲ兼用スヘシ

○牛程蹇ソコマメノ小豆大ノ頑肉テキテ次第ニ大ニナリ皮コハクナ
リテ其頑肉ト生肉ト一所ニナリテ歩行スル時石杯ヲ踏トキハ

其頑肉ヲ外ヨリ踏故ニ生肉ヲ頑肉ニテツク故痛ニ治法コロ
ンメスヲ以テ頑肉ト生肉ノサカイヲ切取ヘシ跡ハ白雲血勝ニテ
ヨシ或兩中歩行ノ湿氣ヲ含ム時ハ頑肉ト生肉トノ間ニ水ヲ
マリテ遂ニ膿ニナル故ニ痛ヲヨキ共ニ此トキハ針ノ能膿ヲヌク
氏ニ頑肉モ取ルヘシ

○酸痛ヒ、之手足ニ出未ル共ニ紫雲ヲ塗リ込ムヘシ花柚汁ヲヌ
ルモヨシ劇キ共ハ当建

○阴虱阴毛ニ生スルニ治方瓊言ニ出ス

○葡萄疫不時ニ流行スル共ニ多ク小兒ニアリ初起寒熱甚
ク面部ニフワクト集リ出水泡ヲ生スサシク痛后ニハ爛ル、
共ニ針ノ水ヲ取り中黄ヲ貼ス平血欠葛根加吉更共症正
宗ニ天地不正ノ氣ヨリ登スト云リ諸君ヲ照シ見ルニ葡萄疫

ハヤハリ時毒ト思ワル十敗甚シ

○誤吞鐵針骨硬魚ノ骨ノタチタルニハ酢一合五夕ニ煎或縮砂
ノ末白湯ニテ送下ス竹木刺ニハ肉中ニ有マ无マ疑ハシキ症
ハ左突ニ鹿眼ノ末ヲ子リマセ貼ス神効アリ餅ノ咽ニツマリタ
ルニハ胡广油一味用酢ヲ濃煎ニメ服スルモヨシ又一術清凡ノ
活可ニ針ノ咽ニ立タルニハ外ヨリ能ナテ所在ヲ得ト見定メ
切破リ扱ヘシ

○中砒毒ハ毒石ニアタリテ惡寒發熱シ口燥劇シキ共衝心スルニ
绿豆大黃甘中右三味水煎黃連ケ毒湯用テアリ一人其
月瘡ヲ患フ茶店ニ行テ截茶ヲホテ帰リ急ニ服ス瘡速ニ
截テ精心爽カク三日ヲ経テ精心クラクウツクトメ不食ス
五日ヲ経テ左ノ臍上ニ塊ヲ結ブ大サ拳ノ如シ時々衝心以テ接

ノ痛ナシ口乾キ嘔吐シ寒熱ス九脈ハ弦ニメ時々結スルヲアリ
心下ヨリ胸下小腹ニ至ル迫微満シ眼目黄シマ、腰ノ上下ニ汗
ヲ生シ診医不治皆疝ナリトシテ治ヲ施セリ余同盟往テ診
セリ是亦疝ナリトメ紫苓湯ヲ貼ス明日以此ヲ診スルニ渴益ハ
ナハタシク小便閉大便ハ血便ヲ下ス早急ニ歸テ告師先生歎
メ曰皆治ヲ誤テリ此疝最早病八九ヲ過タリ故ニ不治先一方
ヲ用ヒヨト長流水一升ヲ飲マシム明日黃連々毒湯加绿豆
冷服二日ヲ経テ塊七八ヲ減ス訣疝皆退ト虽救日痛苦甚ク
故虚脱メ遂ニ死セリ惜ムヘシク病羊ハ頃ニ治方ヲ施サハ生ヲ
得ントモアラント

○河豚魚毒一奇方 鹽湯ニテ飲スヘシ或橘枳散白砂糖ヲ食
セシムトアリ其他奇方多シト虽吐劑ニシクハナシ

○阴毒至テ稀ナル其初会阴ニ生ス甚共ハ小腹迫モ腐ル共
之其初会阴ニ生ス此ハ痛ヲヨクメ忍ヘカラス時々痛ヲ発ス痛止
亦發ス時ハ阴茎勃起ス湯ニテ以此ヲ蒸セハ暫ク痛止ムサスレハ
阴茎モナラシム此ヲ熟視スルニ会阴膿管アラハ刺メ膿ヲ出ス
ヘシ多ハ不治之初起大牡潰后八物加鹿茸膏破敵以疝潰后
トイヘ膿タマシトキハ阴茎勃起ス膿ヲ能抜ケハ又モトニ歸ス
○委中毒ハ初起寒熱甚シク痛強ク食日々ニ減ス膝頭次第ニ
瘦セ委中ノ四辺右ノ如クニ腫レ日ヲ経レハ黑腐ニナリ腐潰メ
出血甚シ后ニ膿ハ少シ宛出レ次第ニ脱メ臭氣不可近遂
ニ死ス治方初起大牡或越婢茶黒ニ及ハ四物湯以疝初浮萍
煎ヲ手強ク用ユレハ消散スルトモアラシヤ未試シ

○嵌甲疽ハナヲスレナリ湯火倍ノ如ク水泡ヲナス其水泡ヲサシ

白雲ヲ貼スヘシ準繩ニハ只甲疽ト云ヘリ嵌甲疽ノ疽瘡ニ作
カヨシ疽ノ字ハアママリシ

倒睫

○眼胞随分上ノ方ヲ指テ格好ヨキ程ニ摘ミ毛引ニテシカト
挾ミ毛引ヲ定ホトメ挾ミ皮ヲ切り取り而后子リクリ糸ニ
テ三針縫フナリ其上ハ鷄卵无名異ヲ貼置二日経テ前衝
ヲ貼ス糸ヲ抜テヨリ紫雲ヲ貼ス服茶ハ不用メ可ク
俗ニ赤目ト称スルアリ是ハ赤毛ヲ下ニヲシツケ上ヨリコロシメ
スニテ薄クヘキカエリシ裡ノ肉ヲ眼刀ニテ縦横ニキリ推シ付テ
白雲无名異或紫雲決勝ヲ貼シ和ラカナル毛綿ニテヲサ
ヘ卷ホ綿ヲ掛置此疔動モスレハ齧肉出ルコトアリ能心得ヘ
シ若齧肉發レハ卷ホ綿ハ漸々見合遊奕ニテ代用スヘシ

鎖鼻

○披針ニテ外ヨリ内ノ軟骨ヘ向ケ針ニナスニ薄皮ナレハサシテ
外ヘ切付置バカリニ厚皮ナレハ三角ニ疔ヲ切リアケ然レ接骨
ホヲ指ニテ推シツブシ紙ヲマキセントシヲ塗リサス随分鼻稜
ヘ当ラヌ様ニサスヘシ十歳以上ハハ介ヨリ一寸程コレヲサス
三日次ニ破敵ヲサス一二月腐肉トレテ赤クナルナリ其所ヘ白
雲ヲ付其上ヘ鉛粉ヲ付サス又水銀モヨシ十日許ラ経ハ鉛
管ニ紙ヲ一重マキ白雲ヲ塗又水銀或鉛粉ヲヌリサス瘻
愈テヨリ管許半年或一年モサス

鎖耳

○治法鎖鼻ニ同シコナレ氏セツトシハ不用之此疔或停耳甚シ
キ女ニアリロウサワトルニテ洗フヘシ膏ハ白雲決勝メイチヤ

缺唇

○兩缺唇ハ一方ヲ治テヨリ后三四十日ニメ縫ナリバンドハ真中ナ
レハ切任中ヨリシハラク膿ナレハ不切其余治術他唇ニ詳ナ
レハ略ス

六指

○本指ト支指トヲ能ク見定其切斷スヘキ指ヲシカト紮リ引
伸シテ大ソリヲ以テ骨ノサカイヨリ切斷スヘシ其跡へ白雲決
勝ヲ貼シ卷木綿ス大人ハ一針縫テヨシ

駢指

○指ノ股ヨリ三分斗リモ深ク切り込ヘシ危ナケレハ愈付スキ
ルニ膏ハ白雲決勝或ニ番ニテ綿カモ綿ニ推シ両方ノ指
ヲマキ同ク一枚ハ指ノ股ヘハリ其上ニ紙ヲハリ紙條ヲマタカセ

腕首へムケ引シメ置ヘシ左ナケレハ兎角愈上リテナラヌ者ナ
リ尚口傳

鎖陰

○此症種々アリロニテ塞カリ就中ムワカシキハ子宮ロニテ塞リタ
リドコ迄切りテテ度ノ知ヌ者ニ故ニ初心ノ者可謹切斷ノ法ハ
先ツコロンメスニテ左右へ切ルヘシ上下ハ尿道ト肛門ト故大事
ニ其時肛門へ指ヲ入テユ合ヲ考フヘシ薄皮ナラハナルタケ
指ニテ破ルヘシ万一尿道ヲ切りタラハゴムカテイテルヲ指置
瘻ロニバルサンヲ付クヘシ切斷后紫雲ニ蛇退皮ヲ交セ貼ス
口使始終此膏ヲ用ユ又鶏卵左突ヲ用ルヲアリ治療后尿
道へ腫ノクルヲアリ故ニ針ヲ刺スヘシ又誤治シテ大便道へ切
込テアリ夫レハロウザヲ温メテ瘻口ハ勿論阴門中ヲ洗フヘシ

羔白雲

其痲口ハハバルサシヲ付レハ愈ル者ナリ某ハ調榮

陰門破裂

○是ハ缺唇ノ治方ニ曰シク縫シ后ハ无名異ヲ鷄卵ニテ煉リ付
ニ缺唇ノ如ク両口ヲ切り縫フヘシ又氣閉メ大便秘スル者アリ蜜
煎導ヲ指スヘシ

婦人石淋

○婦人石淋ハ尿道ノ下ニテ切アリ尿道ヲ離レテ出未ルアリ此ハ
尿道ヲ切り跡ヲ縫フヘシ某ハ調榮膏ハ雞卵无名異煉リ付
テヨシ白雲ニテモヨシ如人石淋至テ稀ナル共ニ此治モゴムカテ
ヒテルヲ指スヘシ

男子石淋

○多クハサヲニ出未ルニ此ハタテニ切出スヘシ縫テ霍ノ初ノ根ヲ刺スヘシ

其霍ノ羽ノ管ニ糸ヲ付テ下帯ニ繋リ付ヘシ此ハ抜ヲ為ニ雞卵
无名異血勝ニ此ハ金創ノ治療ニテヨロシ

阴孤疝

○如人阴孤疝ハ阴門ノフチニ出未ルニ此ハ腸ノ下リ未ルナリ治療
男子ニ等シ

鎖肛

○男子鎖肛ハ如人ヨリ急ナル共ニ能菊堅ヲ見定メ披針ニテワキ
破ヘシ切ルト直腸ヒツクリ及リ未テヒツツ共ニ披針ハ直ニ刺シ
一文字ニ切之后メイチャヲ指ス其後ニ置テ七八日位ハイキル共ナリ
如人ハ会阴ヨリ阴門ノ方へ糞ノ出ル共ニ是ハヒスドロスニテ菊
堅ノ方へ通シ切ルヘシ跡ヲ縫ニハ不及自然ニ愈ル共ニ

火傷

按ニ尾椎骨近
ハ向テ刺スニ尿
道ヲ信ルニ恐ナ
シ

人調桂木鳥四
順清涼火伯登
警三淨府加夫
蚕テリアカ

○引ツリシ所ヲコロシメスニテ柳へ切りニ切ルヘシ引切ニスレハ深切レス
ルナリキリイルカ見ヘテモ延ヌ者ハ引裂衣ヘシ

癩科口訣終

80
2805

